


# 用户手册


首页 .....	1
注册模块 .....	2
登录模块 .....	2
2D 导览模块.....	2
3D 导览模块.....	4
角色扮演模块.....	5
病例学习模块.....	6
测试模块 .....	8

网站访问地址：[www.ecnupet.cn](http://www.ecnupet.cn) / ecnupet.cn


## 首页



## 注册模块




## 登录模块



## 2D 导览模块

点击具体的科室，右侧展示该科室的具体信息：




## 3D 导览模块

具体的一个科室，右侧为该科室的简单文字介绍：



总共有 12 个科室可以进行 3D 浏览：






## 角色扮演模块

可以选择医助、前台、医生三个角色中的任意一个角色进行角色扮演：



进入具体一个角色的角色扮演界面，左侧是该角色的多个操作流程，每个操作流程下有多个具体的操作步骤：




## 病例学习模块

进入病例学习模块，选择特定病例种类，查看该疾病种类下的病例信息：



点击具体的病例查看按钮进入病例详情页。该界面包括左侧的 4 个步骤（接诊、病例检查、诊断结果、治疗方案），每个步骤中包括文字简介、视频信息、图片信息等：



# 测试模块

选择题目类别和考题数量进行考题的获取：



获取到考题：





答题完成，获得答题分数：

宠物医院学习系统

首页 / 测试

主页

导览

学习

测试

666666

测试

答题记录

试卷得分

重新组卷

您的本次得分情况为 10 分(一道题10分哦)

查看个人答题记录：

宠物医院学习系统

首页 / 测试

主页

导览

学习

测试

666666

测试

答题记录

历史答题记录

1. 犬心丝虫病是由犬恶丝虫寄生于犬（）和肺动脉而引起的一种血液寄生虫病。 ✓

右心室

左心室

半月瓣

心肌

2. 为了预防手术后可能发生破伤风，最好能在术前2周以上预先注射（） ✕

破伤风抗毒素

破伤风类毒素

青霉素

破伤风毒素

3. 牛瘤胃切开术最适宜的保定方法是 ✕

站立保定

仰卧保定

左侧卧保定

右侧卧保定

4. 术部剃毛时剃刀应（）剃去被毛 ✕

逆着毛流

顺着毛流

垂直于毛流

上述三种都可以

5. 用物理的方法将附着在器械物品上的微生物杀死称为（） ✕

灭菌

消毒

防腐

防止感染

6. 进行局部浸润麻醉时在普鲁卡因溶液中加入肾上腺素与目的不相符的是（） ✕

以收缩外周血管

延长药物被吸收的时间

镇痛、镇静

减少出血

7. 用于野生动物的捕获、运输、保定，也可用于家畜的化学保定的乙托芬属（） ✕

镇静剂

镇痛剂

肌松剂

解痉剂