

得分	阅卷人

一、填空题（每小题 4 分，共 20 分，周 2 学时班级做 1—5 题，其余课时班级做 1—4 及第 6 题）

1. 设 A 为 3 阶方阵， A 的第三行元素依次为 1, 2, -1，所对应的余子式依次为 2, -1, 1，则

$$|3A^{-1} + A^*| = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 2 & 1 & a \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$, 且 $r(AB) = 2$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 且有等式 $AX + E = A^2 + X$, 则 $X = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 设向量组 I: α_1, α_2 ; II: $\alpha_1, \alpha_2, \beta$; III: $\alpha_1, \alpha_2, \gamma$; 其中, $r(I)=r(II)=2$, $r(III)=3$, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \gamma + \beta$ 线性 _____ 关.

5. 若齐次线性方程组 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & a & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$ 有非零解, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

6. 若 0 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix}$ 的特征值, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

得分	阅卷人

二、计算题（每小题 10 分，共 60 分，周 2 学时班级做 1—6 题，其余课时班级做 1—5, 7 题）

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求 $r(BA^*)$.

2. 已知 A, B 为三阶矩阵, $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 且满足 $2BA^{-1} = B - 4E$, 求矩阵 A .

3. 设 $AP = PB$, 其中 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A 及 A^9 .

4. 设向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 0, 2)$, $\alpha_2 = (-2, 2, 1, 3)$, $\alpha_3 = (0, 1, -1, 2)$, $\alpha_4 = (-1, 4, 0, 7)$, $\alpha_5 = (-3, 6, 1, 10)$.

- (1) 求向量组的秩;
- (2) 求向量组的一个极大线性无关组;
- (3) 用(2)中选定的极大无关组表示其余向量.

5. 设向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ b \\ 0 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

- (1) 问当 a, b 满足什么条件时 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 并写出 $a=1, b=\frac{1}{3}$ 时 β 的表达式;
- (2) 当 a, b 满足什么条件时 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

6. 在 R^4 中求一单位向量, 使其与下列向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ 都正交.

7. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + ax_2^2 + x_3^2 + 2bx_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 经正交变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ 化为

$y_2^2 + 4y_3^2$, 求 a, b 的值及正交变换矩阵 Q .

得分	阅卷人

三. 证明题 (每题 10 分, 共 20 分)

1. 设 A 为 $m \times n$ 阶实矩阵, 证明 $r(A^T A) = r(A)$.
2. 若向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表示, 证明: 表示式唯一的充分必要条件是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关.

答案

一、每题 4 分共 20 分

$$1. 72. \quad 2. 1. \quad 3. \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}. \quad 4. \text{无关}. \quad 5. -2. \quad 6. 2.$$

二、每题 10 分共 60 分

$$1. B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \therefore r(B) = 4; \quad \text{---5 分}$$

$$r(A) = 3 = 4 - 1, \quad \therefore r(A^*) = 1, \quad r(BA^*) = 1. \quad \text{---10 分}$$

$$2. \text{由 } 2BA^{-1} = B - 4E \Rightarrow (B - 4E)A = 2B. \quad \text{---5 分}$$

$$(B - 4E \dots 2B) = \begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 & \vdots & 2 & -4 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & \vdots & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & \vdots & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & \vdots & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \vdots & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & \vdots & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \vdots & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \vdots & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix},$$

$$\therefore A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}. \quad \text{---10 分}$$

$$3. P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -4 & 1 & 1 \end{pmatrix}; \quad \text{---4 分}$$

$$A = PBP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -4 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 \\ -4 & 1 & 2 \\ -8 & 3 & 2 \end{pmatrix}; \quad \text{---8 分}$$

$$A^9 = (PBP^{-1})^9 = PB^9P^{-1} = PBP^{-1} = A. \quad \text{---10 分}$$

$$4. (\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4 \alpha_5) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & -1 & -3 \\ 1 & 2 & 1 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 2 & 7 & 10 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad \text{---3 分}$$

$\therefore r(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4 \alpha_5) = 3$, $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3$ 为它的一个极大线性无关组. ---6 分

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$\therefore \alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_5 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3$. ---10 分

5. 设 $(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \beta$. 其增广矩阵为 $\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & \vdots & 1 \\ 0 & -1 & a & \vdots & 2 \\ 1 & 2 & b & \vdots & -2 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$, ---3 分

$$\bar{A} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & \vdots & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \vdots & 1 \\ 0 & 0 & a & \vdots & 3 \\ 0 & 0 & b-1 & \dots & -2 \end{pmatrix}, a \neq 0, -2a-3b+3=0, \beta \text{ 可由 } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 线性表示};$$

$$a=1, b=\frac{1}{3} \text{ 时}, \bar{A} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \vdots & -5 \\ 0 & 1 & 0 & \vdots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \vdots & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}, \beta = -5\alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3; ---8 分$$

$a=0$ 或 $b=1$ 或 $a \neq 0, -2a-3b+3 \neq 0$ 时 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示. ---10 分

6. 设 $\beta = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$, 则 $\begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \alpha_3^T \end{pmatrix} \beta = 0$, $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = 0$; ---5 分

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \beta = (4, 0, -3, 1)^T, \beta_0 = \frac{1}{\sqrt{26}}(4, 0, -3, 1)^T. ---10 分$$

7. $A = \begin{pmatrix} 1 & b & 1 \\ b & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = B, \begin{cases} a+2=5, \\ |A|=2b-1-b^2=0, \end{cases} \Rightarrow a=3, b=1; ---4 分$

$$A-0E = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix};$$

$$A-E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$A-4E = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad \text{---7 分}$$

$$\text{则 } Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}, \quad Q^T A Q = B. \quad \text{---10 分}$$

三、每题 10 分共 20 分(证明题答案供参考)

1. 设 $A\xi = 0$, 则 $A^T A\xi = 0$, 说明 $AX = 0$ 的解也是 $A^T AX = 0$ 的解, ---4 分

设 $A^T A\eta = 0$, 则 $\eta^T A^T A\eta = 0 \Rightarrow (A\eta)^T A\eta = 0 \Rightarrow A\eta = 0$,

说明 $A^T AX = 0$ 也是 $AX = 0$ 的解. ---8 分

由两个方程组同解可知 $r(A) = r(A^T A)$. ---10 分

2. " \Leftarrow "

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 且 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表示, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta$ 线性

相关, 设 $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r$, 又 $\beta = l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + \dots + l_r\alpha_r$, 两式相减得

$$0 = (k_1 - l_1)\alpha_1 + (k_2 - l_2)\alpha_2 + \dots + (k_r - l_r)\alpha_r \Rightarrow (k_i - l_i) = 0, i = 1 \sim r,$$

即表示式惟一; ---5 分

" \Rightarrow "

β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 惟一线性表示, 即方程组 $(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \dots \ \alpha_r) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_r \end{pmatrix} = \beta$ 只有唯一一组解,

即 $r(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \dots \ \alpha_r) = r$, 所以 $\alpha_1 \ \alpha_2 \ \dots \ \alpha_r$ 线性无关. ---10 分