


Canard colvert (Anas platyrhynchos)




Canard pilet (Anas acuta)




Canard chipeau (Anas strepera)




Canard siffleur (Anas penelope)




Canard souchet (Anas clypeata)




Sarcelle d'hiver (Anas crecca)




Fuligule milouin (Aythya ferina)




Fuligule morillon (Aythya fuligula)




Tadorne de Belon (Tadorna tadorna)




Foulque macroule (Fulica atra)




Héron cendré (Ardea cinerea)




Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo)




Bécassine des marais (Gallinago gallinago)




Sarcelle d'été (Anas querquedula)




Cygne tuberculé (Cygnus olor)




Cigogne blanche (Ciconia ciconia)




Oie cendrée (Anser anser)




Aigrette garzette (Egretta garzetta)




Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus)




Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)




Nette rousse (Netta rufina)




Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis)




Grand Gravelot (Charadrius hiaticula)




Courlis cendré (Numenius arquata)




Chevalier arlequin (Tringa erythropus)




Chevalier gambette (Tringa totanus)




Chevalier guignette (Actitis hypoleucos)




Bécasseau maubèche (Calidris canutus)




Bécasseau minute (Calidris minuta)




Bécasseau variable (Calidris alpina)




Pluvier argenté (Pluvialis squatarola)




Chevalier aboyeur (Tringa nebularia)




Bécasseau cocorli (Calidris ferruginea)




Barge à queue noire (Limosa limosa)




Petit Gravelot (Charadrius dubius)




Chevalier culblanc (Tringa ochropus)




Héron garde-boeufs (Bubulcus ibis)




Tournepierre à collier (Arenaria interpres)




Courlis corlieu (Numenius phaeopus)




Barge rousse (Limosa lapponica)




Combattant varié (Philomachus pugnax)




Vanneau huppé (Vanellus vanellus)




Spatule blanche (Platalea leucorodia)




Avocette élégante (Recurvirostra avosetta)




Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis)




Gallinule poule-d'eau (Gallinula chloropus)




Grèbe huppé (Podiceps cristatus)




Goéland leucophée (Larus michahellis)




Râle d'eau (Rallus aquaticus)




Goéland argenté (Larus argentatus)




Goéland marin (Larus marinus)




Échasse blanche (Himantopus himantopus)




Goéland brun (Larus fuscus)




Grande Aigrette (Casmerodius albus)




Faucon pèlerin (Falco peregrinus)




Busard des roseaux (Circus aeruginosus)




Ibis sacré (Threskiornis aethiopicus)



Milan noir (Milvus migrans)



Épervier d'Europe (Accipiter nisus)



Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis)

