



Pauta Interrogación 2

Problema 1

- (a) (3pts) Determine si la serie $\sum_{n=10}^{\infty} \frac{\cos(n\pi)}{\sqrt{n}}$ es condicionalmente convergente, absolutamente convergente ó divergente.
- (b) (3pts) Considere la sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ definida por

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{2 - \arctan(n^2)}{\sqrt{n}} a_n \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Determine si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge o no.

Solución

- (a) Notemos que $\cos(n\pi) = (-1)^n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, y por lo tanto

$$\sum_{n=10}^{\infty} \frac{\cos(n\pi)}{\sqrt{n}} = \sum_{n=10}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}.$$

Definiendo $b_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ para $n \in \mathbb{N}$, tenemos que

$$b_{n+1} \leq b_n \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \text{y} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0.$$

Por lo tanto, el criterio de la serie alternante implica que la serie $\sum_{n=10}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ converge. Por otro lado,

$$\sum_{n=10}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \right| = \sum_{n=10}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = \sum_{n=10}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{1}{2}}},$$

la cual es divergente dado que $\frac{1}{2} \leq 1$. En conclusión, la serie $\sum_{n=10}^{\infty} \frac{\cos(n\pi)}{\sqrt{n}}$ es condicionalmente convergente.

- (b) Notemos que $0 \leq \arctan(n^2) \leq \frac{\pi}{2} < 2$ para todo $n \in \mathbb{N}$, y por lo tanto

$$\frac{2 - \arctan(n^2)}{\sqrt{n}} > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Dado que $a_1 = 1$, por inducción se deduce fácilmente que $a_n > 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Para determinar si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge o no, utilizaremos el criterio de la razón. Para ello, calculamos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 - \arctan(n^2)}{\sqrt{n}} = 0,$$

donde usamos que $\lim_{n \rightarrow \infty} \arctan(n^2) = \frac{\pi}{2}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$ y álgebra de límites. Como $0 < 1$, deducimos que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.

Problema 2

(a) (2pts) Determine el dominio de la función definida por

$$f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(n!)^2 2^{2n}}.$$

(b) (2pts) Considere la serie de potencias

$$T(x) := x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots,$$

cuyo radio de convergencia es $+\infty$ (lo cual no debe demostrar). Escriba T como una suma infinita y muestre que satisface la ecuación

$$T''(x) - T(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

(c) Considere la función h definida por

$$h(x) := \begin{cases} e^{-\frac{1}{1-x^2}} & \text{si } x^2 < 1 \\ 0 & \text{si } x^2 \geq 1. \end{cases}$$

(i) (1pt) Sabiendo que $h^{(n)}$ es una función continua en \mathbb{R} para todo $n \in \mathbb{N}$, deduzca que $h^{(n)}(1) = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

★(ii) (1pt) ¿Existe un radio $R > 0$, para el cual h puede ser representada como su serie de Taylor en $x = 1$, es decir,

$$h(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{h^{(n)}(1)}{n!} (x-1)^n, \quad \text{para } |x-1| < R?$$

Justifique su respuesta.

Solución

- (a) Para determinar el dominio de f , debemos encontrar los x 's en \mathbb{R} para los cuales la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(n!)^2 2^{2n}}$ converge. Claramente para $x = 0$ la serie converge. Para $x \neq 0$, analizaremos la convergencia de la serie utilizando el criterio de la razón.

Usando que $(n+1)! = (n+1)n!$, tenemos, para $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ (fijo),

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(-1)^{n+1} x^{2(n+1)}}{((n+1)!)^2 2^{2(n+1)}}}{\frac{(-1)^n x^{2n}}{(n!)^2 2^{2n}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2}{(n+1)^2 2^2} = 0.$$

Por lo tanto, como $0 < 1$, por el criterio de la razón concluimos que la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(n!)^2 2^{2n}}$ converge para todo $x \in \mathbb{R}$, lo que implica que $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$.

- (b) Notar que

$$T(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Luego,

$$T'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)x^{2n}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

y

$$T''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)x^{2n-1}}{(2n)!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2(n+1)-1}}{(2(n+1)-1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = T(x).$$

Por lo tanto, $T''(x) - T(x) = 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

- (c) (i) Sea $n \in \mathbb{N}$. Notar que $\lim_{x \rightarrow 1^+} h^{(n)}(x) = 0$. Luego, como $h^{(n)}$ es una función continua en todo \mathbb{R} , $h^{(n)}(1) = \lim_{x \rightarrow 1} h^{(n)}(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} h^{(n)}(x) = 0$.

- (ii) No, no existe $R > 0$ tal que

$$h(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{h^{(n)}(1)}{n!} (x-1)^n, \quad \text{para } |x-1| < R. \quad (1)$$

Por la parte (i), sabemos que $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{h^{(n)}(1)}{n!} (x-1)^n \equiv 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Luego, como $h(x) > 0$ para $x \in (-1, 1)$, si existiera un $R > 0$ tal que (1), necesariamente $h(x) = 0$ para algún $x \in (-1, 1)$, lo cual es una contradicción.

Problema 3

(a) (3pts) Sean $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ vectores en \mathbb{R}^3 . Usando la identidad

$$\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w}) = (\vec{u} \cdot \vec{w})\vec{v} - (\vec{u} \cdot \vec{v})\vec{w} \quad \forall \vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \text{ vectores en } \mathbb{R}^3,$$

deduzca que

$$\vec{v}_1 \times (\vec{v}_2 \times \vec{v}_3) + \vec{v}_2 \times (\vec{v}_3 \times \vec{v}_1) + \vec{v}_3 \times (\vec{v}_1 \times \vec{v}_2) = 0.$$

(b) (3pts) Determine la ecuación del plano que es perpendicular a los planos

$$2x - y + 5z = 28 \quad \text{y} \quad x + 3y - z = 7$$

y cuya intersección con estos planos es $(-1, 5, 7)$.

Solución

(a) Usando la identidad, tenemos que

$$\begin{aligned}\vec{v}_1 \times (\vec{v}_2 \times \vec{v}_3) &= (\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_3)\vec{v}_2 - (\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2)\vec{v}_3 \\ \vec{v}_2 \times (\vec{v}_3 \times \vec{v}_1) &= (\vec{v}_2 \cdot \vec{v}_1)\vec{v}_3 - (\vec{v}_2 \cdot \vec{v}_3)\vec{v}_1 \\ \vec{v}_3 \times (\vec{v}_1 \times \vec{v}_2) &= (\vec{v}_3 \cdot \vec{v}_2)\vec{v}_1 - (\vec{v}_3 \cdot \vec{v}_1)\vec{v}_2.\end{aligned}$$

Por lo tanto, sumando obtenemos

$$\begin{aligned}\vec{v}_1 \times (\vec{v}_2 \times \vec{v}_3) + \vec{v}_2 \times (\vec{v}_3 \times \vec{v}_1) + \vec{v}_3 \times (\vec{v}_1 \times \vec{v}_2) \\ = [(\vec{v}_3 \cdot \vec{v}_2) - (\vec{v}_2 \cdot \vec{v}_3)]\vec{v}_1 + [(\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_3) - (\vec{v}_3 \cdot \vec{v}_1)]\vec{v}_2 + [(\vec{v}_2 \cdot \vec{v}_1) - (\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2)]\vec{v}_3 = 0,\end{aligned}$$

donde en la última igualdad utilizamos la conmutatividad del producto punto.

(b) Notemos que $\vec{u} := \langle 2, -1, 5 \rangle$ y $\vec{v} := \langle 1, 3, -1 \rangle$ son vectores normales a los planos $2x - y + 5z = 28$ y $x + 3y - z = 7$ respectivamente. Además, el vector $\vec{w} := \vec{u} \times \vec{v}$ es ortogonal tanto a \vec{u} como a \vec{v} . Por cálculo directo, tenemos

$$\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v} = \langle u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1 \rangle = \langle -14, 7, 7 \rangle,$$

por lo que el plano de ecuación

$$-14x + 7y + 7z + d = 0,$$

para cualquier $d \in \mathbb{R}$ (fijo) es ortogonal a los planos $2x - y + 5z = 28$ y $x + 3y - z = 7$. Finalmente, como el plano buscado pasa por el punto $(-1, 5, 7)$, encontramos d imponiendo que

$$-14(-1) + 7(5) + 7(7) + d = 0 \implies d = -98.$$

La ecuación del plano buscado es entonces

$$-14x + 7y + 7z - 98 = 0.$$

Asignación de puntajes

Problema 1

- (a) (i) (0.5pts) Escribe la serie como una serie alternante.
- (ii) (1pt) Aplica correctamente el criterio de la serie alternante (verificando sus hipótesis) para concluir que la serie es convergente.
- (iii) (1pt) Deduce correctamente que la serie no converge de manera absoluta.
- (v) (0.5pts) Concluye que la serie es condicionalmente convergente.
- (b) (i) (0.5pts) Argumenta que $a_n > 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$ (o bien que es distinto de 0 para todo $n \in \mathbb{N}$).
- (ii) (1pt) Utiliza el criterio de la razón para analizar la convergencia de la serie y concluye que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 - \arctan(n^2)}{\sqrt{n}}$.
- (iii) (1pt) Calcula correctamente el límite anterior utilizando propiedades de los límites.
- (iv) (0.5pts) Deduce que la serie es convergente.

Problema 2

- (a) (i) (0.2pts) Indica que la serie converge cuando $x = 0$.
- (ii) (0.7pt) Utiliza el criterio de la razón para analizar la convergencia de la serie y concluye que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2}{(n+1)^{2 \cdot 2^2}}$.
- (iii) (0.5pts) Concluye que el límite anterior es 0 para cualquier $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
- (iv) (0.3pts) Deduce que la serie es convergente para cualquier $x \in \mathbb{R}$.
- (v) (0.3pts) Deduce que $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$.
- (b) (i) (0.5pts) Escribe la serie como una suma infinita.
- (ii) (0.5pts) Calcula correctamente $T'(x)$.
- (iii) (0.5pts) Calcula correctamente $T''(x)$.
- (iv) (0.5pts) Deduce que $T''(x) - T(x) = 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.
- (c) (i) 1. (0.5pts) Justifica que $\lim_{x \rightarrow 1^+} h^{(n)}(x) = 0$.
- 2. (0.5pts) Utiliza correctamente la continuidad de $h^{(n)}$ y lo anterior para deducir que $h^{(n)}(1) = 0$.
- (c) ★(ii) 1. (0.2pts) Identifica que la serie de Taylor de h en $x = 1$ es la serie nula.
- 2. (0.2pts) Indica que $h(x) > 0$ para todo $x \in (-1, 1)$.
- 3. (0.6pts) Justifica correctamente a partir de lo anterior que no existe $R > 0$ para el cual se satisface la igualdad del enunciado.

Problema 3

- (a) (i) (1pt) Aplica correctamente la identidad para escribir los 3 productos cruz triples.
- (ii) (1pt) Suma correctamente las expresiones de los 3 productos cruz triples.
- (iii) (1pt) Concluye que la suma es 0 utilizando la conmutatividad del producto punto.

- (b) (i) **(0.5pts)** Identifica los vectores normales \vec{u} y \vec{v} a los planos $2x - y + 5z = 28$ y $x + 3y - z = 7$.
- (ii) **(1pt)** Calcula $\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v}$, señalando que el vector resultante es ortogonal a \vec{u} y \vec{v} .
- (iii) **(0.5pts)** Indica que el plano de ecuación $-14x + 7y + 7z + d = 0$ es ortogonal a los planos $2x - y + 5z = 28$ y $x + 3y - z = 7$, para cualquier $d \in \mathbb{R}$.
- (iv) **(0.5pts)** Calcula d a partir del hecho que el plano buscado pasa por el punto $(-1, 5, 7)$.
- (v) **(0.5pts)** Encuentra la ecuación del plano buscado.