Meningitis Weekly Bulletin

Inter country Support Team - West Africa

Semaine/Week 07

2020

Bulletin hebdomadaire de retro-information sur la méningite cérébrospinale Weekly feedback bulletin on cerebrospinal meningitis

10th to 16th February 2020

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA SEMAINE 07 / EPIDEMIOLOGICAL SITUATION OF WEEK 07

Table 1: Situation épidémiologique / Epidemiological Situation

Pays	Cas	Décès	Létalité (%)	District en Alerte	District en Epidémie	Complétude (%)	
Country	Cases	Deaths	CFR (%)	District in Alert	District in Epidemic	Completeness (%)	
Bénin	20	1	5.0	1	0	100.0	
Burkina Faso	47	4	8.5	0	0	100.0	
Burundi	-	-	-	-	-	-	
Cameroun	11	0	0.0	1	0	82.6	
Centrafrique	21	1	4.8	1	0	77.1	
Côte d'Ivoire	2	0	0.0	0	0	100.0	
Ethiopia	-	-	-	-	-	-	
Ghana	33	5	15.2	3	0	50.0	
Guinée	10	0	0.0	0	0	100.0	
Guinée Bissau	-	-	-	-	-	-	
Gambia	3	0	0.0	0	0	100.0	
Kenya	-	-	-	-	-	-	
Mali	7	0	0.0	0	0	100.0	
Mauritanie	0	0	0.0	0	0	100.0	
Niger	4	0	0.0	0	0	100.0	
Nigeria	15	0	0.0	0	0	100.0	
RD Congo ^{p**}	156	15	9.6	-	-	14.2	
Sénégal	-	-	-	-	-	-	
South Sudan	2	0	0.0	0	0	100.0	
Sudan	1	0	0.0	0	0	100.0	
Tanzania	0	0	0.0	0	0	100.0	
Tchad	-	-	-	-	-	-	
Togo	13	0	0.0	0	0	97.7	
Uganda	-	-	-	-	-	-	
Total	345	26	7.5	6	0	49.8	

^{**} La vaste majorité du territoire de la République Démocratique du Congo se situe en dehors de la ceinture africaine de la méningite. Par conséquent, les seuils d'alerte et d'épidémie ne sont pas applicables / The majority of the Democratic Republic of the Congo territory is situated outside the African meningitis belt. Thus the alert and epidemic thresholds are not applicable.

Nous contacter / Contact us:

WHO Inter country Support Team - West Africa / Equipe OMS d'Appui Inter-Pays pour l'Afrique de l'Ouest 03 BP 7019 Ouagadougou 03, Burkina Faso

Tel: (226) 25-30-65-65, Fax: (226) 25-33-25-41

E.mail: bwakaa@who.int; or linganic@who.int;
Site web/Web site: http://www.who.int/csr/disease/meningococcal/epidemiological/en/

Nota bene: Les données publiées dans ce bulletin sont des informations hebdomadaires. Elles sont susceptibles d'évoluer après complétude et vérification./The data published in this bulletin are weekly information. They are

susceptible to change after completeness and verification.

Pays sous Surveillance Renforcée de la Méningite


Countries under Enhanced Surveillance of Meningitis





Figure 1: Cartographie des taux d'attaque de la semaine en cours / Mapping of attack rate for the current week

(Semaine/ Week 07, 2020)



Commentaires:

A la semaine 7 de l'année 2020, aucun district n'a franchi le seuil épidémique et 6 districts dans 4 pays ont franchi le seuil d'alerte :

- Bénin: Le district de Gogounou dans la région de l'Alibori avec un taux d'attaque (TA) de 3,3 cas suspects pour 100 000 habitants a franchi le seuil d'alerte.
- Cameroun : Le district de Kette dans la région de l'Est a franchi le seuil d'alerte avec un TA de 3,1.
- Centrafrique: Le district de Kouango-Grimari dans la région 5 a franchi le seuil d'alerte avec un TA de 8,2.
- Ghana: Dans la région du Bono East, le district de Pru est resté en alerte avec un TA de 5,2; Dans la région du Upper West, le district de Nadowli avec un TA de 4,5 et dans la région Northern, le district de Zabzugu avec un TA de 3,6 ont franchi le seuil d'alerte.

Comments:

On week 7 of 2020, no district reached the epidemic threshold while 6 districts in 4 countries reached the alert threshold:

- Benin: The district of Gogounou in the Alibori Region reached the alert threshold with an attack rate (AR) of 3.3 suspected cases per 100,000 populations.
- In Cameroon: The district of Kette in the East Region crossed the alert threshold with an AR of 3.1.
- In Central Africa Republic: The district of Kouango-Grimari in the Region 5 crossed the alert threshold with an AR of 8.2.
- Ghana: In the Bono East Region, Pru district remained in alert with an AR of 5.2; In the Upper West region, Nadowli district with an AR of 4.5 and in the Northern Region, Zabzugu district with an AR of 3.6 reached the alert threshold.

SYNTHÈSE DE LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE / SUMMARY OF THE EPIDEMIOLOGICAL SITUATION II. (Semaines notifiées / Reported weeks 01 - 07, 2020)

Table 2: Synthèse de la situation épidémiologique/Summary of the Epidemiological situation

Pays	Cas	Décès	Létalité	District	District en	Semaines	En districts	En semaines(%)
			(%)	en Alerte District in	Epidémie District in	notifiées	(%) In districts	22 2 22(13)
Country	Cases	Deaths	CFR (%)	Alert	Epidemic	Reported weeks	(%)	In weeks(%)
Bénin	126	10	7.9	5	1	01-07	100.0	100.0
Burkina Faso	246	11	4.5	0	0	01-07	100.0	100.0
Burundi	21	0	0.0	0	0	01-06	100.0	100.0
Cameroun	162	13	8.0	9	0	01-07	83.7	98.9
Centrafrique	107	2	1.9	5	0	01-07	88.6	93.5
Côte d'Ivoire	34	2	5.9	0	0	01-07	100.0	100.0
Ethiopia	-	-	-	-	-	-	-	-
Ghana	179	16	8.9	7	1	01-07	50.0	100.0
Guinée	77	2	2.6	1	0	01-07	100.0	100.0
Guinée Bissau	-	-	-	-	-	-	-	-
Gambia	5	0	0.0	0	0	01-07	100.0	99.7
Kenya	-	-	-	-	-	-	-	-
Mali	84	0	0.0	0	0	01-07	100.0	100.0
Mauritanie	0	0	0.0	0	0	01-07	100.0	100.0
Niger	44	4	9.1	1	0	01-07	100.0	100.0
Nigeria	83	1	1.2	0	0	01-07	100.0	100.0
RD Congo ^{P**}	1 141	77	6.7	-	-	01-07	16.7	90.9
Sénégal	83	3	3.6	3	0	01-04	100.0	100.0
South Sudan	9	0	0.0	0	0	01-07	100.0	100.0
Sudan	18	0	0.0	0	0	01-07	100.0	100.0
Tanzania	4	0	0.0	0	0	01-07	100.0	100.0
Tchad	59	3	5.1	2	0	01-04	100.0	100.0
Togo	69	0	0.0	0	0	01-07	97.7	100.0
Uganda	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	2 551	144	5.6	33	2	01-07	55.8	99.5

La vaste majorité du territoire de la République Démocratique du Congo se situe en dehors de la ceinture africaine de la méningite. Par conséquent, les seuils d'alerte et d'épidémie ne sont pas applicables / The majority of the Democratic Republic of the Congo territory is situated outside the African meningitis belt. Thus the alert and epidemic thresholds are not applicable

Commentaires:

2 551 cas suspects dont 144 décès ont été rapportés par les pays; soit une létalité de attendues.


districts de plus de 100.000 habitants sans 100,000 inhabitants without subdivision. We habitants afin de faciliter la détection précoce early detection of potential outbreaks. d'éventuelles flambées.

Comments:

2,551 suspected cases including 144 deaths have been reported by countries, making a case fatality 5,6%. Les données des autres pays sont rate of 5.6%. Data from the other countries are expected.

On a remarqué que l'analyse des seuils It was noted that the analysis of epidemiological épidémiologiques est faite dans de nombreux thresholds is made in many districts of more than subdivision. Nous encourageons les pays à encourage countries to subdivide the districts of subdiviser les districts de plus de 100.000 more than 100,000 inhabitants so as to facilitate

<u>Figure 2</u>: Cartographie récapitulative des taux d'attaque de la Méningite / *Map summarizing Meningitis attack rates* (Semaine / Week 01 - 07), 2020



The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression for any opinion whatsoever on the part of World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

III. SYNTHÈSE DES DONNEES DE LABORATOIRE PAR PAYS / SUMMARY OF LABORATORY DATA BY COUNTRY

Table 3: Pathogènes identifiés/Pathogens identified

(Semaines notifiées / Reported weeks 01 - 07, 2020)

Pays	Nombre LCR	contam		LCR negatives	NmA	NmB	NmC	NmX	NmY	Nm W	Autres Nm ind.	S.Pneum	Hib	Autres Pathogènes
Country	Number CSF	CSF contam	In process	CSF negative	NmA	Nm <i>B</i>	NmC	NmX	NmY .	Nm W	Other Nm ind.	S.Pneum	Hib	Other Pathogens
Bénin	126	0	0	95	0	0	14	7	0	2	0	7	1	0
Burkina Faso	108	0	0	102	0	0	0	0	0	1	0	4	1	0
Burundi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cameroun	13		0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centrafrique	52	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Côte d'Ivoire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ethiopia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ghana	169	0	0	142	0	0	0	0	0	1	0	20	2	4
Guinée	35	0	0	29	0	1	0	0	0	1	0	0	4	0
Guinée Bissau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gambia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kenya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mali	74	0	0	62	0	0	1	0	0	0	0	5	6	0
Mauritanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Niger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nigéria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RD Congo ^{P**}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sénégal	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
South Sudan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sudan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanzania	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tchad	88	2	51	20	0	0	0	0	0	1	0	12	2	0
Togo	142	0	0	137	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0
Uganda	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	812	2	51	657	0	1	15	7	1	6	0	52	16	4

Pathogènes identifiés par /Pathogens identified by: PCR, LATEX, CULTURE

Commentaires:

Les principaux germes identifiés par les Spn (51.0%), Hib (15.7%), NmC (14.7%), NmX laboratoires des pays à ce jour sont le Spn (6.9%), and NmW (5.9%) are the main (51.0%), Hib (15,7%), NmC (14,7%), NmX (6,9%), pathogens identified so far by country et NmW (5,9%).

Les pays sont priés de renforcer la confirmation Countries are urged to strengthen laboratory des cas suspects par le laboratoire et de partager confirmation of suspected cases and share the les résultats.

méningite, au moins 50% des cas suspects doivent faire l'objet de prélèvement d'échantillons de LCR et d'analyse par le laboratoire. Les milieux de transport TI sont disponibles pour les pays au niveau l'IST-WA sur demande.

Comments:

laboratories.

results.

Dans le cadre de la surveillance renforcée de la In the framework of Enhanced meningitis surveillance, it is expected that at least 50% of suspected cases should be subjected to CSF samples collection and laboratory testing. Trans Isolate (TI) media are available at IST-WA upon country requests.



P = Pays partiellement vacciné avec le MenAfriVac/ Country partially vaccinated with MenAfriVac

T= Pays entièrement vacciné avec le MenAfriVac / Country entirely vaccinated with MenAfriVac

Mauritania Sudan Niger Mali Sénégal Republic of Chad Burkina Faso Nigeria Guinea Gh<u>a</u>na ^l Çote d'Ivoire South Sudan Ethiopia Central African Republic Legend Cameroon NmW Democratic Republic of the Congo NmC NmX The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression for any opinion whatsoever on the part of World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or

boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

<u>Figure 3</u>: Cartographie des principaux germes de la Méningite / Map of Meningitis main pathogens (Semaines notifiées / Reported weeks 01 - 07, 2020)



Introduction - MenAfriVac

Introduction du MenAfriVac dans les pays de la ceinture de la méningite de 2010-2020

Au Nigéria, d'octobre 2019 à janvier 2020 la campagne de rattrapage avec MenAfriVac combinée au vaccin contre la rougeole ciblant les enfants âgés de 1 à 7 ans a été mise en œuvre dans 16 Etats (Adamawa, Bauchi, Benue, Borno, Gombe, Jigawa, Kaduna, Katsina, Kebbi, Kwara, Nasarawa, Plateau, Sokoto, Taraba, Zamfara & FCT) tandis que 3 autres Etats ont conduit une campagne uniquement avec le MenAfriVac (Kano, Enugu et Imo). Le nombre total d'enfants vaccinés dans tous ces Etats était de 25 057 928 sur un objectif de 25 261 679 avec une couverture administrative de 99.2%. La couverture vaccinale à l'issue de l'enquête post-campagne a montré une couverture de 88.9%.

Les six États restants (Kogi, Niger, Anambra, Oyo, Cross River et Ebonyi) préparent le rattrapage des enfants au cours de cette année.

En Erythrée, avec une cible de 2 659 089 personnes âgées de 1-29 ans à vacciner avec MenAfriVac, l'enquête post campagne a montré une couverture vaccinale de 99.4%. Quant à la couverture post campagne de supplémentation de la vitamine A, elle était de 98.5% pour une cible de 455 000 enfants âgés de 6-59 mois.

Les pays qui n'ont pas encore soumis leurs applications à GAVI pour l'introduction de MenAfriVac dans la vaccination de routine, sont priés de le faire afin de contribuer à l'élimination à long terme de la méningite A.

MenAfriVac - Introduction

MenAfriVac Introduction in the meningitis belt countries from 2010-2020

In Nigeria, from October 2019 to January 2020, the catch-up campaign with MenAfriVac combined with the measles vaccine targeting children aged 1 to 7 years was implemented in 16 States (Adamawa, Bauchi, Benue, Borno, Gombe, Iigawa, Kaduna, Katsina, Kebbi, Kwara, Nasarawa, Plateau, Sokoto, Taraba, Zamfara & FCT) while 3 other states ran a campaign only with MenAfriVac (Kano, Enugu and Imo). The total number of children vaccinated in all these states was 25,057,928 out of a target of 25,261,679 with 99.2% administrative coverage. Immunization post-campaign survey showed 88.9% coverage.


The remaining six states (Kogi, Niger, Anambra, Oyo, Cross River and Ebonyi) are preparing to catch up with children this year.

In Eritrea, with a target of 2,659,089 people aged 1-29 years to be vaccinated with MenAfriVac, the immunization post-campaign survey showed 99.4% coverage. As for post-campaign vitamin A supplementation coverage, it was 98.5% for a target of 455,000 children aged 6-59 months.

All countries that have not yet submitted their applications to GAVI for MenAfriVac introduction in routine immunization are urged to do so, in order to contribute to the long-term elimination of meningitis A in the Region.



Figure 4: Introduction du MenAfriVac dans les pays de la ceinture de la méningite, 2010-2020/ MenAfriVac Introduction in the meningitis belt countries, 2010-2020



IV. GRAPHIQUE DES DONNEES DE SURVEILLANCE/SURVEILLANCE DATA GRAPHS

Figure 5: Evolution hebdomadaire comparative par pays, 2019 et 2020

(Uniquement les pays ayant transmis des données pour la semaine en cours)

Comparative weekly evolution by country, 2018 versus 2019

(Only countries that transmitted data during the current week)

