

Definiciones operacionales:

Caso probable de sarampión o rubéola: Toda persona de cualquier edad que presente fiebre y exantema maculopapular, y uno o más de los siguientes signos y síntomas: tos, coriza, conjuntivitis o adenomegalias (retroauriculares, occipitales o cervicales). La confirmación de los casos probables es a través de técnicas de laboratorio reconocidas por el InDRE o por asociación epidemiológica con un caso confirmado por laboratorio.

Situación epidemiológica en la Región de las Américas


Tabla 1. Casos confirmados de sarampión en la Región de las Américas entre las semanas 1-18, 2025

País	Casos confirmados 2025			Total casos confirmados
	Clin	Lab	Aso. Epi	
BOL	0	1	---	1
BRA	0	5	---	5
CAR	0	2	---	2
MEX	0	990	13	1,003
CAN	256	1,591	---	1,847
USA*	0	1,046	---	1,046
ARG	0	21	1	22
TOTAL	256	3,656	14	3,926

Fuente: OPS. Boletín biSemanal de Sarampión-Rubeola (17-18) - 3 de mayo del 2025. Disponible en: <https://shorturl.at/5PTFT>
*CDC. Measles (Rubeola). 23 de mayo de 2025. Disponible en: <https://shorturl.at/61TwD>.

Situación epidemiológica en México


De acuerdo con la distribución de casos probables y confirmados de sarampión por semana epidemiológica (SE), con base en la fecha de inicio de exantema (gráfico 1), el primer caso confirmado de sarampión se notificó en la SE 5; en la SE 21 se han notificado 404 casos probables y 50 confirmados, al día de hoy se han reportado 30 casos probables.



Los casos confirmados de sarampión afectan a ambos sexos (48% hombres y 52% mujeres). En cuanto al número de casos, el principal grupo de edad afectado es de 0 a 4 años de edad (332 casos), seguido de 25 a 29 (268 casos) y 30 a 34 años con 256 casos (gráfica 2).

En cuanto a tasa de incidencia, el grupo de edad de 0 a 4 años reportó la mayor tasa de incidencia (3.19 casos por cada 100,000 habitantes menores de 4 años), seguido del grupo de 25 a 29 años y 30 a 34 años con una tasa de incidencia de 2.53 y 2.45 respectivamente.

Gráfica 2. Casos confirmados de sarampión por sexo, grupo de edad y tasa de incidencia, México 2025




Información preliminar con corte al 28 de mayo de 2025
Fuente: SSA/DGE/DVEET/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

Al día de hoy se han reportado 1,860 casos confirmados de sarampión acumulados; en las últimas 24 horas se reportaron 24 casos.

Con base en la distribución de casos confirmados de sarampión por entidad federativa y municipios (mapa 1), 17 estados y 57 municipios tienen casos confirmados de sarampión.

Mapa 1. Casos confirmados de sarampión por entidad federativa y municipios de residencia, 28 de mayo 2025, México.



Fuente: SSA/DGE/DVEET/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

Tabla 2. Situación actual de sarampión en México por estado, 2025.

Estados	Casos probables acumulados	Casos confirmados en las últimas 24 hrs	Casos confirmados acumulados	Defunciones	Tasa de incidencia x100,000 hab	Tasa de letalidad
Chihuahua	2967	24	1717	3	42.26	0.17%
Sonora	116	0	43	1	1.37	2.33%
Zacatecas	78	0	17	0	0.99	-
Coahuila	68	0	10	0	0.29	-
Tamaulipas	69	0	9	0	0.23	-
Durango	69	0	8	0	0.42	-
Campeche	28	0	6	0	0.63	-
Guerrero	32	0	5	0	0.14	-
Oaxaca	41	0	4	0	0.09	-
Michoacán	57	0	3	0	0.06	-
Guanajuato	304	0	2	0	0.03	-
San Luis Potosí	60	0	1	0	0.03	-
Quintana Roo	27	0	1	0	0.05	-
Sinaloa	26	0	1	0	0.03	-
Querétaro	54	0	1	0	0.04	-
Yucatán	18	0	1	0	0.03	-
Tabasco	33	0	1	0	0.04	-

Información preliminar con fecha de 28 de mayo de 2025
Fuente: SSA/DGE/DVEET/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

Número de defunciones reportadas: 4 (cuatro)

⇒✳️ Para mayor información, consultar el Boletín informativo: “Situación epidemiológica de Enfermedades Prevenibles por Vacunación en México” ✳️⇐



Salud
Secretaría de Salud

Subsecretaría de Políticas
de Salud y Bienestar
Poblacional

Dirección General
de Epidemiología