

Definiciones operacionales:

**Caso probable de sarampión o rubéola:** Toda persona de cualquier edad que presente fiebre y exantema maculopapular, y uno o más de los siguientes signos y síntomas: tos, coriza, conjuntivitis o adenomegalias (retroauriculares, occipitales o cervicales). La **confirmación de los casos probables** es a través de técnicas de laboratorio reconocidas por el InDRE o por asociación epidemiológica con un caso confirmado por laboratorio.

Situación epidemiológica en la Región de las Américas

Tabla 1. Casos confirmados de sarampión en la Región de las Américas entre las semanas 1-20, 2025


País	Casos confirmados 2025			Total casos confirmados
	Clin	Lab	Aso. Epi	
BOL	0	1	---	1
BRA	0	5	---	5
CAR	0	2	5	7
MEX	0	1,888	38	1,926
CAN	273	1,494	1,201	2,968
USA*	0	1,168	---	1,168
ARG	0	32	1	33
TOTAL	273	4,590	1,245	6,108

Fuente: OPS. Boletín biSemanal de Sarampión-Rubéola (19-20) - 10 de junio del 2025. Disponible en: <https://shorturl.at/5PTFT>  
\*CDC. Measles (Rubéola). 05 de junio de 2025. Disponible en: <https://shorturl.at/61TWd>.

Situación epidemiológica en México

De acuerdo con la distribución de casos probables y confirmados de sarampión por semana epidemiológica (SE), con base en la fecha de inicio de exantema (gráfico 1), el **primer caso confirmado de sarampión se notificó en la SE 5**; en la SE 23 se han notificado 388 casos probables y 63 confirmados, **al día de hoy se han reportado 39 casos probables**.

Gráfica 1. Casos probables y confirmados de sarampión por semana epidemiológica y fecha de inicio de exantema, México 2025




Línea punteada: Con información preliminar al corte de 11 de junio de 2025.  
Fuente: SSA/DGE/DVEET/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

Los casos confirmados de sarampión afectan a ambos sexos (47% hombres y 53% mujeres). En cuanto al número de casos, el **principal grupo de edad afectado es de 0 a 4 años de edad (408 casos)**, seguido de 25 a 29 (327 casos) y 30 a 34 años con 285 casos (gráfica 2).

En cuanto a tasa de incidencia, el **grupo de edad de 0 a 4 años reportó la mayor tasa de incidencia (3.92 casos por cada 100,000 habitantes** menores de 4 años), seguido del grupo de 25 a 29 años y 30 a 34 años con una tasa de incidencia de 3.08 y 2.73 respectivamente.

Gráfica 2. Casos confirmados de sarampión por sexo, grupo de edad y tasa de incidencia, México 2025




Información preliminar con corte al 11 de junio de 2025  
Fuente: SSA/DGE/DVEET/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

Al día de hoy se han reportado **2,216 casos confirmados de sarampión acumulados; en las últimas 24 horas se reportaron 35 casos**.

Con base en la distribución de casos confirmados de sarampión por entidad federativa y municipios (mapa 1), **18 estados y 58 municipios tienen casos confirmados de sarampión**.

Mapa 1. Casos confirmados de sarampión por entidad federativa y municipios de residencia, 11 de junio 2025, México.



Fuente: SSA/DGE/DVEET/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

Tabla 2. Situación actual de sarampión en México por estado, 2025.

Estados	Casos probables acumulados	Casos confirmados en las últimas 24 hrs	Casos confirmados acumulados	Defunciones	Tasa de incidencia x100,000 hab	Tasa de letalidad	Poblaciones
Chihuahua	3432	32	2065	4	50.82	0.19%	4063124
Sonora	169	0	69	1	2.20	1.45%	3140762
Zacatecas	92	0	19	0	1.11	-	1713144
Tamaulipas	75	0	12	0	0.31	-	3848619
Coahuila	86	0	10	0	0.29	-	3400257
Durango	97	0	9	0	0.47	-	1927128
Campeche	34	0	6	0	0.63	-	958867
Michoacán	86	0	5	0	0.10	-	5045030
Guerrero	39	0	5	0	0.14	-	3607434
Oaxaca	43	0	4	0	0.09	-	4339377
Baja California Sur	26	0	3	0	0.33	-	904052
Guanajuato	346	0	2	0	0.03	-	6537669
Sinaloa	36	0	2	0	0.06	-	3187466
Quintana Roo	34	0	1	0	0.05	-	2101638
San Luis Potosi	73	0	1	0	0.03	-	2979785
Queretaro	56	0	1	0	0.04	-	2654421
Yucatan	29	0	1	0	0.03	-	3747791
Tabasco	42	0	1	0	0.04	-	2467519

Información preliminar con fecha de 11 de junio de 2025  
Fuente: SSA/DGE/DVEET/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

Número de defunciones reportadas: 5 (cinco)

➡️🌟 Para mayor información, consultar el Boletín informativo: “Situación epidemiológica de Enfermedades Prevenibles por Vacunación en México” 🌟➡️



Salud  
Secretaría de Salud

Subsecretaría de Políticas  
de Salud y Bienestar  
Poblacional

Dirección General  
de Epidemiología