Definiciones operacionales:

Caso probable de sarampión o rubéola: Toda persona de cualquier edad que presente fiebre y exantema maculopapular, y uno o más de los siguientes signos y síntomas: tos, coriza, conjuntivitis o adenomegalias (retroauriculares, occipitales o cervicales). La confirmación de los casos probables es a través de técnicas de laboratorio reconocidas por el InDRE o por asociación epidemiológica con un caso confirmado por laboratorio.

Situación epidemiológica en la Región de las Américas

Tabla 1. Casos confirmados de sarampión en la Región de las Américas entre las semanas 1-20, 2025


País	Ca	sos confirma	Total casos		
	Clin	Lab	Aso. Epi	confirmados	
BOL	0	1		1	
BRA	0	5		5	
CAR	0	2	5	7	
MEX	0	1,888	38	1,926	
CAN	273	1,494	1,201	2,968	
USA*	0	1,197		1,197	
ARG	0	32	1	33	
TOTAL	273	4,619	1,245	6,137	

Fuente: OPS. Boletín biSemanal de Sarampión-Rubéola (19-20) - 10 de junio del 2025. Disponible en: https://shorturl.at/5PTFT *CDC. Measles (Rubéola). 12 de junio de 2025. Disponible en: https://shorturl.at/61TwD.

Situación epidemiológica en México

De acuerdo con la distribución de casos probables y confirmados de sarampión por semana epidemiológica (SE), con base en la fecha de inicio de exantema (gráfico 1), el **primer caso confirmado de sarampión se notificó en la SE 5**; en la SE 24 se han notificado 328 casos probables y 48 confirmados, al día de hoy se han reportado 7 casos probables.

Gráfica 1. Casos probables y confirmados de sarampión por semana epidemiológica y fecha de inicio de exantema, México 2025




Línea punteada: Con información preliminar al corte de 17 de junio de 2025. **Fuente:** SSA/DGE/DVEET/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

Los casos confirmados de sarampión afectan a ambos sexos (48% hombres y 52% mujeres). En cuanto al número de casos, el **principal grupo de edad afectado** es de **0 a 4 años de edad (477casos)**, seguido de 25 a 29 (366 casos) y 30 a 34 años con 312 casos (gráfica 2).

En cuanto a tasa de incidencia, el **grupo de edad de 0 a 4 años reportó la mayor tasa de incidencia (4.58 casos por cada 100,000 habitantes** menores de 4 años), seguido del grupo de 25 a 29 años y 30 a 34 años con una tasa de incidencia de 3.45 y 2.99 respectivamente.

Gráfica 2. Casos confirmados de sarampión por sexo, grupo de edad y tasa de incidencia, México 2025




Información preliminar con corte al 17 de junio de 2025 **Fuente:** SSA/DGE/DVEET/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

Al día de hoy se han reportado **2,462 casos confirmados de sarampión acumulados; en las últimas 24 horas se reportaron 28 casos.**

Con base en la distribución de casos confirmados de sarampión por entidad federativa y municipios (mapa 1), **18 estados y 58 municipios tienen casos confirmados de sarampión.**

Mapa 1. Casos confirmados de sarampión por entidad federativa y municipios de residencia, 17 de junio 2025, México.



Fuente: SSA/DGE/DVEET/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

Tabla 2. Situación actual de sarampión en México por estado, 2025.

Estados	Casos probables acumulados	Casos confirmados en las últimas 24 hrs		Defunciones	Tasa de incidencia x100,000 hab	Tasa de letalidad	Poblaciones
Chihuahua	3627	25	2290	4	56.4	0.17%	4063124
Sonora	192	0	73	1	2.32	1.37%	3140762
Zacatecas	99	0	19	0	1.11	-	1713144
Tamaulipas	79	0	12	0	0.31	-	3848619
Coahuila	95	1	12	0	0.35	-	3400257
Durango	111	2	15	0	0.78	-	1927128
Campeche	35	0	6	0	0.63	-	958867
Michoacán	98	0	13	0	0.26	-	5045030
Guerrero	41	0	5	0	0.14	-	3607434
Oaxaca	44	0	4	0	0.09	-	4339377
Baja California Sur	30	0	3	0	0.33	-	904052
Guanajuato	361	0	2	0	0.03	-	6537669
Sinaloa	41	0	2	0	0.06	-	3187466
Quintana Roo	38	0	2	0	0.10	-	2101638
San Luis Potosi	81	0	1	0	0.03	-	2979785
Queretaro	59	0	1	0	0.04	-	2654421
Yucatán	30	0	1	0	0.03	-	3747791
Tabasco	43	0	1	0	0.04	-	2467519

Información preliminar con fecha de 17 de junio de 2025 **Fuente:** SSA/DGE/DVEET/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

Número de defunciones reportadas: 5 (cinco)



Para mayor información, consultar el Boletín informativo: "Situación epidemiológica de Enfermedades Prevenibles por Vacunación en México" 🔆 🖶