





Bollettino N. 13 del 19 settembre 2024 RISULTATI NAZIONALI

- 0 In Evidenza
- 1 Sorveglianza umana
- 2 Sorveglianza equidi
- 3 Sorveglianza uccelli bersaglio
- 4 Sorveglianza uccelli selvatici
- 5 Sorveglianza entomologica
- 6 Sorveglianza avicoli
- 7 Sorveglianza Usutu virus
- Piano nazionale prevenzione, sorveglianza e risposta arbovirosi (PNA) 2020-2025






In Evidenza (1)

Questo numero del bollettino riassume i risultati delle attività di sorveglianza nei confronti del virus del West Nile e del virus Usutu in Italia, aggiornati al **18-09-2024**.

- Cinquantuno nuovi casi umani di West Nile Virus sono stati segnalati nel periodo 12 - 18 settembre 2024. Dall'inizio di maggio 2024, sono stati segnalati in Italia 382 casi confermati di infezione da West Nile Virus (WNV) nell'uomo (331 nel precedente bollettino); di questi 222 si sono manifestati nella forma neuroinvasiva (12 Piemonte, 9 Lombardia, 38 Veneto, 5 Friuli-Venezia Giulia, 131 Emilia-Romagna, 1 Lazio, 2 Abruzzo, 11 Campania, 2 Puglia, 2 Calabria, 1 Sardegna, 2 casi importati dagli Stati Uniti, 5 dall'Albania e 1 caso dalla Romania), 45 casi asintomatici identificati in donatori di sangue (2 Piemonte, 10 Lombardia, 14 Veneto, 2 Friuli-Venezia Giulia, 16 Emilia-Romagna, 1 Campania), 114 casi di febbre (3 Piemonte, 3 Lombardia, 69 Veneto, 4 Friuli-Venezia Giulia, 30 Emilia-Romagna, 1 Calabria, 1 caso importato da Oman e 1 dal Marocco), 1 caso asintomatico (1 Emilia-Romagna).
- Tra i casi confermati sono stati notificati 16 decessi (3 Piemonte, 1 Lombardia, 7 Veneto, 1 Friuli-Venezia Giulia, 3 Emilia-Romagna, 1 Calabria).
- Il primo caso umano autoctono di infezione da WNV della stagione è stato segnalato dall'Emilia-Romagna il 26 giugno nella provincia di Modena.
- Nello stesso periodo sono stati segnalati 2 casi di Usutu virus (1 in provincia di Modena, 1 in provincia di Latina).
- La sorveglianza veterinaria attuata su cavalli, zanzare, uccelli stanziali e selvatici, ha confermato la circolazione del WNV in Abruzzo, Campania, Toscana, Puglia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Sardegna, Emilia-Romagna, Marche* e Lombardia. Le analisi molecolari hanno confermato la circolazione del WNV Lineage 1 e
 2..

Figura 1. Province con dimostrata circolazione di WNV in vettori, animali e uomo (donatori asintomatici, febbri e casi neuroinvasivi confermati)



Salgono a **45** le **Province** con dimostrata circolazione di WNV appartenenti a **12 Regioni**: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sardegna (vedi tabella a pagina successiva).

^{*} Verosimilmente si tratta di un'infezione contratta nel continente africano.







Data di prima positività per WNV autoctono nelle Provincie in vettori, animali e uomo (donatori asintomatici, febbri e casi neuroinvasivi confermati)

Provincia	Data prima positività	Ambito
Chieti	19-giu-24	vettori, animali
Modena	26-giu-24	umano
Parma	01-lug-24	vettori, animali
Ferrara	02-lug-24	vettori, animali
Ravenna	02-lug-24	vettori, animali
	05-lug-24	vettori, animali
Bologna Boggio Emilia	09-lug-24	vettori, animali
Reggio Emilia Mantova	09-1ug-24	vettori, animali
		· ·
Rovigo	11-lug-24	vettori, animali
Brescia	16-lug-24	vettori, animali
Cremona	16-lug-24	vettori, animali
Pordenone	17-lug-24	umano
Venezia	17-lug-24	vettori, animali
Udine	18-lug-24	vettori, animali
Taranto	19-lug-24	umano
Padova	24-lug-24	vettori, animali
Rimini	25-lug-24	vettori, animali
Verona	26-lug-24	vettori, animali
Barletta-Andria-Trani	26-lug-24	umano
Treviso	26-lug-24	umano
Piacenza	29-lug-24	umano
Varese	31-lug-24	vettori, animali
Lecce	02-ago-24	vettori, animali
Torino	02-ago-24	vettori, animali
Oristano	02-ago-24	vettori, animali
Forlì-Cesena	02-ago-24	vettori, animali
Salerno	06-ago-24	vettori, animali
Cuneo	07-ago-24	vettori, animali
Alessandria	08-ago-24	vettori, animali
Cosenza	09-ago-24	umano
Como	09-ago-24	vettori, animali
Massa Carrara	09-ago-24	vettori, animali
Novara	14-ago-24	vettori, animali
Benevento	19-ago-24	umano
Gorizia	19-ago-24	vettori, animali
Roma	21-ago-24	umano
Asti	22-ago-24	vettori, animali
Vicenza	30-ago-24	vettori, animali
Sassari	02-set-24	vettori, animali
Grosseto	02-set-24	vettori, animali
Pavia	02-set-24	vettori, animali
Bergamo	05-set-24	vettori, animali
Sud Sardegna	05-set-24	vettori, animali
Vercelli	11-set-24	vettori, animali
Lodi	13-set-24	umano
2001	13 300 21	dilidilo







Sorveglianza umana

Da maggio 2024, inizio della sorveglianza, sono stati segnalati in Italia 382 casi umani confermati da West Nile Virus (WNV), 222 dei quali hanno manifestato sintomi neuro-invasivi (Tabella 1), 45 casi asintomatici identificati in donatori di sangue (2 Alessandria, 1 Benevento, 4 Bologna, 2 Brescia, 2 Cremona, 6 Mantova, 10 Modena, 7 Padova, 2 Parma, 2 Rovigo, 3 Treviso, 2 Udine, 2 Verona), 114 casi di febbre (2 Alessandria, 5 Bologna, 1 Cosenza, 1 Cremona, 1 Ferrara, 1 Forlì-Cesena, 2 Mantova, 16 Modena, 27 Padova, 2 Parma, 1 Piacenza, 1 Pordenone, 4 Reggio Emilia, 11 Rovigo, 1 Torino, 11 Treviso, 3 Udine, 11 Venezia, 8 Verona, 1 Vicenza, 1 importato dall'Oman e 1 dal Marocco), 1 caso asintomatico (1 Reggio Emilia). Di seguito è riportata la descrizione delle sole forme neuro-invasive.

Tabella 1. Distribuzione dei casi confermati di WNND autoctoni per provincia di esposizione e fascia di età. Italia: 2024

ovincia di esposi Alessandria Asti Cuneo Torino Lodi Mantova	(n=12)	<=14	15-44	45-64	65-74 1 1	>=75	- Totale
Asti Cuneo Torino Lodi Mantova							3
Asti Cuneo Torino Lodi Mantova	(n=9)						3
Cuneo Torino Lodi Mantova	(n=9)				1		
Torino Lodi Mantova	(n=9)				1	3	4
Lodi Mantova	(n=9)				2		2
Mantova	(n=9)					3	3
Mantova							
				2			2
				1	2	2	5
Milano						1	1
Pavia						1	1
	(n=38)						
Padova		1		4	3	8	16
				1	2	5	8
Treviso			1	2			3
Venezia			2	2	1	4	9
Verona						2	2
	(n=5)						
						3	3
Udine						2	2
	(n=131)						
			2	6			33
				3	2		7
			1			4	5
			1				42
					1	3	6
				-			1
							3
eggio Emilia			1	7	12	14	34
	(n=1)						
Roma				1			1
	(n=2)						
Chieti				1		1	2
	(n=11)						
							1
Salerno				3	2	5	10
	(n=2)						
				1			1
raranto						1	1
C	(n=2)					-	
cosenza						2	2
Orietana	(n=1)						
				40	47		214
	Milano Pavia Padova Rovigo Treviso Venezia	Milano Pavia (n=38) Padova Ravigo Treviso Venezia Verena Giulia (n=5) Pordenone Udine na (n=131) Bologna Ferrara Forli-Cesena Modena Parma Piacenza Ravenna eggio Emilia (n=1) Roma (n=2) Chieti (n=11) Benevento Salerno (n=2) tta-Andria-Trani Taranto (n=2) Cosenza (n=1) Oristano	Milano Pavia (n=38) Padova Ravigo Treviso Venezia Verena Giulia (n=5) Pordenone Udine na (n=131) Bologna Ferrara Forli-Cesena Modena Parma Piacenza Ravenna eggio Emilia (n=1) Roma (n=2) Chieti (n=11) Benevento Salerno (n=2) tta-Andria-Trani Taranto (n=2) Cosenza (n=1) Oristano	Milano Povia (n=38) Padova Rovigo Treviso 1 Venezia 2 Verona Giulia (n=5) Pordenone Udine na (n=131) Bologna 2 Ferrara Forfi-Cesena 1 Modena 1 Parma Piacenza Ravenna eggio Emilia (n=1) Roma (n=2) Chieti (n=11) Benevento Salemo (n=2) tto-Andria-Trani Taranto (n=2) Cosenza (n=1) Oristano	Milano Povio (n=38) Padova Rovigo 1 Treviso 1	Milano Povio (n=38) Padova 1 4 3 Rovigo 1 2 Treviso 1 2 Venezia 2 2 1 Venezia 2 2 1 Verena 6 Giulia (n=5) Pordenone Udine	Milano Pavia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 casi importati (5 Albania, 2 Stati Uniti, 1 Romania)




Figura 1. Andamento dei casi confermati di WNND per mese insorgenza sintomi. Italia: 2012 – 2024.







Sorveglianza equidi

Il CESME ha confermato 21 focolai negli equidi in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte, Campania, Puglia e Abruzzo.

			N. Focolai con sintor	Equidi nei focolai					
Provincia Regione	N. Focolai	Presenti		Casi totali	Casi con sintomi	Morti/abbattuti	Prevalenza %	Letalità%	
Puglia	Lecce	2	2	11	2	2	1	18,2	50
Abruzzo	Chieti	4	0	16	4	0	0	25,0	0
	Padova	2	2	60	2	2	0	3,3	0
Veneto	Vicenza	1	1	27	1	1	1	3,7	0
	Venezia	1	1	15	1	1	0	6,7	0
	Verona	3	4	126	4	4	0	3,2	0
	Asti	1	1	27	1	1	1	3,7	100
Piemonte	Cuneo	1	1	4	1	1	0	25,0	0
	Torino	1	1	53	1	1	0	2	0
	Modena	1	1	22	1	1	1	4,5	100
Emilia Romagna	Reggio Emilia	1	1	19	1	1	0	5,3	0
	Bologna	1	1	25	1	1	0	4,0	0
Lombardia	Cremona	1	1	120	1	1	0	0,8	0
Campania	Salerno	1	1	1	1	1	0	100,0	0

Tabella 2 Focolai e casi di WND negli equidi-2024



Figura 2 Distribuzione geografica dei casi di WND negli equidi-2024







Sorveglianza uccelli bersaglio

La presenza del WNV è stata confermata in 122 uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio in Lombardia, Toscana, Sardegna, Abruzzo, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Veneto. Le analisi molecolari hanno classificato il ceppo virale all'interno del Lineage 1 e del Lineage2.

Appartengono alle specie bersaglio:

- Gazza (Pica pica)
- Cornacchia grigia (Corvus corone cornix)
- Ghiandaia (Garrulus glandarius

Regione	Provincia	Cornacchia	Gazza	Ghiandaia
	Forlì Cesena	0	3	1
	Ferrara	4	51	1
	Bologna	0	5	3
Facilia Danasana	Modena	1	4	0
Emilia Romagna	Parma	4	5	0
	Ravenna	0	0	2
	Reggio Emilia	0	2	0
	Rimini	0	1	0
Friuli Venezia Giulia	Udine	0	1	0
	Cuneo	0	1	0
Piemonte	Novara	1	0	0
	Torino	1	0	0
Sardegna	Oristano	1	0	0
	Padova	1	0	0
Veneto	Rovigo	1	1	1
veneto	Verona	1	1	0
	Venezia	0	3	1
Abruzzo	Chieti	0	8	0
	Mantova	2	0	0
Lombardia	Pavia	1	0	0
	Varese	0	1	0
_	Grosseto	0	3	0
Toscana	Massa Carrara	0	1	0
Totale		18	95	9

Tabella 3 Uccelli target risultati positivi nei confronti del WNV - **2024**



Figura 3 Distribuzione geografica degli uccelli target risultati positivi nei confronti del WNV - 2024




Figura 4 Andamento spazio-temporale della presenza del WNV negli uccelli bersaglio - 2024







Sorveglianza uccelli selvatici

La presenza del WNV è stata rilevata in **154** uccelli selvatici rinvenuti in **Marche***, **Emilia Romagna**, **Veneto e Campania**. Le analisi molecolari hanno classificato il ceppo virale all'interno del **Lineage 1 e del Lineage 2**.

Regione	n.uccelli +	
Marche	Ancona	1
	Rimini	5
	Bologna	16
	Piacenza	1
Emilia Romagna	Ravenna	4
	Modena	2
	Reggio Emilia	4
	Ferrara	58
	Padova	15
Veneto	Verona	2
	Rovigo	11
	Venezia	34
Campania	Salerno	1
Totale		154

Tabella 4 Uccelli selvatici risultati positivi nei confronti del WNV - **2024**



Figura 5 Distribuzione geografica degli uccelli selvatici risultati positivi nei confronti del WNV - **2024**




Figura 6 Andamento spazio-temporale della presenza del WNV negli uccelli selvatici - 2024







Sorveglianza entomologica

La presenza del WNV è stata confermata dal CESME in **153 pool di zanzare** catturate in **Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Abruzzo.** Le analisi molecolari hanno classificato il ceppo virale all'interno del **Lineage 1 e 2.**

Regione	Provincia	n.pool
	Parma	14
	Ferrara	21
	Forlì Cesena	1
Emilia Romagna	Reggio Emilia	26
	Piacenza	1
	Bologna	12
	Modena	17
	Cremona	1
Lombardia	Brescia	1
	Mantova	5
	Verona	11
Veneto	Venezia	12
	Treviso	2
	Padova	4
	Rovigo	12
Sardegna	Oristano	1
Friuli Venezia Giulia	Gorizia	1
Triuli Veriezia Giulia	Pordenone	3
Piemonte	Torino	1
ricinonte	Alessandria	2
Abruzzo	Chieti	5
Totale		153

Tabella 5 Pool di zanzare risultate positive nei confronti del WNV - **2024**



Figura 7 Distribuzione geografica dei pool di zanzare risultate positive nei confronti del WNV - **2024**




Figura 8 Andamento spazio-temporale della presenza del WNV nelle zanzare catturate - 2024







Sorveglianza avicoli

In nessuna azienda avicola sono state rilevate positività nei confronti del WNV









Sorveglianza USUTU virus

La presenza del virus Usutu è stata ancora rilevata in 18 uccelli e 34 pool di zanzare in Lombardia, Emilia Romagna, Sardegna, Marche, Lombardia, Toscana, Veneto.



Figura 9 Distribuzione geografica dei pool di zanzare ed uccelli risultati positivi nei confronti dell'USUV - **2024**

Regione	Provincia	n.uccelli+
Emilia Romagna	Bologna	3
	Piacenza	1
	na Ferrara	
_	Ravenna	1
	Rimini	3
Marche	Fermo	1
Toscana	Pistoia	1
	Venezia	9
	Verona	1
Veneto	Rovigo	1
	Padova	8
	Vicenza	1
Lombardia	Brescia	1
	Totale	44

Tabella 6 Dettaglio relativo agli uccelli risultati positivi nei confronti dell'USUV - **2024**

Regione	Provincia	n.pool+
Piemonte	Alessandria	2
	Bologna	3
	Ferrara	6
	Forlì Cesena	4
Emilia Romagna	Piacenza	1
	Ravenna	2
	Reggio Emilia	3
	Piacenza	1
	Lodi	1
Lombardia	Bergamo	2
	Pavia	1
	Padova	4
Veneto	Rovigo	1
	Verona	1
	Vicenza	1
Sardegna	Sassari	1
	Totale	34

Tabella 7 Dettaglio relativo ai pool di zanzare risultati positivi nei confronti dell'USUV - **2024**







Piano nazionale prevenzione, sorveglianza e risposta arbovirosi (PNA) 2020-2025

Dal 2020 le attività di sorveglianza nei confronti dei virus West Nile (WNV) e Usutu (USUV) sono incluse nel Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta arbovirosi (PNA) 2020-2025.

Il documento integra, in un unico Piano, le misure di sorveglianza da attuare sul territorio nazionale nei confronti delle arbovirosi autoctone e di importazione promuovendo un approccio multidisciplinare nella definizione ed attuazione delle misure di prevenzione, sorveglianza e controllo delle arbovirosi.

Per maggiori dettagli sulla sorveglianza integrata, sul flusso delle segnalazioni, sulle definizioni di caso di malattia neuroinvasiva da West Nile nell'uomo e negli equidi e sulle modalità di prevenzione e controllo della malattia è possibile consultare il documento completo «Piano nazionale prevenzione, sorveglianza e risposta arbovirosi (PNA) 2020-2025».

Le attività di sorveglianza in ambito umano e veterinario sono coordinate dal Ministero della salute attraverso le due Direzioni Generali, la exDirezione generale della prevenzione (exDGPREV) e la exDirezione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (exDGSAF), supportate, per i rispettivi ambiti, dal Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità e dal Centro di Referenza Nazionale per lo studio e l'accertamento delle malattie esotiche (CESME) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise a cui afferiscono le attività di conferma diagnostica esaminate dai rispettivi IIZZSS distribuiti a livello territoriale.

Le Regioni, in piena autonomia, definiscono i documenti normativo-programmatici per la Sorveglianza epidemiologica e di laboratorio sul loro territorio e trasmettono i dati all'Istituto Superiore di Sanità ed al Ministero della Salute secondo il flusso riportato nel Piano. Per la sorveglianza veterinaria, le Regioni redigono propri piani sulla base delle aree di rischio, approvati dalla exDGSAF dopo valutazione tecnica del CESME.

Inoltre le Regioni sono responsabili di garantire la coerenza dei loro piani con le normative nazionali ed europee, assicurando un coordinamento efficace con le autorità sanitarie centrali del Ministero della salute per ottimizzare la risposta sanitaria.





Consulta inoltre ...

- La pagina web dell'<u>Istituto Superiore di Sanità</u> dedicata al West Nile virus
- La pagina web dell'<u>Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise</u> "G. Caporale" dedicata a West Nile Disease
- La pagina web dell'ECDC dedicata a West Nile fever.
- Le indicazioni del <u>Centro Nazionale Sangue</u> relative alle misure di prevenzione della trasmissione trasfusionale dell'infezione da West Nile Virus.
- Le indicazioni del <u>Centro Nazionale Trapianti</u> in merito alla trasmissione del Virus West Nile mediante trapianto d'organo, tessuti e cellule nella stagione estivo-autunnale 2017.
- La pagina Web del Ministero della Salute dedicata al West Nile virus
- La pagina Web dell'EFSA, Disease profiles

La realizzazione di questo rapporto è a cura di:

A. Bella, G. Venturi, F. Riccardo – Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità

F. Iapaolo, F. Monaco, P. Calistri, D. Morelli – CESME, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.

Si ringraziano, inoltre, tutti gli operatori sanitari delle Regioni che hanno contribuito alla sorveglianza, il Centro Nazionale Sangue, il Centro Nazionale Trapianti, la rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e il Ministero della Salute.