AOO-ISS - 11/09/2025 - 0037189 Class: DMI 01.00







Sorveglianza integrata del West Nile e Usutu virus

Bollettino N. 9 del 11 settembre 2025 RISULTATI NAZIONALI

- 1. In Evidenza
- 2. Sorveglianza umana (a)
- 3. Sorveglianza umana (b)
- 4. Sorveglianza equidi
- 5. Sorveglianza uccelli bersaglio
- 6. Sorveglianza uccelli selvatici
- 7. <u>Sorveglianza entomologica</u>
- 8. Sorveglianza avicoli
- 9. Sorveglianza Usutu virus
- 10. <u>Piano nazionale prevenzione, sorveglianza e</u> risposta arbovirosi (PNA) 2020-2025






1. In Evidenza

Questo numero del bollettino riassume i risultati delle attività di sorveglianza nei confronti del virus del West Nile e del virus Usutu in Italia, aggiornati al **10-09-2025**.

- Sono 80 i nuovi casi umani di West Nile Virus che sono stati segnalati nel periodo 4 – 10 settembre 2025.
- Salgono a 582 in Italia i casi confermati di infezione da West Nile Virus (WNV) nell'uomo (502 nel precedente bollettino), di cui 260 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (14 Piemonte, 24 Lombardia, 22 Veneto, 1 Friuli-Venezia Giulia, 1 Liguria, 20 Emilia-Romagna, 3 Toscana, 77 Lazio, 2 Molise, 74 Campania, 1 Puglia, 2 Basilicata, 5 Calabria, 1 Sicilia, 13 Sardegna), 48 casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 262 casi di febbre (di cui 1 importato dal Kenya), 4 casi asintomatici e 8 casi sintomatici (Tabella 1).
- Tra i casi confermati sono stati notificati 39 decessi (5 Piemonte, 2 Lombardia, 1 Emilia-Romagna, 15 Lazio, 14 Campania, 2 Calabria). La letalità, calcolata sulle forme neuro-invasive confermate e fin ora segnalate, è pari al 15% (nel 2018 20%, nel 2024 14%).
- Nello stesso periodo sono stati segnalati 7 casi di Usutu virus (2 Piemonte, 2 Lombardia, 1 Veneto, 2 Lazio).
- La sorveglianza veterinaria attuata su cavalli, zanzare, uccelli stanziali e selvatici, ha confermato la circolazione del WNV in Molise, Sicilia, Veneto, Marche, Piemonte, Sardegna, Emilia-Romagna, Puglia, Abruzzo, Lazio, Campania e Lombardia. Le analisi molecolari hanno confermato la circolazione del WNV Lineage 1 e 2.

Figura 1. Province con dimostrata circolazione di WNV in vettori, animali e uomo (donatori asintomatici, febbri e casi neuroinvasivi confermati)



Salgono a **68** le **Province** con dimostrata circolazione del WNV appartenenti a **16 Regioni**: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.






2. Sorveglianza umana (a)

Dall'inizio della sorveglianza, sono stati segnalati in Italia **582** casi confermati di infezione da **West Nile Virus nell'uomo**, di cui **260** si sono manifestati nella forma neuro-invasiva, **48** casi asintomatici identificati in donatori di sangue, **262** casi di febbre (<u>di cui uno importato dal Kenya</u>), **4** casi asintomatici e **8** casi con altri sintomi.

Tabella 1. Distribuzione dei casi confermati di WNV per Provincia di esposizione e classificazione. Italia: 2025

REGIONE			Casi Confermati					
REGIONE		PROVINCIA	Neuro-invasivo	Asintomatico	Donatore	Febbre	Sintomatico	Totale
Piemonte	(n=33)	Alessandria	1		2	3		6
		Asti	2					2
		Biella	1					1
		Cuneo	1		1			2
		Novara	5		4	3		12
		Torino	3		1			4
		Vercelli	1		2	3		6
Lombardia	(n=49)	Brescia	2		2	2	2	8
		Como				1		1
		Cremona	1			1		2
		Lodi	1		2		1	4
		Mantova	3					3
		Milano	7		5	3		15
		Pavia	10			4		14
		Sondrio				1		1
		Varese		1				1
Veneto	(n=68)	Padova	8		1	7	2	18
		Rovigo	2			4		6
		Treviso	2	1	2	9		14
		Venezia	3			12		15
		Verona	6		1	4		11
		Vicenza	1			2	1	4
Friuli VG	(n=6)	Pordenone			1			1
	,	Udine	1		2	2		5
Liguria	(n=1)	Genova	1			_		1
Emilia-Romagna	(n=32)	Bologna			1	1		2
Litina nomagna	(52)	Forlì-Cesena	4		-	-		4
		Modena	5			2		7
		Parma	7		3			10
		Piacenza	3		1	3		7
		Reggio Emilia	1		1	,		2
Toscana	(n=5)	Arezzo	3			1		4
TOSCATIA	(11-5)	Grosseto	3			1		1
Lasta	(n=235)		7			1		9
Lazio	(n=235)	Frosinone			1	140		
		Latina	59		3			202
****	(Roma	11		3	10		24
Molise	(n=3)	Isernia	2			1		3
Campania	(n=113)	Avellino	3		_	1		4
		Caserta	20	1	2	15		38
		Napoli	46	1	4	14	1	66
		Salerno	5					5
Puglia	(n=3)	Barletta-Andria-Trani	1					1
		Lecce			1	1		2
Basilicata	(n=2)	Matera	2					2
Calabria	(n=5)	Catanzaro	2					2
		Cosenza	2					2
		Reggio Calabria	1					1
Sicilia	(n=1)	Messina	1					1
Sardegna	(n=25)	Medio Campidano	2			1		3
		Nuoro				1		1
		Olbia-Tempio	1					1
		Oristano	10		2	5	1	18
		Sassari				2		2
TOTALE		•	260	4	48	261	8	581

Figura 2. Numero totale di casi confermati di WNV nell'uomo per Provincia di esposizione. Italia: 2025








3. Sorveglianza umana (b)

Dall'inizio della sorveglianza, sono stati segnalati in Italia **582 casi umani confermati da West Nile Virus** (WNV), **260** dei quali hanno manifestato sintomi neuro-invasivi. Di seguito è riportata la descrizione delle sole forme neuro-invasive (WNND).









Figura 4. Andamento dei casi confermati di WNND per mese insorgenza sintomi. Italia: 2015 – 2025.



^{*} Caso sporadico in bassa stagione





4. Sorveglianza equidi

Il CESME ha confermato 46 focolai negli equidi in Puglia, Lombardia, Sicilia, Campania, Emilia Romagna, Veneto e Lazio.

Tabella 2. Focolai e casi di WND negli equidi - 2025

			Equidi nei focolai			v _o	
Regione	Provincia	N. Focolai con sintomi clinici	Presenti	Con segni clinici	Morti/abbattuti	Prevalenza casi totali %	Letalità %
PUGLIA	Lecce	1	4	1	1	25	100
PUGLIA	Foggia	2	30	2	1	7	50
	Frosinone	1	2	1	1	50	100
LAZIO	Roma	7	160	8	1	5	13
	Latina	26	279	25	7	9	28
	Caltanissetta	1	1	1	0	100	0
SICILIA	Siracusa	1	3	1	0	33	0
	Catania	1	31	1	0	3	0
LOMBARDIA	Mantova	1	42	1	0	2	0
CAMPANIA	Caserta	2	134	2	2	1	100
EMILIA ROMAGNA	Modena	1	1	1	1	100	100
MOLISE	Campobasso	1	2	1	0	50	0
VENETO	Padova	1	46	1	0	2	0
Totale		46	689	46	13	7	28



Figura 5. Distribuzione geografica dei casi di WND negli equidi- **2025**





5. Sorveglianza uccelli bersaglio

La presenza del WNV è stata confermata in **100** uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio in Abruzzo, Molise, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Campania, Sardegna, Lazio, Veneto ed Emilia Romagna. Le analisi molecolari hanno classificato il ceppo virale all'interno del Lineage **1** e del Lineage **2**.

Appartengono alle specie bersaglio:


- Gazza (Pica pica)
- Cornacchia grigia (Corvus corone cornix)
- Ghiandaia (Garrulus glandarius

Tabella 3. Uccelli target risultati positivi nei confronti del WNV - **2025**

Regione	Provincia	Cornacchia	Gazza	Ghiandaia	n.capi+
	Bologna	2	0	0	2
	Ravenna	0	1	0	1
	Ferrara	0	17	0	17
EMILIA-ROMAGNA	Forlì Cesena	0	1	0	1
EWILIA-KUWAGNA	Reggio Emilia	1	3	0	4
	Modena	0	1	0	1
	Piacenza	2	0	0	2
	Parma	1	8	0	9
SARDEGNA	Sud Sardegna	2	0	0	2
SARDEGNA	Oristano	6	0	0	6
CAMPANIA	Caserta	3	2	2	7
CAIVIPAINIA	Napoli	3	6	0	9
	Cremona	1	0	0	1
	Milano	0	2	0	2
	Pavia	1	0	0	1
LOMBARDIA	Lodi	3	0	0	3
	Brescia	1	0	0	1
	Lecco	1	0	0	1
	Varese	0	2	0	2
	Asti	2	0	0	2
PIEMONTE	Biella	1	0	0	1
PIEWONTE	Novara	1	0	0	1
	Vercelli	0	1	0	1
	Padova	1	0	0	1
VENETO	Verona	1	1	0	2
	Venezia	1	2	0	3
	Roma	3	0	0	3
LAZIO	Frosinone	2	0	0	2
	Latina	6	0	0	6
MOLISE	Isernia	1	3	0	4
FRIULI VENEZIA GIULIA	Gorizia	0	1	0	1
ABRUZZO	Chieti	0	1	0	1
Totale		46	52	2	100



Figura 6. Distribuzione geografica degli uccelli target risultati positivi nei confronti del WNV - **2025**







6. Sorveglianza uccelli selvatici

La presenza del WNV è stata confermata in 72 uccelli selvatici in Abruzzo, Puglia, Campania, Emilia Romagna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise e Veneto. Le analisi molecolari hanno classificato il ceppo virale all'interno del Lineage 1 e Lineage 2.

Tabella 4. Uccelli selvatici risultati positivi nei confronti del WNV - **2025**

Regione	Provincia	n.capi+
ABRUZZO	L'Aquila	1
	Benevento	1
CAMPANIA	Caserta	3
	Napoli	7
	Bologna	2
	Ferrara	4
EMILIA-ROMAGNA	Parma	2
	Piacenza	4
	Reggio Emilia	2
FRIULI-VENEZIA GIULIA	Udine	2
	Bergamo	2
	Milano	11
LOMBARDIA	Brescia	1
LOWIDARDIA	Pavia	1
	Sondrio	1
	Varese	1
MOLISE Campobasso		1
PIEMONTE	Cuneo	1
PIEWONTE	Novara	2
PUGLIA	Foggia	1
POGLIA	Lecce	1
SARDEGNA	Oristano	1
JANDEGNA	Sassari	1
	Padova	3
VENETO	Venezia	14
	Verona	2
Totale	72	



Figura 8. Distribuzione geografica degli uccelli selvatici risultati positivi nei confronti del WNV - **2025**




Figura 9. Andamento spazio-temporale della presenza del WNV negli uccelli selvatici - 2025





7. Sorveglianza entomologica


La presenza del WNV è stata confermata dal CESME in 117 pool di zanzare catturate in Molise, Sardegna, Lombardia, Marche, Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Piemonte. Le analisi molecolari hanno classificato il ceppo virale all'interno del Lineage 1 e 2.

Tabella 5. Pool di zanzare risultate positive nei confronti del WNV - **2025**

Regione	Provincia	n.pool+
CAMPANIA	Napoli	1
	Bologna	3
	Ferrara	4
	Ravenna	1
EMILIA-ROMAGNA	Modena	1
	Piacenza	4
	Parma	3
	Reggio Emilia	5
LAZIO	Latina	1
	Cremona	1
LOMBARDIA	Pavia	1
LOWIDARDIA	Lodi	1
	Milano	4
MOLISE	Campobasso	1
WOLISE	Isernia	1
PIEMONTE	Novara	1
FILMONTE	Torino	2
SARDEGNA	Oristano	42
	Padova	6
	Rovigo	9
VENETO	Treviso	2
VENTETO	Venezia	15
	Vicenza	2
	Verona	5
MARCHE	Macerata 1	
Totale 117		



Figura 10. Distribuzione geografica dei pool di zanzare risultate positive nei confronti del WNV - **2025**







8. Sorveglianza avicoli

Il CESME ha confermato 2 focolai in allevamenti avicoli in Calabria e Sardegna

Regione	Provincia	n.capi+
CALABRIA Reggio Calabria		2
SARDEGNA Sassari		1
Т	3	

Tabella 6. Avicoli risultati positivi nei confronti del WNV - **2025**



Figura.12 Distribuzione geografica dei casi di WND negli avicoli- **2025**





9. Sorveglianza USUTU virus


La presenza del virus USUTU è stata rilevata in 67 pool di zanzare catturate 28 uccelli selvatici nel Lazio, Umbria, Marche, Toscana, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia.

Regione	Provincia	n.pool+
MARCHE	Ancona	1
WARCHE	Macerata	1
LOMBARDIA	Bergamo	1
LOWIBARDIA	Brescia	1
	Ferrara	3
	Forli Cesena	3
	Modena	3
	Bologna	10
EMILIA ROMAGNA	Parma	7
	Piacenza	5
	Ravenna	8
	Reggio Emilia	2
	Rimini	1
	Venezia	6
	Verona	2
Veneto	Vicenza	4
	Padova	3
	Treviso	4
Friuli Venezia Giulia	Trieste	1
Lazio	Latina	1
Totale	67	

Tabella 7. Pool di zanzare risultate positive nei confronti del virus USUTU - **2025**

Regione	Provincia	n.capi+
	Ascoli Piceno	1
MARCHE	Fermo	2
	Pesaro Urbino	2
TOSCANA	Firenze	1
	Como	1
LOMBARDIA	Milano	8
	Cremona	1
	Pavia	1
	Varese	2
LAZIO Rieti		1
	Reggio Emilia	1
EMILIA ROMAGNA	Rimini	3
	Bologna	2
UMBRIA	Perugia	1
VENETO	Verona	1
Total	28	

Tabella 8. Uccelli risultati positivi nei confronti del virus USUTU - **2025**







10. Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta arbovirosi (PNA) 2020-2025

Dal 2020 le attività di sorveglianza nei confronti dei virus West Nile (WNV) e Usutu (USUV) sono incluse nel Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta arbovirosi (PNA) 2020-2025.

Il documento integra, in un unico Piano, le misure di sorveglianza da attuare sul territorio nazionale nei confronti delle arbovirosi autoctone e di importazione promuovendo un approccio multidisciplinare nella definizione ed attuazione delle misure di prevenzione, sorveglianza e controllo delle arbovirosi.

Per maggiori dettagli sulla sorveglianza integrata, sul flusso delle segnalazioni, sulle definizioni di caso di malattia neuroinvasiva da West Nile nell'uomo e negli equidi e sulle modalità di prevenzione e controllo della malattia è possibile consultare il documento completo «Piano nazionale prevenzione, sorveglianza e risposta arbovirosi (PNA) 2020-2025».

Le attività di sorveglianza in ambito umano e veterinario sono coordinate dal Ministero della salute attraverso le due Direzioni Generali, la Direzione generale delle emergenze sanitarie e la Direzione generale della salute animale, supportate, per i rispettivi ambiti, dal Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità e dal Centro di Referenza Nazionale per lo studio e l'accertamento delle malattie esotiche (CESME) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise a cui afferiscono le attività di conferma diagnostica esaminate dai rispettivi IIZZSS distribuiti a livello territoriale.

Le Regioni, in piena autonomia, definiscono i documenti normativo-programmatici per la Sorveglianza epidemiologica e di laboratorio sul loro territorio e trasmettono i dati all'Istituto Superiore di Sanità ed al Ministero della Salute secondo il flusso riportato nel Piano. Per la sorveglianza veterinaria, le Regioni redigono propri piani sulla base delle aree di rischio, approvati dalla Direzione generale della salute animale dopo valutazione tecnica del CESME.

Inoltre le Regioni sono responsabili di garantire la coerenza dei loro piani con le normative nazionali ed europee, assicurando un coordinamento efficace con le autorità sanitarie centrali del Ministero della salute per ottimizzare la risposta sanitaria.





Consulta inoltre ...

- La pagina web dell'<u>Istituto Superiore di Sanità</u> dedicata al West Nile virus
- La pagina web dell'<u>Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise</u> "G. Caporale" dedicata a West Nile Disease
- La pagina web dell'ECDC dedicata a West Nile fever.
- Le indicazioni del <u>Centro Nazionale Sangue</u> relative alle misure di prevenzione della trasmissione trasfusionale dell'infezione da West Nile Virus.
- Le indicazioni del <u>Centro Nazionale Trapianti</u> in merito alla trasmissione del Virus West Nile mediante trapianto d'organo, tessuti e cellule nella stagione estivo-autunnale 2017.
- La pagina Web del Ministero della Salute dedicata al West Nile virus
- La pagina Web dell'EFSA, Disease profiles

La realizzazione di guesto rapporto è a cura di:

A. Bella, G. Venturi, F. Riccardo – Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità

F. Iapaolo, F. Monaco, P. Calistri, D. Morelli – CESME, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.

Si ringraziano, inoltre, tutti gli operatori sanitari delle Regioni che hanno contribuito alla sorveglianza, il Centro Nazionale Sangue, il Centro Nazionale Trapianti, la rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e il Ministero della Salute.