Séries temporais

O básico da P1

Definições, contas de uma linha e as três derivações-molde

Caderno de estudo · parte 1: ARMA, ARIMA e SARIMA

Prof. Guilherme Pereira · Econometria II (PPGEco/UFES)

Gerado em 02/11/2026 a partir de `github.com/fcarva/series-temporais` (commit `3931784`). Material autoral: enunciados parafraseados, demonstrações próprias, números conferidos em R contra os scripts do repositório.

CAPÍTULO 1

O básico da P1: o que precisa sair sem pensar

Esta é a folha para levar consolidada. São três camadas, em ordem de prioridade: **definições, contas de uma linha e três derivações-molde**. Se elas saem sem pensar, a maior parte da prova sai. Os exemplos numéricos são os do Simulado 01, para conferir.

Camada 1: seis definições

O que	Como escrever
momentos (média zero; com média, use $y-\mu$)	$\gamma_0 = \text{Var}(y_t) = E(y_t^2)$; $\gamma_k = E(y_t y_{t-k})$; $\rho_k = \gamma_k/\gamma_0$
estacionário	μ e γ_0 constantes **e** γ_k dependendo só de k: as três condições
ruído branco	$E(\varepsilon_t) = 0$, $E(\varepsilon_t^2) = \sigma^2$, $E(\varepsilon_t \varepsilon_s) = 0$ se $s \neq t$
causalidade	$E(\varepsilon_t y_{t-k}) = 0$ para $k \geq 1$; $E(\varepsilon_t y_t) = \sigma^2$
raiz de um polinômio	$\phi(x) = 0$, com x um **número**, não a série; fora do círculo: $\lvert x\rvert > 1$
convenção do MA	lista: $1-\theta B$; slides: $1+\theta_1 L$; logo $\theta_1 = -\theta$. **Escrever na 1ª linha**

Camada 2: as contas de uma linha, os pontos mais baratos

Conta	Fórmula	Exemplo (S1)
raízes de AR(1) e MA(1)	$1-\phi x = 0 \Rightarrow x = 1/\phi$	$\phi = 0{,}6$: $x = 1{,}667$; $\theta = 0{,}3$: $x = 3{,}33$
raízes de grau 2	Bhaskara; conferir com Vieta: soma $-b/a$, produto c/a	(lista, Q5 e Q7)
ARMA(1,1), pesos (lista)	$\psi_j = (\phi-\theta)\phi^{j-1}$; $\pi_j = (\phi-\theta)\theta^{j-1}$	ψ: 0,3; 0,18; 0,108. π: 0,3; 0,09; 0,027
ARMA(1,1), momentos (lista)	$\gamma_0 = \frac{1+\theta^2-2\phi\theta}{1-\phi^2}\sigma^2$; $\gamma_1 = \phi\gamma_0 - \theta\sigma^2$; $\rho_k = \phi\rho_{k-1}$	$\gamma_0 = 1{,}1406$; $\gamma_1 = 0{,}3844$; $\rho_1 = 0{,}337$
AIC e BIC	$-2\ln L + 2k$; $-2\ln L + k\ln T$; k **com** σ^2; o menor vence	AIC: AR(3), 602,0; BIC: AR(1), 613,0
MQO do AR(1)	$\hat\phi = \frac{\sum y_t y_{t-1}}{\sum y_{t-1}^2}$; $\hat\sigma^2 = \frac{\sum y_t^2 - \hat\phi \sum y_t y_{t-1}}{T-1}$	$\hat\phi = 0{,}7$; $\hat\sigma^2 = 0{,}712$
SARIMA	perdas $d+sD$; parâmetros $p+q+P+Q+1$ (o +1 é o σ^2); termo cruzado $+\theta\Theta B^{s+1}$	mensal com $d = D = 1$, $T = 180$: perde 13, sobram 167
previsão do AR(1)	$\hat y_{T+h} = \mu + \phi^h(y_T - \mu)$; $\text{Var}(e) = \sigma^2 \sum_{j<h} \psi_j^2$	11,6; 11,28; 11,024; variâncias 4; 6,56; 8,1984
intervalo de 95%	$\hat y \pm 1{,}96\sqrt{\text{Var}(e)}$	$h = 1$: [7,68; 15,52]
previsão do MA(q)	para $h > q$: $\hat y = \mu$ e $\text{Var}(e) = \gamma_0$	(lista, Q15)

Camada 3: três derivações-molde

1. Telescópica (lista, Q1, Q2 e Q8-II). Some o modelo de 1 a t, para obter $y_t = y_0 + (\text{parte fixa}) + \sum_{s=1}^{t} \varepsilon_s$. Depois:

- $E(\cdot)$, com a esperança entrando na soma finita;
- Var $= t\sigma^2$, porque só $i = j$ sobra;
- Cov $= (t-k)\sigma^2$, pelos choques comuns;
- **fechar com "não estacionário"**.

2. ARMA em quatro movimentos (lista, Q6, Q7, Q8-I e Q11). Multiplique o modelo e tire a esperança:

1. por ε_t e por ε_{t-1}, que dão os momentos auxiliares;
2. por y_t, que dá a equação de γ_0;
3. por y_{t-1}, que dá a equação de γ_1;
4. resolva o sistema 2×2.

No AR(2), os passos 2 e 3 são o Yule-Walker. O roteiro com números está na correção do S1.

3. Polinômios em B (lista, Q9, Q10b, Q11c, Q12a e Q16a). Multiplique os polinômios termo a termo, sempre aplicando o operador **aos dois lados**: $(1 - 0{,}5B)y_t = \varepsilon_t$ vira $(1 - 0{,}5B)(1 - B)y_t = (1 - B)\varepsilon_t$. Se aparecer $(1 - B)$ no MA, a raiz é 1: **não invertível, sem AR(∞)**.

Reconhecer pela FAC e pela FACP

- **A FAC corta** em q: **MA(q)**. **A FACP corta** em p: **AR(p)**. As duas decaem: ARMA.
- FAC **perto de 1, caindo devagar**: raiz unitária; diferenciar.
- $\rho_1 \approx -0{,}5$ depois de diferenciar: **sobrediferenciação**.
- Picos em $s, 2s, \ldots$, decaindo: SAR. Pico **só** em s, com **satélites** em $s \pm 1$: SMA multiplicativo. No S1, $\rho_{12} = -0{,}4412$ e $\rho_{11} = \rho_{13} = 0{,}1521$.
- O **AIC** prevê melhor; o **BIC** é consistente e acha o modelo verdadeiro, se ele está na lista.

Na prova

1. **3 minutos** de leitura: convenção do MA, T e s.
2. **Cerca de 25 minutos**: só as contas da camada 2, de todas as questões.
3. **Derivações** da camada 3, da mais curta para a mais longa.
4. **Fechar com a frase do verbo:** "logo, não é estacionário"; "logo, MA(2)"; "logo, não invertível, sem AR(∞)".

Pode ficar de fora:

- a verossimilhança exata;
- os detalhes dos testes de raiz unitária;
- Beveridge-Nelson;
- a avaliação de previsões (MASE, DM, Winkler, CRPS);
- a matriz F.

De Wold, basta o enunciado em uma linha e o AR(1) como exemplo.