Séries temporais

Volume 5

Prova de 05/11: guia, banco de variações, simulados e gabaritos

---

Caderno de estudo · parte 1: ARMA, ARIMA e SARIMA

Prof. Guilherme Pereira · Econometria II (PPGEco/UFES)

Gerado em 02/11/2026 a partir de `github.com/fcarva/series-temporais` (commit `6ca5b6c`). Material autoral: enunciados parafraseados, demonstrações próprias, números conferidos em R contra os scripts do repositório.

Sumário

I Guia da prova 1

1 Prova de 05/11/2026: guia de treino 2

II Banco de variações da lista 11

2 Banco de variações da lista 12

III Simulados 17

3 Simulado 01 18

4 Simulado 02 20

5 Simulado 03 23

6 Simulado 04 25

IV Gabaritos e log de erros 27

7 Simulado 01 — gabarito 28

8 Simulado 02 — gabarito 35

9 Simulado 03 — gabarito 45

10 Simulado 04 — gabarito 51

11 Log de erros 57

V Formulário 59

12 Formulário 60

Parte I

Guia da prova

CAPÍTULO 1

Prova de 05/11/2026: guia de treino

> **Se for ler uma coisa só**
>
> O básico da P1, em duas páginas: as seis definições, as contas de uma linha e as três derivações-molde. É o que precisa sair sem pensar. Depois, o guia "não posso errar": as nove questões básicas resolvidas linha a linha, com o sentido de cada passo. É onde se aprende **a fazer**.

O que se sabe da prova: **5 ou 6 questões, de 1h50 a 2h, sem consulta, tiradas da lista** "Processos ARMA, ARIMA e SARIMA" (`LST`). A aposta é **uma questão por bloco da lista**, com números e torções novos. Este guia junta quatro coisas:

1. o mapa de cada bloco para a resolução, a demonstração e o livro;
2. a estratégia de tempo;
3. as lições da P1 de Econometria I, traduzidas para séries temporais;
4. o plano dos 8 dias até a prova.

Arquivo	Para quê
volume único da P1	**o PDF para imprimir**, `caderno_p1_completo.pdf`, na pasta `caderno/pdf/`: os seis blocos (apostila, folha à mão, comentadas, banco), os simulados e os gabaritos, o log e o formulário
apostila	**um capítulo por bloco da lista**: teoria com página do slide, demonstrações linha a linha, exemplo em R, perguntas em cadeia, diálogo e imagens; leia o capítulo antes de fazer as questões do bloco
lista comentada	**as 16 questões da lista, passo a passo, na notação dos slides**, com o caderno corrigido: comece por aqui
Q2 e Q6 à mão	as duas questões escolhidas para treinar no papel, linha a linha, no formato de caderno
banco.md	as 16 questões da lista em **variações** curtas com resposta: o treino diário
simulado_01.md · gabarito	próximo da lista, para calibrar o tempo
simulado_02.md · gabarito	**as nove questões-tipo** do guia "não posso errar", com números novos
simulado_03.md · gabarito	integrador: V ou F, previsão numérica de SARIMA, identificação
simulado_04.md · gabarito	opcional, as torções: sinal positivo, AR(2), sazonal trimestral
log_erros.md	registro dos erros com revisão em +1, +3 e +7 dias
prova.R	todos os números dos simulados e do banco (id `pv`)
formulário	todas as fórmulas

1. O mapa da prova

Bloco (questões da lista)	O que pode cair	Resolução e demonstrações	Livros
1. Processos e momentos (Q1–Q4)	momentos de passeio com drift e com tendência; soma de processos e FAC; Wold	01_lista, D01.1–D01.4	ENDERS cap. 4; HAMILTON cap. 3–4; MAT

Bloco (questões da lista)	O que pode cair	Resolução e demonstrações	Livros
2. AR, MA e ARMA (Q5–Q8)	raízes, fator comum, ψ_j e π_j; γ_k do ARMA(1,1); Yule-Walker; V ou F	02_lista, D02.1–D02.5	ENDERS cap. 2; HAMILTON cap. 3; BJRL cap. 3
3. Integrados, ARIMA e SARIMA (Q9–Q12)	sobrediferenciação; DS × TS; SAR e AR restrito; previsão de SARIMA	03_lista, D03.1–D03.4	ENDERS cap. 2 e 4; BJRL cap. 4 e 9; MAT
4. Estimação e seleção (Q13–Q14)	MV condicional = MQO; AIC e BIC com k incluindo σ^2	04_lista, D04.1	HAMILTON cap. 5; AU02
5. Previsão (Q15)	previsor ótimo; erro MA($h-1$); intervalo; SES	05_lista, D05.1	HAMILTON cap. 4; BJRL cap. 5
6. Aplicação (Q16)	escrever o SARIMA, contar parâmetros, FAC de w_t, escolher entre modelos	06_lista	BJRL cap. 9; AU03

Notação: a do professor, que é a da lista

- Operador B; a_t, ε_t, $u_t \sim RB(0, \sigma^2)$; γ_k, ρ_k, ϕ_{kk}; ψ_j, π_j; $y_{T+h|T} = E(y_{T+h} \mid \mathcal{F}_T)$.
- **MA de Box-Jenkins**, $\theta(B) = 1 - \theta_1 B - \cdots$, em quase toda a lista.
- **Sinal positivo**, $1 + \theta_1 L + \cdots$, na Q8 e nos slides (AU02).

Primeira linha de toda resposta com MA: "convenção: BJ" ou "convenção: sinal positivo". Ver CONVENCOES §2.

2. Estratégia no dia

Com 110 minutos e 10 pontos, cada ponto vale **11 minutos**: uma questão de 1,5 merece até 16 minutos, e uma de 2,0, até 22.

1. **Leitura (3 min).** Percorra a prova e marque, em cada questão, a convenção do MA, o T, o s e os valores críticos dados.
2. **Contas curtas primeiro (≈25 min).** AIC e BIC, observações perdidas, raízes, ψ_1 a ψ_3, γ_0 de fórmula pronta, previsões de 1 a 3 passos. São os pontos mais baratos, e foi justamente o que ficou em branco na P1 de Econometria I.
3. **Derivações (≈70 min), da mais curta para a mais longa.** Momentos do passeio → FAC de soma → ARMA(1,1) → previsor ótimo → previsão de SARIMA.
4. **Revisão (10 min).** Sinal do MA, $\psi_0 = 1$, k com σ^2, a frase de conclusão de cada item.
5. **Se faltar tempo:** escreva a fórmula geral e a estrutura da conta. A rubrica dá ponto por passo.

O que cada verbo pede

Verbo	O que precisa aparecer
Calcule	fórmula geral → números → resultado com unidade ou interpretação
Mostre / demonstre	hipóteses usadas, uma justificativa por linha ([RB], estacionariedade, causalidade, LEI) e **a frase final com o que se pediu**
Verifique (estacionariedade, invertibilidade)	raízes ou desigualdades → "estão fora do círculo" → **"logo, é estacionário"**

Verbo	O que precisa aparecer
Discuta / compare	duas ou três consequências concretas: estimação, previsão, inferência
Julgue (V ou F)	a conta que decide; "V" sem conta vale zero
Identifique / proponha	o padrão da FAC e da FACP que leva ao modelo e quantos parâmetros ele tem

3. Os erros da P1 de Econometria I e o equivalente aqui

Na P1 de Econometria I (09/10/2026), os pontos se perderam na **execução**, não no conceito. Ver o log em `econometria/provas/log_erros.md` e o mapa da prova em `econometria/provas/p1_2026_2/README.md`. Cerca de 2,5 pontos ficaram em contas de uma linha deixadas em branco, e mais pontos em demonstrações que pararam antes da conclusão. Cada erro tem um gêmeo nesta prova:

Erro na P1 de Econometria I	Causa	Onde reaparece aqui	Regra para 05/11
Q1, Q3c e Q4b em branco: matriz diagonal, F de uma linha, $340/85$	**T** tempo	AIC e BIC (Q14), observações perdidas $d + sD$ (Q12, Q16), raízes de $\phi(z)$ e $\theta(z)$, ψ_1 a ψ_3, $\hat{\phi} = \sum y_t y_{t-1} / \sum y_{t-1}^2$	**fazer primeiro** todo item de 1 a 3 linhas de conta
Q2d: efeito marginal 4,5% sem o termo $2\beta_3 EXP$	**A** número sem fórmula	ρ_1 do MA(1) com o sinal da convenção errada; γ_0 do ARMA(1,1) sem o termo $-2\phi\theta$; $\text{Var}(e_T(h))$ sem $\psi_0 = 1$; k sem σ^2; a^2 em vez de a em γ_{az}	**escrever a fórmula geral e a convenção** antes de pôr números
Q3c: rejeitou H_0 sem calcular F	**E** passo pulado	Ljung-Box sem $\nu = K - p - q - P - Q$; LR sem $2(\ell_1 - \ell_0)$	todo teste em quatro linhas: H_0, estatística e distribuição, decisão, conclusão
Q5: Gauss-Markov parou em $\sigma^2\mathbf{CC}'$	**E** sem conclusão	"verifique se é estacionário" sem a frase final; Wold sem $\sum \psi_j^2 < \infty$; previsor ótimo sem "logo, $g = E(\cdot \mid \mathcal{F}_T)$"; sobrediferenciação sem "raiz no círculo $\Rightarrow$ não invertível $\Rightarrow$ sem AR(∞)"	**reler o verbo** do enunciado e fechar com a frase que ele pede
Q4a: plim em branco por esquecimento	**E** resultado esquecido	ARMA(1,1): os momentos auxiliares $E(z_t a_t)$ e $E(z_t a_{t-1})$	refazer de cabeça D02.2 e Q6 até sair em 8 minutos
(banco B12) covariância zerada sem citar a hipótese	**H** hipótese	FAC da soma sem "não correlacionados"; $E(a_t y_{t-k}) = 0$ sem "causalidade"; série geométrica sem $\lvert\phi\rvert < 1$	uma justificativa entre colchetes por linha

As três armadilhas próprias desta prova

1. **Trocar de convenção no meio da prova.** A lista faz isso na Q8. Na BJ, $\psi_1 = \phi - \theta$; no sinal positivo, $\psi_1 = \phi + \theta$.
2. **Confundir FAC e FACP.** No AR(2), $\phi_{22} = \phi_2$, mas $\rho_2 \neq \phi_2$. No SAR(1)$_s$, a FAC decai em $s, 2s, \ldots$, e a FACP tem um pico só.

3. **Contar errado o que se perde e o que se estima.** Perdem-se $d + sD$ observações. Os parâmetros são $p + q + P + Q + 1$ (o σ^2), mais a constante só se $d = D = 0$ e houver média.

4. O mínimo para saber de cor

Tudo o mais se deriva disto em poucas linhas. Formulário completo em formulario.md.

#	Resultado
1	Passeio com drift: $E = y_0 + ct$, Var $= t\sigma^2$, Cov $= (t-k)\sigma^2$
2	$\sum_{s=1}^{t} s = t(t+1)/2$ (drift com tendência; Q2 e Q8)
3	Processo linear: $\gamma_k = \sigma^2 \sum_j \psi_j \psi_{j+k}$
4	Estacionário $\Leftrightarrow$ raízes de $\phi(z)$ fora do círculo; invertível $\Leftrightarrow$ raízes de $\theta(z)$ fora
5	AR(2): $\phi_1 + \phi_2 < 1$, $\phi_2 - \phi_1 < 1$, $\lvert\phi_2\rvert < 1$
6	MA(1), BJ: $\rho_1 = -\theta/(1+\theta^2)$; com sinal positivo, troque o sinal
7	ARMA(1,1), BJ: $\gamma_0 = \frac{1+\theta^2-2\phi\theta}{1-\phi^2}\sigma^2$, $\rho_1 = \frac{(1-\phi\theta)(\phi-\theta)}{1+\theta^2-2\phi\theta}$, $\rho_k = \phi\rho_{k-1}$
8	Pesos do ARMA(1,1), BJ: $\psi_j = (\phi-\theta)\phi^{j-1}$, $\pi_j = (\phi-\theta)\theta^{j-1}$
9	Yule-Walker: $\rho_k = \sum \phi_i \rho_{k-i}$; $\gamma_0 = \sigma^2/(1 - \sum \phi_i \rho_i)$; $\phi_{22} = \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1-\rho_1^2}$
10	Sobrediferenciação: $\phi(B)\Delta y = (1-B)\theta(B)\varepsilon$; RB diferenciado tem $\rho_1 = -\frac{1}{2}$; AR(1) diferenciado tem $\rho_1 = -\frac{1-\phi}{2}$
11	SAR(1)$_s$: $\rho_{ms} = \Phi^m$, zero fora dos múltiplos; $(1-\phi B)(1-\Phi B^s)$ tem o termo $+\phi\Phi B^{s+1}$
12	Modelo das companhias aéreas: $\rho_1 = \frac{-\theta}{1+\theta^2}$, $\rho_s = \frac{-\Theta}{1+\Theta^2}$, $\rho_{s\pm1} = \frac{\theta\Theta}{(1+\theta^2)(1+\Theta^2)}$
13	MV condicional do AR(1) = MQO: $\hat{\phi} = \sum y_t y_{t-1} / \sum y_{t-1}^2$
14	$AIC = -2\ln L + 2k$, $BIC = -2\ln L + k\ln T$ (a AU02 divide por T); $LR = 2(\ell_1 - \ell_0) \sim \chi^2(r)$
15	Previsão: $e_T(h) = \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j a_{T+h-j}$, Var $= \sigma^2 \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2$, IC: $y_{T+h\lvert T} \pm 1{,}96\sqrt{\text{Var}}$
16	ARIMA(0,1,1) = SES com $\alpha = 1 - \theta$
17	Ljung-Box: $\nu = K - p - q - P - Q$

5. Plano até a prova

Como atacar a lista

1. **Não comece pela Q1. Comece pelo bloco 2 (Q5–Q8).** É o que mais pesa e é a base dos outros: raízes, ψ e π, γ_k, Yule-Walker. A ordem é bloco 2 $\longrightarrow$ 1 $\longrightarrow$ 3 $\longrightarrow$ 5 $\longrightarrow$ 4 $\longrightarrow$ 6, a mesma da apostila.
2. **Por questão, um ciclo de quatro passos**, sem ler a resolução antes:
    1. **Ler e marcar:** a convenção do MA (BJ ou sinal positivo), s, T e o verbo de cada item.
    2. **Tentar sozinho, de 10 a 15 minutos, no papel,** mesmo travando. Pergunte-se qual ferramenta resolve (F1–F9).
    3. **Comparar com a folha à mão, linha a linha.** Ache a **primeira linha** em que você divergiu e anote no log, com o código.
    4. **No dia seguinte, refazer sem olhar**, usando só a "Versão para a prova" da folha como roteiro.
3. **A apostila serve para destravar, não para ler antes.** Quando travar, leia só a pergunta de abertura e a imagem do capítulo. Faça a cadeia socrática **cobrindo as respostas**. A teoria e as demonstrações gerais ficam para depois da tentativa.

4. **Treine os cinco moldes, não as 16 questões.** Se o molde sai de cabeça, a questão sai.

Molde	Questões
(a) somar de 1 a t (telescópica), depois E e Var da soma	Q1, Q2, Q8 (II), Q10 (c, d)
(b) multiplicar pelo passado e tirar a esperança	Q3, Q6, Q7, Q8 (I), Q11
(c) raízes por Bhaskara e pesos por igualdade de coeficientes	Q5, Q6 (c), Q9, Q10 (b), Q11 (c)
(d) esperança condicional com as três regras [F9]	Q12 (c), Q15
(e) contas de critério: AIC/BIC, LR, Ljung-Box, $d + sD$, parâmetros	Q14, Q16, Q12 (b)

5. **Q2 e Q6, as questões escolhidas para fazer à mão:** copie a folha completa **uma vez**, depois refaça de cabeça em +1 e +3 dias, cronometrando. Metas: Q2 em até 12 minutos e Q6 em até 15.
6. **O mínimo de cor** (§4): escreva numa folha A4, de memória, a cada dois dias. O que faltar entra no log.
7. **No dia, as lições da P1 de Econometria I** (§3):
   - contas curtas primeiro;
   - fórmula geral e convenção antes dos números;
   - uma justificativa por linha;
   - fechar com a frase que o verbo pede.

O ciclo de 29/10 a 05/11

Cerca de 2h30 a 3h por dia; os simulados levam 1h50 mais 40 minutos de correção. Revisões do log em +1 e +3 dias. No papel, tudo está no volume único `caderno_p1_completo.pdf`, e o mapa das questões na abertura dá as páginas.

Dia	Foco	Tarefas
qui 29/10	bloco 2 (Q5–Q8)	ciclo dos quatro passos em Q5, Q7 e Q8; **copiar a folha completa da Q6**; cadeia socrática do cap. 2
sex 30/10	bloco 1 (Q1–Q4)	ciclo em Q1, Q3 e Q4; **copiar a folha completa da Q2**; Q6 de cabeça, cronometrada (+1)
sáb 31/10	blocos 3 e 5 (Q9–Q12, Q15)	ciclo nas cinco questões; Q2 de cabeça (+1); refazer os erros do log de 29/10 (+1)
dom 01/11	diagnóstico	**Simulado 01** cronometrado, correção pela rubrica e log; blocos 4 e 6 (Q13, Q14, Q16) pelo molde (e)
seg 02/11	guia, à noite	questões-tipo 4, 7, 8 e 9 do guia; ver a reta final, hora a hora, abaixo
ter 03/11	o dia todo	**Simulado 02 às 10h**, no horário da prova; correção pelo guia; ver abaixo
qua 04/11	aula e noite	dúvidas ao professor às 10h; à noite, só consolidação; ver abaixo
qui 05/11	**prova às 10h**	ver abaixo

O Simulado 01 foi feito em 01/11, e a correção mostra onde os pontos foram embora. O Simulado 03 completo saiu do plano: não há tempo, e cansaria na véspera. Dele, ficam só as contas, na terça.

Se sobrar tempo num dia, use o banco do bloco do dia: cada questão tem uma variação curta com resposta.

A reta final, hora a hora (02/11 a 05/11)

A versão de uma página, para imprimir e deixar à vista, é `caderno_plano_reta_final.pdf`, na pasta `caderno/pdf/`.

A lógica é **aprender pelo guia, testar no Simulado 02 no mesmo horário da prova, corrigir pelo guia e consolidar sem matéria nova**. Em cada questão-tipo, o método é sempre o mesmo:

1. ler o enunciado-tipo e o "Antes de escrever";
2. **cobrir o resto e tentar no papel**;
3. conferir linha a linha e, na primeira linha diferente, ler o sentido dela.

Segunda, 02/11, das 20h30 às 23h: as quatro questões-tipo que mais valem.

Hora	O quê
20h30–20h45	básico, camadas 1 e 2, só leitura
20h45–21h30	**questão-tipo 4, ARMA(1,1)**, a que travou no S1
21h30–21h40	pausa
21h40–22h10	questões-tipo 7 (AIC, BIC e MQO) e 8 (previsão)
22h10–22h30	questão-tipo 9 (SARIMA)
22h30–22h50	**questão-tipo 4 de novo, em folha branca, em até 15 minutos**
22h50–23h	o que errou vai para o log; dormir. **Não abrir o S2**

Terça, 03/11: aprender, testar e corrigir.

Hora	O quê
8h30–8h50	camadas 1 e 2 do básico **de memória**, numa folha; conferir
8h50–9h50	questões-tipo 6, 2 e 3, cobrindo e tentando
9h50–10h	pausa
10h–11h50	**Simulado 02 em modo prova**: 3 min de leitura; 25 min de contas curtas; derivações; frase de fecho em cada item
12h–13h30	almoço e descanso
13h30–14h30	correção pelo gabarito, por passo; log; coluna S2 do placar
14h30–16h	**cada item com perda**: a questão-tipo de mesmo número no guia, o sentido das linhas que faltaram, e o item refeito em folha branca
16h–16h15	pausa
16h15–17h15	questões-tipo 5 e 1, cobrindo e tentando
17h15–18h	Simulado 03, **só as contas**: Q3 c), Q4 b)–c) e Q5 a)–b)
18h–19h30	jantar e descanso
19h30–20h30	**questão-tipo 4 de cabeça** (+1 dia) e S1 Q2 de cabeça; conferir
20h30–21h	as **9 frases de fecho** de memória; conferir no guia
21h–21h30	a lista de dúvidas para o professor (abaixo), com as que o S2 levantou
21h30	parar

Quarta, 04/11: aula, professor e a última consolidação.

Hora	O quê
antes da aula	20 min: camadas 1 a 3 do básico de memória
10h, aula	**levar as dúvidas escritas**

Hora	O quê
almoço e intervalos	só as seções “Erro que não pode” do guia
18h–19h	chegar, comer, descansar; nada de matéria
19h–20h	em folha branca: **questão-tipo 4** (+2 dias) e questão-tipo 5
20h–20h45	contas cronometradas do banco: Q14 A, Q15 A, Q16 A e Q6 A
20h45–21h15	refazer só as linhas do log que ainda erra
21h15–21h45	o básico inteiro, devagar; as 9 frases de fecho de memória
até 22h30	**parar e dormir**: a consolidação acontece no sono, e a prova é às 10h

Fica de fora a partir de agora: o Simulado 04, a verossimilhança exata, os testes de raiz unitária, Beveridge-Nelson, a avaliação de previsões e o trabalho do INPC.

Quinta, 05/11, prova às 10h.

- Acordar às 7h. Às 8h, 15 minutos: o básico, os quatro movimentos do ARMA e a ordem da prova.
- **Na prova:**
  1. 3 minutos de leitura, marcando a convenção do MA, o T e o s;
  2. cerca de 25 minutos só de contas curtas;
  3. as derivações, da mais curta para a mais longa;
  4. a frase de fecho em cada item.

Dúvidas para o professor (quarta, 04/11)

1. **Sinal do MA:** a prova usa o $1 - \theta B$ da lista ou o $1 + \theta_1 L$ dos slides? Basta declarar a convenção na primeira linha?
2. **AIC e BIC:** na forma do R ($-2 \ln L + 2k$) ou na da AU02, dividida por T? O k inclui o σ^2?
3. **“Mostre que”:** os momentos do ARMA(1,1) precisam ser derivados pelos momentos auxiliares, ou pode-se partir da fórmula de γ_0?
4. **SARIMA:** pode cair o cálculo da FAC multiplicativa (pico e satélites), ou basta escrever o modelo e contar parâmetros?
5. **Consulta:** a prova é sem consulta? Os valores de χ^2 e da normal vêm no enunciado?
6. As dúvidas que o Simulado 02 levantar na terça.

Os simulados

O **Simulado 02** é diferente dos outros: tem **9 questões, uma por questão-tipo** do guia “não posso errar”, na mesma ordem, e testa só o básico que não se pode errar. Cada item travado manda de volta à questão-tipo de mesmo número.

Os Simulados 01, 03 e 04 têm 6 questões (uma por bloco). Todos somam 10,0 pontos e cabem em 1h50 com 10 minutos de revisão. Os números não se repetem entre simulados, nem com o banco, nem com o guia.

Bloco	Simulado 01	Simulado 03	Simulado 04 (opcional)
1. Processos	passeio sem drift e soma de processos	TS × DS	processo harmônico; MA(1) com par não invertível
2. ARMA	ARMA(1,1), BJ	V ou F do ARMA(1,1) com sinal positivo	AR(2) completo
3. ARIMA e SARIMA	AR(1) sobrediferenciado	previsão numérica do SARIMA$(1,1,0)(0,1,1)_4$	SAR$(1)_4$, AR(5) restrito, ARIMA(1,1,1)

Bloco	Simulado 01	Simulado 03	Simulado 04 (opcional)
4. Estimação	AIC/BIC com $T = 200$; MV condicional	AIC, BIC e LR entre SARIMA	AIC/BIC da AU02, LR, MV exata
5. Previsão	AR(1) com média e o previsor ótimo	MA(2): previsão e memória	ARMA(1,1) com sinal positivo; SES
6. Aplicação	modelo das companhias aéreas	identificação pela FAC amostral	SARIMA$(1,0,0)(0,1,1)_{12}$ e Ljung-Box

Parte II

Banco de variações da lista

CAPÍTULO 2

Banco de variações da lista

A prova sai da lista: **5 ou 6 questões, uma por bloco**. O professor raramente repete o número, mas costuma repetir a **estrutura**: troca o período sazonal, a convenção de sinal, o T do AIC, ou um AR por um MA. Para cada questão da lista, este banco traz:

- a ideia central em uma linha;
- duas ou três **variações** com resposta curta;
- onde está a resolução completa no repositório;
- o capítulo dos livros que cobre o tema.

Nenhuma variação repete os números dos simulados, que ficam para o treino cronometrado. Todos os números saem de prova.R.

> **Como usar**
>
> Tampe a resposta, resolva a variação em até 5 minutos e só então confira. Toda variação errada vira uma linha no log de erros.

Livros, por id (MATERIAIS_INDEX):

- ENDERS: cap. 1 (equações de diferenças), cap. 2 (ARMA, Box-Jenkins, previsão, sazonalidade) e cap. 4 (tendências e raiz unitária).
- HAMILTON: cap. 2 (operadores), cap. 3 (ARMA estacionário), cap. 4 (previsão e Wold) e cap. 5 (máxima verossimilhança).
- BJRL: cap. 3 e 4 (modelos estacionários e não estacionários), cap. 5 (previsão), cap. 6 a 8 (identificação, estimação, diagnóstico) e cap. 9 (sazonais).
- TSAY: cap. 2.
- MAT: Mattos (2019), tendências e raízes unitárias.

Bloco 1 — Processos, estacionariedade e momentos

Q1 · Momentos do passeio com drift

Ideia: escrever y_t como soma dos choques e tirar os momentos termo a termo. Resolução em 01_lista, D01.1 · ENDERS cap. 4 · AU01.

Variação A. Mesmo processo, $y_t = c + y_{t-1} + u_t$, mas com y_0 **aleatório**, de variância σ_0^2 e não correlacionado com os u. **Resposta.** $\text{Var}(y_t) = \sigma_0^2 + t\sigma^2$ e $\text{Cov}(y_t, y_{t-k}) = \sigma_0^2 + (t-k)\sigma^2$. Continua não estacionário: a variância ainda cresce com t.

Variação B. Calcule os momentos de Δy_t. **Resposta.** $\Delta y_t = c + u_t$: $E = c$, $\text{Var} = \sigma^2$ e $\text{Cov} = 0$ para $k \geq 1$. Estacionário, porque uma diferença basta: $y \sim I(1)$.

Q2 · Drift e tendência determinística

Ideia: a tendência δt dentro da equação vira uma tendência **quadrática** no nível. Resolução em 01_lista · MAT · ENDERS cap. 4.

Variação A. Com $c = 1$, $\delta = 0{,}2$ e $y_0 = 0$, quanto vale $E(y_{10})$? **Resposta.** $E(y_t) = ct + \delta t(t+1)/2$, logo $E(y_{10}) = 10 + 0{,}2 \cdot 55 = 21$. **Escreva a soma $\sum_{s=1}^{t} s = t(t+1)/2$ antes do número.**

Variação B. Qual operação torna o processo estacionário? **Resposta.** $\Delta y_t = c + \delta t + u_t$ ainda tem tendência linear. Ou se tira a tendência de Δy_t por regressão, ou se diferencia de novo: $\Delta^2 y_t = \delta + u_t - u_{t-1}$, que é estacionário, mas tem MA não invertível. A primeira opção é a preferível (lista, Q2d).

Q3 · Soma de processos estacionários

Ideia: $\gamma_{az_1+bz_2}(k) = a^2\gamma_1(k) + b^2\gamma_2(k)$ quando não há correlação cruzada. A FAC que corta em q indica um MA(q). Resolução em 01_lista.

Variação A. Com as FAC da lista, calcule a de $z_1 - z_2$. **Resposta.** O sinal some ao quadrado: $\gamma_0 = 0{,}5 + 2{,}30 = 2{,}8$, $\gamma_1 = 0{,}2 - 1{,}43 = -1{,}23$, $\gamma_2 = 0{,}3$ e zero depois. É um MA(2).

Variação B. E de $3z_1 + z_2$? **Resposta.** $\gamma_0 = 9(0{,}5) + 2{,}30 = 6{,}8$, $\gamma_1 = 9(0{,}2) - 1{,}43 = 0{,}37$, $\gamma_2 = 0{,}30$. Também é um MA(2).

Variação C. E se z_1 e z_2 fossem correlacionados? **Resposta.** Entram as covariâncias cruzadas $ab[\gamma_{12}(k) + \gamma_{21}(k)]$. Sem elas, a conta não fecha: por isso o enunciado sempre diz "não correlacionados". **Cite essa hipótese na primeira linha.**

Q4 · Teorema de Wold

Ideia: todo processo estacionário é a soma de uma parte linear nos choques, com $\psi_0 = 1$ e $\sum \psi_j^2 < \infty$, e uma parte determinística. Resolução em 01_lista e D01.3 · HAMILTON cap. 4.

Variação A. Escreva o MA(1) $y_t = (1 - \theta B)a_t$ como AR(∞), com $\theta = 0{,}5$. **Resposta.** $(1 - \theta B)^{-1} = \sum_j \theta^j B^j$, logo $y_t = -\sum_{j\geq 1} \theta^j y_{t-j} + a_t$, isto é, $\pi_j = -\theta^j$: $-0{,}5$; $-0{,}25$; $-0{,}125$. Com $\theta = 2$, a série diverge: sem invertibilidade, não há AR(∞).

Variação B. Por que exigir $\sum \psi_j^2 < \infty$? **Resposta.** Porque $\text{Var}(y_t) = \sigma^2 \sum \psi_j^2$ precisa ser finita. É a condição de estacionariedade fraca escrita nos pesos.

Variação C. Dê um exemplo de componente determinístico. **Resposta.** $A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)$, com A e B aleatórios fixados no início: é estacionário e perfeitamente previsível. Ver o Simulado 04, Q1.

Bloco 2 — AR, MA e ARMA

Q5 · Classificar, raízes e pesos

Ideia: fatorar os polinômios, olhar as raízes e **procurar fator comum**. Resolução em 02_lista · ENDERS cap. 2 · BJRL cap. 3.

Variação A. $(1 - 0{,}8B + 0{,}15B^2)z_t = (1 - 0{,}3B)a_t$. **Resposta.** $1 - 0{,}8B + 0{,}15B^2 = (1 - 0{,}5B)(1 - 0{,}3B)$, com raízes 2 e 3,3333. O fator $(1 - 0{,}3B)$ cancela: é um **AR(1)** com $\phi = 0{,}5$, disfarçado de ARMA(2,1).

Variação B. $z_t = (1 - 2{,}5B + B^2)a_t$. **Resposta.** $(1 - 0{,}5B)(1 - 2B)$, com raízes 2 e 0,5. A raiz 0,5 está **dentro** do círculo: o MA(2) é estacionário, mas **não invertível**.

Variação C. $(1 - 1{,}2B + 0{,}2B^2)z_t = a_t$. **Resposta.** $(1 - B)(1 - 0{,}2B)$, com raízes 1 e 5. Há **raiz unitária**: não é estacionário. É um ARIMA(1,1,0), com $(1 - 0{,}2B)\Delta z_t = a_t$.

Q6 · ARMA(1,1)

Ideia: dois momentos auxiliares, $E(z_t a_t)$ e $E(z_t a_{t-1})$, e um sistema 2×2 para γ_0 e γ_1. Resolução em 02_lista · HAMILTON cap. 3.

Variação A. BJ, com $\phi = 0{,}9$ e $\theta = 0{,}5$. **Resposta.** $\rho_1 = \frac{(1-\phi\theta)(\phi-\theta)}{1+\theta^2-2\phi\theta} = \frac{0{,}55\cdot 0{,}4}{0{,}35} = 0{,}6286$ e $\rho_2 = 0{,}5657$. A FAC decai devagar porque ϕ está perto de 1.

Variação B. E se $\phi = \theta$? **Resposta.** Os fatores cancelam: $z_t = a_t$, e $\rho_1 = 0$. É ruído branco. Na estimação, isso aparece como $\hat{\phi} \approx \hat{\theta}$ com erros-padrão enormes.

Variação C. Mesmas fórmulas na convenção de sinal positivo? **Resposta.** Troque $\theta \to -\theta$: $\gamma_0 = \frac{1+2\phi\theta+\theta^2}{1-\phi^2}\sigma^2$ e $\psi_j = (\phi+\theta)\phi^{j-1}$. Ver o Simulado 03, Q2.

Q7 · AR(2) e Yule-Walker

Ideia: $\rho_k = \phi_1\rho_{k-1} + \phi_2\rho_{k-2}$ e $\gamma_0 = \sigma^2/(1-\phi_1\rho_1-\phi_2\rho_2)$. Resolução em 02_lista e D02.3 · ENDERS cap. 2.

Variação A. $\phi_1 = 1$ e $\phi_2 = -0{,}5$. **Resposta.**

- $\rho_1 = 1/1{,}5 = 0{,}6667$ e $\rho_2 = 0{,}6667 - 0{,}5 = 0{,}1667$.
- $\gamma_0 = \frac{1{,}5}{0{,}5\,(2{,}25-1)} = 2{,}4$.
- As raízes são complexas, com módulo $1{,}4142 > 1$: o processo é estacionário, e a FAC é uma **senoide amortecida**.
- $\cos\omega = \phi_1/(2\sqrt{-\phi_2}) = 0{,}7071$, logo $\omega = \pi/4$, e o ciclo tem período de **8** períodos (D02.4).

Variação B. Como se reconhece um AR(2) na FACP? **Resposta.** $\phi_{11} = \rho_1$, $\phi_{22} = (\rho_2 - \rho_1^2)/(1-\rho_1^2) = \phi_2$, e $\phi_{kk} = 0$ para $k \geq 3$.

Q8 · Verdadeiro ou falso

Ideia: cada afirmativa pede a conta. **A Q8 usa sinal positivo.** Resolução em 02_lista.

Variação A. No modelo (II), com $c = 1$, $\theta = 0{,}5$ e $Z_0 = 0$, quanto vale $E(Z_4)$? Confira a afirmativa 4 da lista. **Resposta.** $Z_t = Z_0 + ct + \theta\sum_{s=1}^{t} s + \sum \varepsilon_j$, logo $E(Z_4) = 4 + 0{,}5\cdot 10 = 9$. A fórmula da afirmativa, com $\frac{\theta}{2}t^2$, dá 8: **falsa**, porque $\sum s = t(t+1)/2$, e não $t^2/2$.

Variação B. A variância do modelo (II) depende de c ou de θ? **Resposta.** Não: $\mathrm{Var}(Z_t) = t\sigma^2$. Constantes e tendências determinísticas não têm variância (afirmativa 5: falsa).

Bloco 3 — Integrados, ARIMA e SARIMA

Q9 · Sobrediferenciação

Ideia: $\phi(B)\Delta y_t = (1-B)\theta(B)\varepsilon_t$. O MA ganha raiz unitária. Resolução em 03_lista e D03.2 · BJRL cap. 4.

Variação A. Diferencie um ruído branco. **Resposta.** $\Delta y_t = \varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}$, com $\rho_1 = -0{,}5$, o valor-limite de um MA(1), e $\mathrm{Var} = 2\sigma^2$: a variância **dobra**.

Variação B. AR(1) com $\phi = 0{,}9$. **Resposta.** $\rho_1(\Delta y) = -(1-\phi)/2 = -0{,}05$. Quase não aparece na FAC: com ϕ perto de 1, a sobrediferenciação é difícil de ver, e o teste de raiz unitária tem pouco poder (D03.3).

Q10 · ARIMA × tendência determinística

Ideia: DS se diferencia; TS se regride em t. Resolução em 03_lista · MAT · ENDERS cap. 4.

Variação A. $y_t = \alpha + \beta t + u_t$, com u_t ruído branco, foi diferenciado. **Resposta.** $\Delta y_t = \beta + u_t - u_{t-1}$: um MA(1) com $\theta = 1$, não invertível, com $\rho_1 = -0{,}5$. O procedimento não é adequado.

Variação B. Expanda o ARIMA(2,1,0) $(1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2)(1 - B)y_t = a_t$. **Resposta.** $y_t = (1 + \phi_1)y_{t-1} + (\phi_2 - \phi_1)y_{t-2} - \phi_2 y_{t-3} + a_t$. Os coeficientes somam 1: é a raiz unitária.

Q11 · SAR e o AR restrito

Ideia: o SAR(1)$_s$ é um AR(1) "em anos". O multiplicativo gera termos cruzados. Resolução em 03_lista · BJRL cap. 9.

Variação A. SAR(1)$_{12}$ com $\Phi = 0{,}5$ e $\sigma^2 = 1$. **Resposta.** $\gamma_0 = 1/(1 - 0{,}25) = 1{,}3333$, $\rho_{12} = 0{,}5$, $\rho_{24} = 0{,}25$, e zero fora dos múltiplos de 12. A FACP tem um pico só, em 12.

Variação B. Escreva SARIMA$(0,0,1)(0,0,1)_{12}$ como MA restrito. **Resposta.** $(1 - \theta B)(1 - \Theta B^{12}) = 1 - \theta B - \Theta B^{12} + \theta\Theta B^{13}$. É um MA(13) com restrições: dez coeficientes nulos e $\theta_{13} = -\theta\Theta$ na convenção BJ.

Q12 · Previsão do SARIMA trimestral

Ideia: expandir, tirar $E(\cdot \mid \mathcal{F}_T)$ termo a termo e ver em que h o MA some. Resolução em 03_lista · BJRL cap. 5 e 9.

Variação A. SARIMA$(0,1,1)(0,1,1)_4$: equações de previsão. **Resposta.**

- $y_t = y_{t-1} + y_{t-4} - y_{t-5} + a_t - \theta a_{t-1} - \Theta a_{t-4} + \theta\Theta a_{t-5}$.
- $\hat{y}(1) = y_T + y_{T-3} - y_{T-4} - \theta\hat{a}_T - \Theta\hat{a}_{T-3} + \theta\Theta\hat{a}_{T-4}$.
- O MA some a partir de $h = 6$.
- Perdem-se 5 observações.

Variação B. E com $s = 12$, $d = 1$ e $D = 1$? **Resposta.** Perdem-se 13 observações. No modelo com MA(1)×SMA(1), os resíduos entram até $h = 13$.

Bloco 4 — Identificação, estimação e diagnóstico

Q13 · MV condicional do AR(1)

Ideia: condicionar em y_1 transforma a MV em MQO. Resolução em 04_lista, D04.1 · HAMILTON cap. 5.

Variação A. Com constante, $y_t = c + \phi y_{t-1} + \varepsilon_t$. **Resposta.** $(\hat{c}, \hat{\phi})$ saem do MQO de y_t em $(1, y_{t-1})$, e $\hat{\sigma}^2 = SQR/(T - 1)$. A média estimada é $\hat{\mu} = \hat{c}/(1 - \hat{\phi})$.

Variação B. O estimador é não viesado? **Resposta.** Não: y_{t-1} não é estritamente exógeno, e há o viés de Hurwicz, de cerca de $-2\phi/T$ sem constante e $-(1 + 3\phi)/T$ com constante. Mas o estimador é **consistente** e assintoticamente normal.

Q14 · AIC e BIC

Ideia: k inclui σ^2. O BIC pune com $\ln T$, o AIC com 2. Resolução em 04_lista · AU02.

Variação A. $T = 100$: AR(1) com $\ln L = -140{,}2$; ARMA(1,1) com $-138{,}9$; AR(2) com $-138{,}7$. **Resposta.**

Modelo	k	AIC	BIC
AR(1)	2	284,4	**289,610**
ARMA(1,1)	3	283,8	291,616
AR(2)	3	**283,4**	291,216

O AIC escolhe o AR(2), e o BIC escolhe o AR(1).

Variação B. Esqueci de contar σ^2: muda a escolha? **Resposta.** Não, se todos os modelos estimam σ^2: somar 1 a todos os k desloca todos os critérios igualmente. **Mas o valor pedido fica errado e perde ponto.**

Bloco 5 — Previsão

Q15 · Previsão em ARMA

Ideia: $y_{T+h|T} = E(y_{T+h} \mid \mathcal{F}_T)$; o erro é um MA($h-1$); a variância é $\sigma^2 \sum_{j<h} \psi_j^2$. Resolução em 05_lista, D05.1 · HAMILTON cap. 4 · BJRL cap. 5.

Variação A. AR(2) com $\phi = (0{,}6;\ 0{,}2)$, $y_T = 2$, $y_{T-1} = 1$ e $\sigma^2 = 1$. **Resposta.** $y_{T+1|T} = 0{,}6 \cdot 2 + 0{,}2 \cdot 1 = 1{,}4$ e $y_{T+2|T} = 0{,}6 \cdot 1{,}4 + 0{,}2 \cdot 2 = 1{,}24$. Com $\psi_1 = 0{,}6$, $\text{Var}(e_T(2)) = 1 + 0{,}36 = 1{,}36$.

Variação B. Por que a variância do erro nunca diminui com h? **Resposta.** Cada passo acrescenta $\sigma^2\psi_{h-1}^2 \geq 0$. No limite, ela converge para γ_0 num processo estacionário e diverge num processo I(1).

Variação C. ARIMA(0,1,1): qual a constante da suavização exponencial? **Resposta.** $\alpha = 1 - \theta$, na convenção BJ.

Bloco 6 — Aplicação

Q16 · SARIMA mensal

Ideia: escrever o modelo, contar os parâmetros, prever a FAC de w_t e escolher entre modelos aninhados. Resolução em 06_lista · BJRL cap. 9 · AU03.

Variação A. SARIMA$(2,1,1)(1,1,1)_{12}$ com $T = 240$. **Resposta.** São ϕ_1, ϕ_2, θ, Φ, Θ e σ^2: **6** parâmetros. Perdem-se 13 observações, e sobram 227.

Variação B. Que padrão na FAC de w_t indicaria SAR em vez de SMA? **Resposta.** Com SMA(1), a FAC corta em 12. Com SAR(1), ela **decai** em 12, 24, 36… e a FACP corta em 12.

Parte III

Simulados

CAPÍTULO 3

Simulado 01

> **Regras**
>
> Sem consulta e sem calculadora gráfica, **1h50**, cronometrado. Total: 10,0 pontos, uma questão por bloco da lista. Comece pelos itens de conta curta (Q4 e Q1c) e só depois vá às demonstrações. Em todo item, escreva **primeiro a fórmula geral** e, se houver MA, **a convenção de sinal**. O gabarito com rubrica está em simulado_01_gabarito.md; não abra antes de terminar.

Notação. a_t, ε_t e u_t são ruído branco, $RB(0, \sigma^2)$. O operador de defasagem é B, e o MA segue a convenção da lista: $\theta(B) = 1 - \theta_1 B - \cdots - \theta_q B^q$.

Questão 1 (1,5) — Bloco 1: processos e momentos

Seja o passeio aleatório sem drift $y_t = y_{t-1} + u_t$, com $y_0 = 2$ fixo.

a) Escreva y_t em função de y_0 e dos choques e calcule $E(y_t)$, $\mathrm{Var}(y_t)$ e $\mathrm{Cov}(y_t, y_{t-k})$, $0 \le k < t$. **(0,5)**

b) Mostre que $\mathrm{Corr}(y_t, y_{t-k}) = \sqrt{(t-k)/t}$ e calcule-a para $t = 100$ com $k = 1$ e $k = 10$. O que isso diz sobre a FAC amostral de um passeio aleatório? **(0,5)**

c) Dois processos estacionários e não correlacionados entre si têm autocovariâncias x_t : $\gamma_0 = 1{,}0$, $\gamma_1 = 0{,}4$, $\gamma_j = 0$ $(j \ge 2)$ e w_t : $\gamma_0 = 1{,}5$, $\gamma_1 = -0{,}6$, $\gamma_2 = 0{,}1$, $\gamma_j = 0$ $(j \ge 3)$. Calcule a autocovariância de $y_t = 2x_t + w_t$ e diga a que classe ARMA ele pertence. **(0,5)**

Questão 2 (2,0) — Bloco 2: ARMA

Considere $z_t - 0{,}6 z_{t-1} = a_t - 0{,}3 a_{t-1}$, com $\sigma_a^2 = 1$.

a) Escreva o modelo com o operador B e verifique estacionariedade e invertibilidade pelas raízes. **(0,4)**

b) Calcule γ_0, γ_1 e γ_2. **(0,6)**

c) Obtenha ρ_1 e ρ_2 e mostre que $\rho_k = \phi \rho_{k-1}$ para $k \ge 2$. **(0,4)**

d) Obtenha os três primeiros pesos ψ_j e π_j. **(0,6)**

Questão 3 (1,5) — Bloco 3: integração e sobrediferenciação

Seja $y_t = 0{,}5 y_{t-1} + \varepsilon_t$, $\varepsilon_t \sim RB(0, 1)$, e $w_t = \Delta y_t$.

a) Mostre que $(1 - 0{,}5B) w_t = (1 - B)\varepsilon_t$ e diga por que w_t não é invertível. **(0,5)**

b) Calcule $\mathrm{Var}(w_t)$ e $\rho_1(w)$ e compare com $\mathrm{Var}(y_t)$. **(0,6)**

c) Quais são as consequências de diferenciar esta série para a estimação e para a previsão? **(0,4)**

Questão 4 (1,5) — Bloco 4: estimação e seleção

a) Com $T = 200$, quatro modelos de média zero deram as log-verossimilhanças: AR(1) $-301{,}2$; ARMA(1,1) $-299{,}8$; AR(2) $-298{,}9$; AR(3) $-297{,}0$. Contando σ^2 em k e usando $\ln 200 \approx 5{,}2983$, calcule AIC e BIC e diga qual modelo cada critério escolhe. Por que podem discordar? **(0,9)**

b) Num AR(1) sem constante com $T = 101$, as somas de $t = 2$ a T são $\sum y_t y_{t-1} = 84$, $\sum y_{t-1}^2 = 120$ e $\sum y_t^2 = 130$. Escreva a log-verossimilhança condicional em y_1 e obtenha $\hat{\phi}$ e $\hat{\sigma}^2$. **(0,6)**

Questão 5 (2,0) — Bloco 5: previsão

Seja $y_t - 10 = 0{,}8(y_{t-1} - 10) + a_t$, $\sigma_a^2 = 4$, e $y_T = 12$.

a) Mostre que o previsor de mínimo EQM de y_{T+h} é $E(y_{T+h} \mid \mathcal{F}_T)$. **(0,6)**

b) Calcule $y_{T+h|T}$ para $h = 1, 2, 3$ e a fórmula geral. **(0,4)**

c) Mostre que o erro de previsão é um MA($h-1$) e calcule sua variância para $h = 1, 2, 3$. **(0,5)**

d) Construa os intervalos de 95% para $h = 1$ e $h = 2$. Para onde vão a previsão e a variância quando $h \to \infty$? **(0,5)**

Questão 6 (1,5) — Bloco 6: SARIMA aplicado

Uma série mensal com $T = 180$ observações foi identificada como SARIMA$(0,1,1)(0,1,1)_{12}$, com $\theta = 0{,}4$ e $\Theta = 0{,}6$.

a) Escreva o modelo com o operador B e expanda o lado MA. **(0,3)**

b) Quantos parâmetros são estimados? Quantas observações sobram depois das diferenças? **(0,3)**

c) Calcule a FAC teórica de $w_t = (1-B)(1-B^{12})y_t$ nas defasagens 1, 11, 12 e 13 e descreva a FACP. **(0,6)**

d) Para comparar com um SARIMA$(1,1,1)(0,1,1)_{12}$, que critério você usaria? **(0,3)**

CAPÍTULO 4

Simulado 02

Regras

Sem consulta, **1h50**, cronometrado, 10,0 pontos. Convenção da lista em todas as questões: MA de Box-Jenkins, $1 - \theta B$.
Cada questão é uma das nove questões-tipo do guia "não posso errar", na mesma ordem, com números que não aparecem lá.
Ordem sugerida, como na prova:

1. 3 minutos de leitura;
2. uns 25 minutos só de contas curtas: Q7, Q8 a)–d), Q9 a)–b), Q3 b) e Q4 e);
3. as derivações, da mais curta para a mais longa;
4. a frase de fecho em cada item.

A correção está no gabarito.

Questão 1 (1,0) — passeio com drift

Seja $y_t = 0{,}2 + y_{t-1} + u_t$, com $y_0 = 5$ fixo e $u_t \sim RB(0, 2)$.

a) Escreva y_t em função de y_0 e dos choques. Calcule $E(y_t)$, $\mathrm{Var}(y_t)$ e $\mathrm{Cov}(y_t, y_{t-k})$, citando a hipótese usada em cada passo. **(0,5)**

b) Para $t = 50$ e $k = 10$, dê os três momentos e a correlação $\mathrm{Corr}(y_t, y_{t-k})$. **(0,3)**

c) O processo é estacionário? Responda com o critério. **(0,2)**

Questão 2 (1,0) — soma de processos

O processo z_{1t} tem $\gamma_0 = 1{,}0$, $\gamma_1 = 0{,}45$ e autocovariância nula a partir da defasagem 2. O processo z_{2t} tem $\gamma_0 = 1{,}5$, $\gamma_1 = 0{,}6$, $\gamma_2 = 0{,}5$ e autocovariância nula a partir da defasagem 3. Os dois são estacionários, de média zero e não correlacionados em qualquer defasagem. Seja $z_{3t} = 3z_{1t} + z_{2t}$.

a) Deduza a autocovariância de z_3 em função das de z_1 e z_2. **(0,4)**

b) Calcule $\gamma_3(k)$ para $k = 0, 1, 2, 3$, e também ρ_1 e ρ_2. **(0,3)**

c) z_3 é estacionário? Qual modelo ARMA ele segue, e por quê? **(0,3)**

Questão 3 (1,0) — raízes e fator comum

Considere os modelos

$$\text{(i)}\ \ \tilde{z}_t = a_t - 0{,}65a_{t-1} + 0{,}1a_{t-2}; \qquad \text{(ii)}\ \ \tilde{z}_t - 0{,}25\tilde{z}_{t-1} = a_t - 0{,}65a_{t-1} + 0{,}1a_{t-2}.$$

a) Escreva (i) com o operador B, classifique-o e diga se é estacionário. **(0,2)**

b) Calcule as raízes do polinômio MA de (i) e conclua sobre a invertibilidade. **(0,4)**

c) Mostre que (ii) é, na verdade, um MA(1), e calcule seus pesos π_1, π_2 e π_3. **(0,4)**

Questão 4 (1,5) — ARMA(1,1)

Seja $z_t - 0{,}5z_{t-1} = a_t - 0{,}2a_{t-1}$, com $\sigma_a^2 = 2$.

a) Verifique estacionariedade e invertibilidade pelas raízes. **(0,2)**

b) Calcule os momentos auxiliares $E(z_t a_t)$ e $E(z_t a_{t-1})$. **(0,3)**

c) Calcule γ_0, γ_1 e γ_2. **(0,5)**

d) Obtenha ρ_1 e mostre que $\rho_k = 0{,}5\,\rho_{k-1}$ para $k \geq 2$. **(0,2)**

e) Calcule ψ_1, ψ_2, ψ_3 e π_1, π_2, π_3. **(0,3)**

Questão 5 (1,0) — AR(2)

Seja $y_t = 0{,}3y_{t-1} + 0{,}4y_{t-2} + \varepsilon_t$, com $\varepsilon_t \sim RB(0, 1)$.

a) Verifique a estacionariedade pelas raízes do polinômio AR. **(0,2)**

b) Escreva as equações de Yule-Walker e obtenha ρ_1, ρ_2 e ρ_3. **(0,4)**

c) Calcule γ_0. **(0,4)**

Questão 6 (1,0) — diferenciar um AR(1)

Seja $y_t = 0{,}2y_{t-1} + \varepsilon_t$, com $\varepsilon_t \sim RB(0, 1)$, e $w_t = \Delta y_t$.

a) Mostre que $(1 - 0{,}2B)w_t = (1 - B)\varepsilon_t$. O processo w_t é invertível? **(0,4)**

b) Calcule $\mathrm{Var}(y_t)$, $\mathrm{Var}(w_t)$ e $\rho_1(w)$. **(0,4)**

c) O que a diferenciação fez com a variância, e o que isso diz sobre diferenciar esta série? **(0,2)**

Questão 7 (1,0) — critérios e MQO

a) Com $T = 150$ e média zero, as log-verossimilhanças foram: AR(1), $-215{,}0$; AR(2), $-213{,}1$; ARMA(1,1), $-213{,}6$; ARMA(2,1), $-212{,}4$. Use $\ln 150 = 5{,}0106$ e conte σ^2 em k. Calcule AIC e BIC e diga qual modelo cada critério escolhe. **(0,6)**

b) Num AR(1) sem média com $T = 81$, as somas de $t = 2$ a T são $\sum y_t y_{t-1} = 45$, $\sum y_{t-1}^2 = 90$ e $\sum y_t^2 = 100$. Obtenha $\hat{\phi}$ e $\hat{\sigma}^2$ pela MV condicional. **(0,4)**

Questão 8 (1,5) — previsão

Seja $y_t - 50 = 0{,}6(y_{t-1} - 50) + a_t$, com $\sigma_a^2 = 9$ e $y_T = 55$.

a) Calcule $\hat{y}_T(h)$ para $h = 1, 2, 3$ e escreva a fórmula geral. **(0,4)**

b) Escreva os erros $e_T(1)$ e $e_T(2)$ e mostre que $e_T(h)$ é um MA$(h - 1)$. **(0,3)**

c) Calcule as variâncias dos erros para $h = 1, 2, 3$. **(0,3)**

d) Dê os intervalos de 95% para $h = 1$ e $h = 2$. **(0,3)**

e) O que acontece com a previsão e com a variância do erro quando $h \to \infty$? **(0,2)**

Questão 9 (1,0) — SARIMA trimestral

Uma série trimestral com $T = 100$ foi identificada como SARIMA$(0,1,1)(0,1,1)_4$, com $\theta = 0{,}5$ e $\Theta = 0{,}3$.

a) Escreva o modelo com o operador B e expanda o produto dos polinômios MA. **(0,3)**

b) Quantos parâmetros são estimados, e quantas observações efetivas restam? **(0,2)**

c) Calcule a FAC de $w_t = (1-B)(1-B^4)y_t$ nas defasagens 1 a 6. **(0,4)**

d) Um colega propõe acrescentar um AR(1) comum ao modelo. Com que critério se compara os dois? **(0,1)**

CAPÍTULO 5

Simulado 03

> **Regras**
>
> Sem consulta, **1h50**, 10,0 pontos. É o simulado mais longo: se aos 90 minutos faltar uma questão inteira, escreva só as **fórmulas e a estrutura** dela, porque elas valem ponto. Gabarito em simulado_03_gabarito.md.

Questão 1 (1,5) — Bloco 1: tendência determinística × estocástica

Com $\varepsilon_t \sim RB(0,1)$, considere

- **(TS)** $y_t = 2 + 0{,}5t + u_t$, com $u_t = 0{,}6u_{t-1} + \varepsilon_t$;
- **(DS)** $z_t = 0{,}5 + z_{t-1} + \varepsilon_t$, com $z_0 = 0$.

a) Calcule $E(y_t)$ e $\mathrm{Var}(y_t)$, e $E(y_{10})$. **(0,4)**

b) Calcule $E(z_t)$ e $\mathrm{Var}(z_t)$, e $\mathrm{Var}(z_{10})$. **(0,3)**

c) Qual o efeito de um choque unitário em ε_t sobre y_{t+5} e sobre z_{t+5}? **(0,3)**

d) Mostre que Δy_t é um ARMA(1,1) não invertível e calcule $\rho_1(\Delta y)$. Como se deve tirar a não estacionariedade de cada série? **(0,5)**

Questão 2 (2,0) — Bloco 2: verdadeiro ou falso

Na convenção de sinal positivo, seja $Y_t = \alpha Y_{t-1} + u_t + \beta u_{t-1}$, com $|\alpha| < 1$, $u_t \sim RB(0,\sigma^2)$, e $\gamma_h = E(Y_t Y_{t-h})$. Julgue, **com demonstração**, cada afirmativa. Depois, confira os números com $\alpha = \beta = 0{,}5$ e $\sigma^2 = 1$.

1. $\gamma_0 = \dfrac{1 + 2\alpha\beta + \beta^2}{1 - \alpha^2}\sigma^2$.
2. $\gamma_1 = \dfrac{(1 + \alpha\beta)(\alpha + \beta)}{1 - \alpha^2}\sigma^2$.
3. $\rho_2 = \alpha\rho_1$.
4. $\gamma_0 = \sigma^2/(1 - \alpha^2)$, porque a parte MA não afeta a variância.
5. Na representação $Y_t = \sum_{j\geq 1} \pi_j Y_{t-j} + u_t$, os pesos são $\pi_j = (\alpha + \beta)\beta^{j-1}$.
6. Como $|\alpha| < 1$, o processo é invertível.

Cada afirmativa julgada com a conta que a sustenta vale 0,25; o sistema que dá γ_0 e γ_1 vale 0,4; a conferência numérica, 0,1.

Questão 3 (2,0) — Bloco 3: previsão de um SARIMA trimestral

Para $(1 - 0{,}5B)(1 - B)(1 - B^4)y_t = (1 - 0{,}6B^4)a_t$, as últimas observações e resíduos são:

	$T-5$	$T-4$	$T-3$	$T-2$	$T-1$	T
y	100	104	98	101	107	103
$\hat{a}$	—	—	1,0	−0,5	0,8	0,4

a) Expanda o lado AR e escreva y_t em função do passado. **(0,6)**

b) Quantas observações se perdem com as diferenças? **(0,2)**

c) Calcule $y_{T+h|T}$ para $h = 1, \dots, 5$. **(1,0)**

d) Por que o termo MA some a partir de $h = 5$? Qual a forma da função de previsão a longo prazo? **(0,2)**

Questão 4 (1,5) — Bloco 4: seleção de SARIMA mensais

Com $T = 240$ observações mensais, ajustaram-se M1 = SARIMA$(1,1,1)(0,1,1)_{12}$, com $\ln L = -412{,}6$, e M2 = SARIMA$(2,1,1)(0,1,1)_{12}$, com $\ln L = -411{,}9$. Use o número de observações efetivas e $\ln 227 \approx 5{,}4250$.

a) Quantos parâmetros tem cada modelo? Quantas observações efetivas há? **(0,3)**

b) Calcule AIC e BIC. **(0,6)**

c) Faça o teste LR de M1 contra M2. **(0,4)**

d) Qual critério você recomendaria, e por quê? **(0,2)**

Questão 5 (1,5) — Bloco 5: previsão de um MA(2)

Seja $y_t = 3 + a_t - 0{,}5a_{t-1} + 0{,}2a_{t-2}$, com $\sigma_a^2 = 1$, $\hat{a}_T = 1$ e $\hat{a}_{T-1} = -2$.

a) Classifique na convenção Box-Jenkins e calcule $y_{T+h|T}$ para $h = 1, 2, 3$. **(0,5)**

b) Calcule $\mathrm{Var}(e_T(h))$ para $h = 1, 2, 3$ e o intervalo de 95% para $h = 3$. **(0,5)**

c) Mostre que, para $h > q$, a previsão é a média e a variância do erro é γ_0. O que isso diz sobre a "memória" de um MA(q)? **(0,5)**

Questão 6 (1,5) — Bloco 6: identificação e diagnóstico

Numa série mensal com $T = 240$, a FAC e a FACP amostrais de $w_t = (1-B)(1-B^{12})y_t$ deram:

Defasagem	1	2	3	11	12	13	24
FAC	−0,41	0,03	−0,05	0,17	−0,39	0,15	0,04
FACP	−0,41	−0,16	−0,12	0,06	−0,33	−0,20	−0,15

As demais defasagens ficaram dentro da banda.

a) Qual a banda aproximada de 95%? Que defasagens são significativas? **(0,3)**

b) Proponha um modelo e mostre que a FAC teórica com $\theta = \Theta = 0{,}5$ reproduz o padrão. **(0,6)**

c) O Ljung-Box dos resíduos com $K = 24$ deu $Q = 30{,}1$. Conclua com $\chi^2_{22;\,0{,}95} = 33{,}92$. **(0,4)**

d) E se a FAC dos resíduos tivesse um pico só na defasagem 12? **(0,2)**

CAPÍTULO 6

Simulado 04

Opcional.

Este era o Simulado 02 até 02/11. Ele traz as torções do professor (sinal positivo, AR(2) completo, sazonal trimestral, LR, Ljung-Box) e só vale a pena depois que o Simulado 02, com as nove questões-tipo, passar de 7.

Regras

Sem consulta, **1h50**, cronometrado, 10,0 pontos. Este simulado troca de convenção de sinal **dentro da prova** (Q1c e Q5 usam o sinal positivo dos slides; o resto usa Box-Jenkins). Antes de cada conta, escreva qual convenção está usando. Gabarito em simulado_04_gabarito.md.

Questão 1 (1,5) — Bloco 1: estacionariedade e Wold

a) Sejam A e B variáveis aleatórias não correlacionadas, com média zero e variância σ^2, e $\omega \in (0, \pi)$ fixo. Mostre que $z_t = A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)$ é estacionário de segunda ordem. **(0,4)**

b) Com $\omega = \pi/2$ e $\sigma^2 = 1$, calcule $\text{Cov}(z_t, z_{t-1})$ e $\text{Cov}(z_t, z_{t-2})$. Por que esse processo é o exemplo típico do componente **determinístico** da decomposição de Wold? **(0,4)**

c) Na convenção de sinal positivo, seja $x_t = a_t + 0{,}5a_{t-1}$ com $\sigma_a^2 = 2$. Calcule γ_0, γ_1 e ρ_1. Mostre que $x_t^* = e_t + 2e_{t-1}$, com $\sigma_e^2 = 0{,}5$, tem exatamente as mesmas autocovariâncias. Qual dos dois se escolhe, e por quê? **(0,7)**

Questão 2 (2,0) — Bloco 2: AR(2)

Seja $y_t = 0{,}5y_{t-1} + 0{,}3y_{t-2} + \varepsilon_t$, $\varepsilon_t \sim RB(0, 1)$.

a) Verifique a estacionariedade pelas três desigualdades do triângulo e pelas raízes do polinômio AR. **(0,4)**

b) Escreva as equações de Yule-Walker e obtenha ρ_1, ρ_2 e ρ_3. **(0,5)**

c) Calcule γ_0. **(0,4)**

d) Calcule ϕ_{11}, ϕ_{22} e ϕ_{33}. **(0,3)**

e) Calcule ψ_1, ψ_2 e ψ_3. **(0,4)**

Questão 3 (2,0) — Bloco 3: sazonalidade e ARIMA

a) Para o SAR(1)$_4$ $y_t = 0{,}6y_{t-4} + \varepsilon_t$, $\sigma^2 = 1$: calcule γ_0, ρ_4 e ρ_8 e diga quanto valem ρ_1 e ρ_3. Descreva a FACP. **(0,7)**

b) Escreva $(1 - 0{,}5B)(1 - 0{,}6B^4)y_t = \varepsilon_t$ como AR(5) e dê a restrição que os coeficientes satisfazem. **(0,6)**

c) Expanda o ARIMA(1,1,1) $(1 - 0{,}4B)(1 - B)y_t = (1 - 0{,}7B)a_t$ em equação de diferenças para y_t. **(0,4)**

d) Mostre que $w_t = \Delta y_t$ do item c) é um ARMA(1,1) estacionário e invertível. **(0,3)**

Questão 4 (1,5) — Bloco 4: seleção e verossimilhança

Com $T = 120$ e média zero: ARMA(1,1) $\ln L = -170{,}4$; AR(2) $\ln L = -171{,}9$; ARMA(2,1) $\ln L = -169{,}8$. Use $\ln 120 \approx 4{,}7875$ e $\chi^2_{1;\,0{,}95} = 3{,}84$.

a) Calcule AIC e BIC na forma da AU02 (divididos por T) e diga quais modelos são escolhidos. **(0,8)**

b) Teste ARMA(1,1) contra ARMA(2,1) pela razão de verossimilhança. **(0,4)**

c) Num AR(1), qual a diferença entre a verossimilhança exata e a condicional? Por que, com $T = 120$, isso quase não importa? **(0,3)**

Questão 5 (1,5) — Bloco 5: previsão

a) Na convenção de sinal positivo, $z_t = 0{,}5z_{t-1} + a_t + 0{,}4a_{t-1}$, $\sigma_a^2 = 1$, com $z_T = 2$ e $\hat{a}_T = 1$. Calcule $z_{T+h|T}$ para $h = 1, 2, 3$, os pesos ψ_1 e ψ_2, as variâncias dos erros para $h = 1, 2, 3$ e o intervalo de 95% para $h = 2$. **(1,0)**

b) No ARIMA(0,1,1) $\Delta y_t = a_t - 0{,}7a_{t-1}$, com $y_T = 50$ e $\hat{a}_T = 2$, calcule $y_{T+h|T}$ para todo $h \geq 1$ e mostre que a previsão é uma suavização exponencial simples. Qual a constante de suavização? **(0,5)**

Questão 6 (1,5) — Bloco 6: SARIMA aplicado

Uma série mensal com $T = 144$ foi modelada como SARIMA$(1,0,0)(0,1,1)_{12}$.

a) Escreva o modelo em B e a equação de y_t em função do passado. **(0,4)**

b) Quantos parâmetros e quantas observações efetivas? **(0,2)**

c) Escreva $y_{T+1|T}$ e $y_{T+13|T}$. **(0,4)**

d) O Ljung-Box dos resíduos com $K = 24$ deu $Q = 28{,}5$. Quantos graus de liberdade? Com $\chi^2_{22;\,0{,}95} = 33{,}92$, qual a conclusão? **(0,5)**

Parte IV

Gabaritos e log de erros

CAPÍTULO 7

Simulado 01 — gabarito

Enunciado em simulado_01.md. Todos os números saem de prova.R.

> **Como se corrigir**
>
> Some os pontos **por passo**, pelo que você escreveu, não pelo que sabia. Fórmula geral escrita e aplicada com erro de conta ainda vale o passo da fórmula. Número certo sem fórmula nem justificativa vale metade. Cada passo que faltou vira uma linha no log de erros.

Questão 1 (1,5)

Origem na lista: itens a) e b): (lista, Q1); item c): (lista, Q3).

a) Momentos do passeio sem drift (0,5)

Por substituição recursiva, $y_t = y_0 + \sum_{j=1}^{t} u_j$. Então:

- $E(y_t) = y_0 + \sum_j E(u_j) = 2$ *[RB: $E(u_j) = 0$]*;
- $\mathrm{Var}(y_t) = \sum_{j=1}^{t} \mathrm{Var}(u_j) = t\sigma^2$ *[RB: choques não correlacionados; y_0 fixo]*;
- $\mathrm{Cov}(y_t, y_{t-k}) = \mathrm{Cov}\left(\sum_{j=1}^{t} u_j, \sum_{i=1}^{t-k} u_i\right) = (t-k)\sigma^2$ *[só os $t-k$ choques comuns contam].*

Conclusão: a média é constante, mas variância e covariância dependem de t. **O processo não é estacionário.**

Rubrica	Pontos
Solução recursiva $y_0 + \sum u_j$	0,1
E, Var e Cov com a hipótese de RB citada	0,3
Frase-conclusão "não estacionário, porque Var depende de t"	0,1

b) A correlação e a FAC amostral (0,5)

$$\mathrm{Corr}(y_t, y_{t-k}) = \frac{(t-k)\sigma^2}{\sqrt{t\sigma^2\,(t-k)\sigma^2}} = \sqrt{\frac{t-k}{t}}.$$

Com $t = 100$: $k = 1$ dá $\sqrt{0{,}99} = 0{,}9950$; $k = 10$ dá $\sqrt{0{,}90} = 0{,}9487$.

Interpretação: a correlação fica perto de 1 por muitas defasagens e cai quase em linha reta. A FAC amostral de um passeio aleatório **decai muito devagar**, e esse é o sinal visual de raiz unitária (AU01; Enders, cap. 4). Num AR(1) estacionário, ao contrário, a queda é geométrica.

Rubrica	Pontos
Fórmula da correlação a partir de a)	0,2
Os dois valores	0,1
Ligação com a FAC amostral que decai devagar	0,2

c) Soma de processos (0,5)

Como x e w não são correlacionados, os termos cruzados somem:

$$\gamma_y(k) = \text{Cov}(2x_t + w_t,\ 2x_{t-k} + w_{t-k}) = 4\gamma_x(k) + \gamma_w(k).$$

$\gamma_0 = 4(1{,}0) + 1{,}5 = 5{,}5$, $\gamma_1 = 4(0{,}4) - 0{,}6 = 1{,}0$, $\gamma_2 = 0 + 0{,}1 = 0{,}1$ e $\gamma_k = 0$ para $k \geq 3$. Logo $\rho_1 = 0{,}1818$ e $\rho_2 = 0{,}0182$.

Conclusão: os momentos não dependem de t, então y_t é estacionário, e a FAC **corta depois da defasagem 2**: y_t é um **MA(2)** (lista, Q3).

Rubrica	Pontos
$\gamma_y = 4\gamma_x + \gamma_w$ citando a não correlação	0,2
$\gamma_0, \gamma_1, \gamma_2$	0,2
MA(2) pela FAC que corta em 2	0,1

Erro que custa ponto aqui

Escrever $2\gamma_x$ em vez de $4\gamma_x$: a constante sai **ao quadrado** da covariância. É o mesmo tipo de erro do efeito marginal na P1 de Econometria I: o número sem a fórmula escrita antes.

Questão 2 (2,0)

Origem na lista: itens a) e d): (lista, Q5); itens b) e c): (lista, Q6).

Convenção: Box-Jenkins, $\phi = 0{,}6$, $\theta = 0{,}3$.

a) Operador e raízes (0,4)

$(1 - 0{,}6B)z_t = (1 - 0{,}3B)a_t$.

- AR: $1 - 0{,}6z = 0 \Rightarrow z = 1{,}6667$, fora do círculo unitário: **estacionário**.
- MA: $1 - 0{,}3z = 0 \Rightarrow z = 3{,}3333$, fora do círculo unitário: **invertível**.
- Não há fator comum, então é um ARMA(1,1) de verdade.

b) Autocovariâncias (0,6)

Dois momentos auxiliares, multiplicando o modelo por a_t e a_{t-1}:

- $E(z_t a_t) = \sigma^2$;
- $E(z_t a_{t-1}) = \phi\sigma^2 - \theta\sigma^2 = (\phi - \theta)\sigma^2$.

Multiplicando por z_t e por z_{t-1} e tirando a esperança:

$$\gamma_0 = \phi\gamma_1 + \sigma^2 - \theta(\phi - \theta)\sigma^2, \qquad \gamma_1 = \phi\gamma_0 - \theta\sigma^2.$$

Substituindo a segunda na primeira:

$$\gamma_0 = \frac{1 + \theta^2 - 2\phi\theta}{1 - \phi^2}\sigma^2 = \frac{1 + 0{,}09 - 0{,}36}{1 - 0{,}36} = \frac{0{,}73}{0{,}64} = 1{,}140625.$$

Então $\gamma_1 = 0{,}6(1{,}140625) - 0{,}3 = 0{,}384375$ e, para $k \geq 2$, $\gamma_k = \phi\gamma_{k-1}$: $\gamma_2 = 0{,}230625$.

Rubrica	Pontos
$E(z_t a_t)$ e $E(z_t a_{t-1})$	0,2
Sistema de γ_0 e γ_1	0,2
Os três valores	0,2

c) FAC (0,4)

$\rho_1 = \gamma_1/\gamma_0 = \frac{(1-\phi\theta)(\phi-\theta)}{1+\theta^2-2\phi\theta} = \frac{0{,}82\cdot 0{,}3}{0{,}73} = 0{,}3370$ e $\rho_2 = 0{,}2022$.

Para $k \geq 2$, multiplicar o modelo por z_{t-k} dá $\gamma_k = \phi\gamma_{k-1}$, porque $E(a_t z_{t-k}) = E(a_{t-1} z_{t-k}) = 0$ *[z só depende de choques passados: causalidade].* Dividindo por γ_0: $\rho_k = \phi\rho_{k-1} = \phi^{k-1}\rho_1$. **A FAC decai geometricamente a partir de ρ_1, não de 1.**

d) Pesos (0,6)

$\psi(B) = \frac{1-\theta B}{1-\phi B}$ dá $\psi_j = (\phi-\theta)\phi^{j-1}$: $\psi_1 = 0{,}3$, $\psi_2 = 0{,}18$, $\psi_3 = 0{,}108$.

$\pi(B) = \frac{1-\phi B}{1-\theta B} = 1 - \sum_{j\geq 1}\pi_j B^j$ dá $\pi_j = (\phi-\theta)\theta^{j-1}$: $\pi_1 = 0{,}3$, $\pi_2 = 0{,}09$, $\pi_3 = 0{,}027$.

Os ψ convergem porque $|\phi| < 1$; os π, porque $|\theta| < 1$ (lista, Q6c).

Rubrica	Pontos
$\psi(B) = \theta(B)/\phi(B)$ e os três ψ_j	0,3
$\pi(B) = \phi(B)/\theta(B)$ e os três π_j	0,3

Questão 3 (1,5)

Origem na lista: (lista, Q9).

a) A forma ARMA de w_t (0,5)

Aplique $(1-B)$ dos dois lados de $(1-0{,}5B)y_t = \varepsilon_t$. Os operadores comutam:

$$(1-0{,}5B)(1-B)y_t = (1-B)\varepsilon_t \implies \boxed{(1-0{,}5B)w_t = (1-B)\varepsilon_t}$$

É um ARMA(1,1) com $\phi = 0{,}5$ e $\theta = 1$. O polinômio MA $1 - z$ tem raiz $z = 1$, **sobre** o círculo unitário. Os pesos de $\pi(B) = \frac{1-0{,}5B}{1-B} = 1 - 0{,}5(B + B^2 + \cdots)$ são todos iguais a 0,5 e não decaem: **não existe AR(∞) convergente**, então w_t não é invertível (D03.2).

b) Variância e FAC (0,6)

$$\mathrm{Var}(w_t) = 2(\gamma_0 - \gamma_1) = 2\gamma_0(1-\phi) = \frac{2\sigma^2}{1+\phi} = \frac{2}{1{,}5} = 1{,}3333.$$

$$\rho_1(w) = \frac{2\gamma_1 - \gamma_0 - \gamma_2}{2(\gamma_0 - \gamma_1)} = -\frac{1-\phi}{2} = -0{,}25.$$

$\mathrm{Var}(y_t) = \sigma^2/(1-\phi^2) = 1{,}3333$: com $\phi = 0{,}5$, **diferenciar não reduziu a variância**. Para $\phi < 0{,}5$ ela até aumenta. Variância que não cai e ρ_1 negativo são os dois sintomas clássicos de sobrediferenciação.

c) Consequências (0,4)

- **Estimação:** a MV do MA fica na fronteira $\theta = 1$, e a inferência sobre θ deixa de ser padrão (D03.2 e o *pile-up* do módulo 03).
- **Previsão:** o modelo diferenciado trata y como I(1). A previsão não volta à média, e a variância do erro cresce sem limite, quando a verdadeira converge para γ_0.
- **Princípio:** só diferenciar com evidência de raiz unitária (ADF e KPSS juntos).

Rubrica	Pontos
a) equação em B com os operadores comutando	0,2
a) raiz $z = 1 \Rightarrow$ não invertível $\Rightarrow$ sem AR(∞) (**a conclusão vale ponto**)	0,3
b) Var(w) e $\rho_1(w)$	0,4
b) comparação com Var(y)	0,2
c) estimação e previsão	0,4

Questão 4 (1,5)

Origem na lista: item a): (lista, Q14); item b): (lista, Q13).

a) AIC e BIC (0,9)

$AIC = -2\ln L + 2k$ e $BIC = -2\ln L + k\ln T$, com k contando os coeficientes **e** σ^2.

Modelo	k	$-2\ln L$	AIC	BIC	AIC/T (AU02)
AR(1)	2	602,4	606,4	**612,997**	3,032
ARMA(1,1)	3	599,6	605,6	615,495	3,028
AR(2)	3	597,8	603,8	613,695	3,019
AR(3)	4	594,0	**602,0**	615,193	3,010

O AIC escolhe o AR(3) e o BIC escolhe o AR(1). A divisão por T da AU02 não muda a ordem.

Por que discordam: cada parâmetro custa 2 no AIC e $\ln 200 = 5{,}30$ no BIC. O BIC pune mais e é **consistente**: se o modelo verdadeiro está entre os candidatos, ele o escolhe com probabilidade que vai a 1. O AIC é **eficiente** para previsão, mas tende a sobreparametrizar (lista, Q14).

Rubrica	Pontos
Fórmulas com k incluindo σ^2	0,2
Oito números	0,4
Escolhas e a explicação (penalidade, consistência × eficiência)	0,3

b) MV condicional = MQO (0,6)

Condicionando em y_1, com ε_t normal:

$$\ell(\phi,\sigma^2) = -\frac{T-1}{2}\ln(2\pi) - \frac{T-1}{2}\ln\sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{t=2}^{T}(y_t-\phi y_{t-1})^2.$$

Para ϕ, maximizar ℓ é minimizar a soma dos quadrados, isto é, **MQO**:

$$\hat\phi = \frac{\sum y_t y_{t-1}}{\sum y_{t-1}^2} = \frac{84}{120} = 0{,}7, \qquad \hat\sigma^2 = \frac{1}{T-1}\Big(\sum y_t^2 - \hat\phi\sum y_t y_{t-1}\Big) = \frac{130-58{,}8}{100} = 0{,}712.$$

Rubrica	Pontos
ℓ condicional com $T-1$ termos	0,2
Condição de primeira ordem e $\hat\phi = 0{,}7$	0,2
$\hat\sigma^2 = 0{,}712$	0,2

Erro que custa ponto aqui

Este é o item de conta curta que ficou em branco na P1 de Econometria I (Q4b: 340/85). São duas divisões. Faça este item **antes** das demonstrações.

Questão 5 (2,0)

Origem na lista: (lista, Q15).

a) O previsor ótimo (0,6)

Seja g qualquer função de $\mathcal{F}_T$ e $m = E(y_{T+h} \mid \mathcal{F}_T)$. Somando e subtraindo m:

$$E\big((y_{T+h}-g)^2\big) = E\big((y_{T+h}-m)^2\big) + E\big((m-g)^2\big) + 2E\big((y_{T+h}-m)(m-g)\big).$$

O termo cruzado é zero pela **lei das expectativas iteradas**: $(m-g)$ é conhecido em T, e $E(y_{T+h}-m \mid \mathcal{F}_T) = 0$. Como $E\big((m-g)^2\big) \geq 0$, o EQM é mínimo com $g = m$. **Conclusão:** $y_{T+h|T} = E(y_{T+h} \mid \mathcal{F}_T)$ (D05.1).

b) Previsões (0,4)

$y_{T+h|T} - 10 = 0{,}8^h(y_T - 10)$, logo 11,6, 11,28 e 11,024 para $h = 1, 2, 3$.

c) Erro de previsão (0,5)

Com $\psi_j = 0{,}8^j$: $e_T(h) = \sum_{j=0}^{h-1}\psi_j a_{T+h-j}$, um MA($h-1$) nos choques futuros, e

$$\operatorname{Var}\big(e_T(h)\big) = \sigma^2\sum_{j=0}^{h-1}\psi_j^2 \;:\quad 4;\;\; 4(1+0{,}64) = 6{,}56;\;\; 6{,}56 + 4(0{,}4096) = 8{,}1984.$$

d) Intervalos e longo prazo (0,5)

- $h = 1$: $11{,}6 \pm 1{,}96\sqrt{4}$, isto é, $[7{,}68;\ 15{,}52]$.
- $h = 2$: $11{,}28 \pm 1{,}96\sqrt{6{,}56} = 11{,}28 \pm 5{,}0200$, isto é, $[6{,}2600;\ 16{,}3000]$.
- $h \to \infty$: a previsão vai à média $\mu = 10$, e a variância vai a $\sigma^2/(1-\phi^2) = 11{,}111 = \gamma_0$. A incerteza da previsão de longo prazo é a variância incondicional.

Rubrica	Pontos
a) decomposição e termo cruzado zero pela LEI	0,4
a) **frase-conclusão** do mínimo	0,2
b) fórmula geral e três valores	0,4
c) MA($h-1$) com $\psi_0 = 1$ e as variâncias	0,5
d) dois intervalos e limites	0,5

Erro que custa ponto aqui

Esquecer $\psi_0 = 1$ e escrever $\text{Var}(e_T(1)) = 0$, ou somar ψ_j^2 até h em vez de $h-1$. Escreva o MA($h-1$) do erro antes da variância.

Questão 6 (1,5)

Origem na lista: (lista, Q16).

a) Modelo (0,3)

$$(1-B)(1-B^{12})y_t = (1-0{,}4B)(1-0{,}6B^{12})a_t = (1-0{,}4B-0{,}6B^{12}+0{,}24B^{13})a_t.$$

O produto cria o termo em B^{13} com coeficiente $\theta\Theta$: é o "modelo das companhias aéreas".

b) Parâmetros e observações (0,3)

Três parâmetros: θ, Θ e σ^2. Sem constante, porque $D = 1$. Perdem-se $d + sD = 1 + 12 = 13$ observações, e sobram $180 - 13 = 167$.

c) FAC e FACP (0,6)

w_t é um MA(13) com coeficientes só em 1, 12 e 13, e $\gamma_0 = (1+\theta^2)(1+\Theta^2)\sigma^2$:

Defasagem	Fórmula	Valor
1	$-\theta/(1+\theta^2)$	$-0{,}3448$
11 e 13	$\theta\Theta/[(1+\theta^2)(1+\Theta^2)]$	0,1521
12	$-\Theta/(1+\Theta^2)$	$-0{,}4412$
as demais	—	0

A FACP **decai** nas defasagens baixas, a partir da 1, e em torno de 12 e 24, como em todo MA. O "grupo" 11-12-13 na FAC é a assinatura do produto (lista, Q16c).

d) Comparação (0,3)

Os modelos são **aninhados**: $\phi = 0$ volta ao primeiro. Use o **BIC**, que é consistente, junto com o **teste LR**, $2(\ell_1 - \ell_0) \sim \chi^2(1)$. Confira também se $\hat{\phi}$ e $\hat{\theta}$ não ficaram quase iguais, porque isso indica fator comum. Se o objetivo for prever, complemente com o RMSE fora da amostra (AU03).

Rubrica	Pontos
a)	0,3
b) 3 parâmetros com σ^2 e 13 perdidas	0,3
c) os quatro valores	0,4
c) FACP	0,2
d)	0,3

CAPÍTULO 8

Simulado 02 — gabarito

Enunciado em simulado_02.md. Todos os números saem de prova.R. Cada questão é uma questão-tipo do guia "não posso errar": se um item travou, refaça a questão-tipo do guia com o mesmo número, cobrindo a resolução, e depois refaça o item aqui.

> **Como se corrigir**
>
> Some os pontos **por passo**, pelo que você escreveu, não pelo que sabia. A fórmula geral escrita e aplicada com erro de conta ainda vale o passo da fórmula. Número certo sem fórmula nem justificativa vale metade. Frase de fecho ausente perde o ponto dela, mesmo com a conta certa. Cada passo que faltou vira uma linha no log de erros, com a causa.

Questão 1 (1,0) — questão-tipo 1

Origem na lista: (lista, Q1).

a) Solução e momentos (0,5)

- Somando $y_s - y_{s-1} = 0{,}2 + u_s$ de 1 a t, a soma telescópica dá $y_t = 5 + 0{,}2t + \sum_{s=1}^{t} u_s$.
- $E(y_t) = 5 + 0{,}2t$ *[F4 na soma finita; RB: $E(u_s) = 0$].*
- $\mathrm{Var}(y_t) = E\big((\sum_s u_s)^2\big) = \sum_s E(u_s^2) = 2t$ *[RB: só $i = j$ sobra].*
- $\mathrm{Cov}(y_t, y_{t-k}) = E\big(\sum_{i\le t} u_i \sum_{j\le t-k} u_j\big) = 2(t-k)$ *[os $t-k$ choques comuns].*

Rubrica	Pontos
Soma telescópica até $y_t = y_0 + ct + \sum u_s$	0,1
$E(y_t)$ com o y_0 e a hipótese citada	0,1
Var **com o** E escrito, pela soma dupla	0,15
Cov pelos choques comuns	0,15

b) Os números (0,3)

$E(y_{50}) = 15$; $\mathrm{Var}(y_{50}) = 100$; $\mathrm{Cov}(y_{50}, y_{40}) = 80$; $\mathrm{Corr} = \sqrt{40/50} = 0{,}8944$.

Rubrica	Pontos
Os três momentos	0,15
A correlação $\sqrt{(t-k)/t}$	0,15

c) Estacionariedade (0,2)

Não é estacionário: a variância $2t$ depende de t, e a média $5 + 0{,}2t$ também.

Rubrica	Pontos
Critério das três condições aplicado	0,1
Frase de fecho	0,1

Questão 2 (1,0) — questão-tipo 2

Origem na lista: (lista, Q3).

a) A fórmula (0,4)

$$\gamma_3(k) = \mathrm{Cov}(3z_{1t} + z_{2t},\ 3z_{1,t-k} + z_{2,t-k}) = 9\gamma_1(k) + 3C_{12}(k) + 3C_{21}(k) + \gamma_2(k) = 9\gamma_1(k) + \gamma_2(k),$$

porque z_1 **e** z_2 **não são correlacionados**, o que zera C_{12} e C_{21}. A constante 3 sai ao quadrado.

Rubrica	Pontos
Os quatro produtos da covariância	0,15
Cruzados zerados **citando a hipótese**	0,15
O fator 9, e não 3	0,1

b) Os números (0,3)

$\gamma_3(0) = 9(1{,}0) + 1{,}5 = 10{,}5$; $\gamma_3(1) = 9(0{,}45) + 0{,}6 = 4{,}65$; $\gamma_3(2) = 0 + 0{,}5 = 0{,}5$; $\gamma_3(3) = 0$.
Logo, $\rho_1 = 4{,}65/10{,}5 = 0{,}4429$ e $\rho_2 = 0{,}5/10{,}5 = 0{,}0476$.

Rubrica	Pontos
Os quatro $\gamma_3(k)$	0,2
ρ_1 e ρ_2	0,1

c) Classificação (0,3)

A média é constante e $\gamma_3(k)$ não depende de t: z_3 **é estacionário**. A FAC é diferente de zero até a defasagem 2 e **corta** depois: z_3 **é um MA(2)**. Um AR faria a FAC decair sem zerar.

Rubrica	Pontos
Estacionário, pelo critério	0,1
MA(2), pelo corte da FAC (ARMA(1,2) vale zero)	0,2

Questão 3 (1,0) — questão-tipo 3

Origem na lista: (lista, Q5).

a) Forma em B (0,2)

$\tilde{z}_t = (1 - 0{,}65B + 0{,}1B^2)a_t$: $\phi(B) = 1$ e $\theta(B)$ de grau 2, logo ARMA(0,2), um MA(2). **Todo MA finito é estacionário**, para quaisquer coeficientes.

Rubrica	Pontos
Forma em B e classificação	0,1
Estacionário, com o motivo	0,1

b) Raízes (0,4)

$\theta(x) = 0 \iff 0{,}1x^2 - 0{,}65x + 1 = 0$, com a variável x (um número, não a série):

- $\Delta = 0{,}4225 - 0{,}4 = 0{,}0225$, e $\sqrt{\Delta} = 0{,}15$;
- $x = (0{,}65 \pm 0{,}15)/0{,}2$, ou seja, $x_1 = 4$ e $x_2 = 2{,}5$;
- Vieta confere: soma $6{,}5 = 0{,}65/0{,}1$ e produto $10 = 1/0{,}1$.

As duas raízes estão fora do círculo: **(i) é invertível**.

Rubrica	Pontos
Polinômio na variável x, forma padrão	0,1
Bhaskara: Δ e as duas raízes	0,2
Conclusão: invertível	0,1

c) Fator comum (0,4)

Das raízes 4 e 2,5 vêm os fatores $(1 - 0{,}25B)$ e $(1 - 0{,}4B)$:

$$(1 - 0{,}25B)\tilde{z}_t = (1 - 0{,}25B)(1 - 0{,}4B)\, a_t \;\Rightarrow\; \tilde{z}_t = (1 - 0{,}4B)\, a_t.$$

O fator do AR aparece também no MA e cancela: **(ii) é um MA(1)** com $\theta = 0{,}4$, e não um ARMA(1,2). Os pesos são $\pi_j = -0{,}4^j$: $-0{,}4$; $-0{,}16$; $-0{,}064$.

Rubrica	Pontos
Fatoração pelo inverso das raízes	0,1
Cancelamento e "MA(1)"	0,2
Os três π_j	0,1

Questão 4 (1,5) — questão-tipo 4

Origem na lista: (lista, Q6).

a) Raízes (0,2)

$\phi(x) = 1 - 0{,}5x = 0 \Rightarrow x = 2$; $\theta(x) = 1 - 0{,}2x = 0 \Rightarrow x = 5$. As duas estão fora do círculo: **estacionário e invertível**.

Rubrica	Pontos
As duas raízes e a conclusão	0,2

b) Momentos auxiliares (0,3)

Com o modelo isolado, $z_t = 0{,}5z_{t-1} + a_t - 0{,}2a_{t-1}$, e a causalidade, $E(z_{t-k}a_t) = 0$ para $k \geq 1$:

- multiplicando por a_t: $E(z_t a_t) = 0 + \sigma^2 - 0 = 2$;
- multiplicando por a_{t-1}: $E(z_t a_{t-1}) = 0{,}5E(z_{t-1}a_{t-1}) - 0{,}2\sigma^2 = 0{,}5(2) - 0{,}2(2) = 0{,}6$.

Rubrica	Pontos
$E(z_t a_t) = \sigma^2 = 2$, com a causalidade citada	0,1
$E(z_t a_{t-1}) = (\phi - \theta)\sigma^2 = 0{,}6$	0,2

c) Autocovariâncias (0,5)

- multiplicando por z_t: $\gamma_0 = 0{,}5\gamma_1 + 2 - 0{,}2(0{,}6) = 0{,}5\gamma_1 + 1{,}88$;
- multiplicando por z_{t-1}: $\gamma_1 = 0{,}5\gamma_0 - 0{,}2(2) = 0{,}5\gamma_0 - 0{,}4$;
- substituindo: $\gamma_0 = 0{,}25\gamma_0 - 0{,}2 + 1{,}88$, logo $0{,}75\gamma_0 = 1{,}68$ e $\gamma_0 = 2{,}24$;
- $\gamma_1 = 0{,}5(2{,}24) - 0{,}4 = 0{,}72$ e $\gamma_2 = 0{,}5\gamma_1 = 0{,}36$.

Confere com a fórmula: $\frac{1+0{,}04-0{,}2}{0{,}75} \cdot 2 = 2{,}24$.

Rubrica	Pontos
$\gamma_0 = E(z_t^2)$**, a variância**, e a equação de γ_0	0,15
A equação de γ_1	0,1
Sistema resolvido: γ_0 e γ_1	0,15
γ_2	0,1

d) FAC (0,2)

$\rho_1 = 0{,}72/2{,}24 = 0{,}3214$. Para $k \geq 2$, multiplicando por z_{t-k}, os dois choques do modelo, a_t e a_{t-1}, são posteriores a z_{t-k} e somem: $\gamma_k = 0{,}5\gamma_{k-1}$. Dividindo por γ_0, $\rho_k = 0{,}5\rho_{k-1}$.

Rubrica	Pontos
ρ_1	0,1
O motivo de os choques sumirem para $k \geq 2$	0,1

e) Pesos (0,3)

$\psi_j = (\phi - \theta)\phi^{j-1}$: 0,3; 0,15; 0,075. $\pi_j = (\phi - \theta)\theta^{j-1}$: 0,3; 0,06; 0,012.

Rubrica	Pontos
Os três ψ_j	0,15
Os três π_j	0,15

Questão 5 (1,0) — questão-tipo 5

Origem na lista: (lista, Q7).

a) Raízes (0,2)

$\phi(x) = 1 - 0{,}3x - 0{,}4x^2 = 0 \iff 0{,}4x^2 + 0{,}3x - 1 = 0$. Assim, $\Delta = 0{,}09 + 1{,}6 = 1{,}69$ e $x = (-0{,}3 \pm 1{,}3)/0{,}8$, ou seja, $x = 1{,}25$ e $x = -2$. Os dois módulos são maiores que 1: **estacionário**. Pelo triângulo: $0{,}3 + 0{,}4 < 1$, $0{,}4 - 0{,}3 < 1$ e $|0{,}4| < 1$.

Rubrica	Pontos
Raízes com sinal certo do ϕ_2 e a conclusão	0,2

b) Yule-Walker (0,4)

Multiplicando por y_{t-1} e y_{t-2} e dividindo por γ_0:

$$\rho_1 = \phi_1 + \phi_2\rho_1, \qquad \rho_2 = \phi_1\rho_1 + \phi_2.$$

- $\rho_1 = 0{,}3/0{,}6 = 0{,}5$;
- $\rho_2 = 0{,}3(0{,}5) + 0{,}4 = 0{,}55$;
- $\rho_3 = 0{,}3(0{,}55) + 0{,}4(0{,}5) = 0{,}365$.

Rubrica	Pontos
As duas equações escritas	0,2
ρ_1, ρ_2 e ρ_3	0,2

c) Variância (0,4)

Multiplicando por y_t, o choque sobrevive com $E(\varepsilon_t y_t) = \sigma^2$: $\gamma_0 = \phi_1\gamma_1 + \phi_2\gamma_2 + \sigma^2$. Daí:

$$\gamma_0 = \frac{\sigma^2}{1 - \phi_1\rho_1 - \phi_2\rho_2} = \frac{1}{1 - 0{,}15 - 0{,}22} = \frac{1}{0{,}63} = 1{,}5873.$$

Confere pela fórmula fechada: $\frac{0{,}6}{1{,}4\,(0{,}36 - 0{,}09)} = 1{,}5873$.

Rubrica	Pontos
A equação de γ_0 com o σ^2	0,2
O valor	0,2

Questão 6 (1,0) — questão-tipo 6

Origem na lista: (lista, Q9).

a) A forma ARMA de w_t (0,4)

- Pela definição: $w_t = (0{,}2y_{t-1} + \varepsilon_t) - y_{t-1} = -0{,}8y_{t-1} + \varepsilon_t$.
- Com o operador: $(1 - 0{,}2B)y_t = \varepsilon_t$; multiplicando **os dois lados** por $(1 - B)$, $(1 - B)(1 - 0{,}2B)y_t = (1 - B)\varepsilon_t$, e, como os polinômios comutam, $(1 - 0{,}2B)w_t = (1 - B)\varepsilon_t$.
- A raiz do MA é $1 - x = 0 \Rightarrow x = 1$, **sobre** o círculo: w_t **não é invertível e não tem AR(∞)**.

Rubrica	Pontos
Derivação pelo operador, sem copiar a forma	0,2
Raiz 1 e a conclusão "não invertível, sem AR(∞)"	0,2

b) Os números (0,4)

- $\mathrm{Var}(y_t) = 1/(1 - 0{,}04) = 1{,}0417$;
- $\mathrm{Var}(w_t) = 2\gamma_0(1 - \phi) = 2/(1 + \phi) = 1{,}6667$;
- $\rho_1(w) = -(1 - \phi)/2 = -0{,}4$.

Rubrica	Pontos
As duas variâncias	0,2
$\rho_1(w)$	0,2

c) Consequência (0,2)

Diferenciar **aumentou** a variância, de 1,0417 para 1,6667, e criou $\rho_1 = -0{,}4$, perto do $-0{,}5$ do ruído diferenciado. A série já era estacionária: diferenciar foi um erro (sobrediferenciação), que deixa o MA na fronteira e piora a estimação e a previsão.

Rubrica	Pontos
Frase de fecho: sobrediferenciação	0,2

Questão 7 (1,0) — questão-tipo 7

Origem na lista: item a): (lista, Q14); item b): (lista, Q13).

a) AIC e BIC (0,6)

Modelo	k	$-2\ln L$	AIC	BIC
AR(1)	2	430,0	434,0	**440,02**
AR(2)	3	426,2	**432,2**	441,23
ARMA(1,1)	3	427,2	433,2	442,23
ARMA(2,1)	4	424,8	432,8	444,84

O AIC escolhe o AR(2), e o BIC escolhe o AR(1). Eles discordam porque a multa por parâmetro do BIC, $\ln 150 = 5{,}01$, é maior que a do AIC, 2. O BIC é consistente; o AIC tende a sobreparametrizar.

Rubrica	Pontos
k com o σ^2	0,1
Os quatro AIC	0,2
Os quatro BIC	0,2
As duas escolhas e o motivo	0,1

b) MV condicional (0,4)

$\hat{\phi} = 45/90 = 0{,}5$ e $\hat{\sigma}^2 = (100 - 0{,}5 \cdot 45)/80 = 77{,}5/80 = 0{,}96875$. Condicionando em y_1, maximizar $\ln L$ em ϕ é minimizar a soma de quadrados, isto é, fazer MQO.

Rubrica	Pontos
$\hat{\phi}$ com a fórmula	0,2
$\hat{\sigma}^2$ dividindo por $T - 1 = 80$	0,2

Questão 8 (1,5) — questão-tipo 8

Origem na lista: (lista, Q15).

a) Previsões (0,4)

Escrevendo o modelo em $T + 1$, o choque futuro vira zero: $\hat{y}_T(1) = 50 + 0{,}6(5) = 53$. Em $T + 2$, y_{T+1} vira a sua previsão: $\hat{y}_T(2) = 50 + 0{,}6(3) = 51{,}8$. Em geral, $\hat{y}_T(h) = 50 + 0{,}6^h(55 - 50)$, o que dá $\hat{y}_T(3) = 51{,}08$.

Rubrica	Pontos
As três previsões	0,3
A fórmula geral	0,1

b) Erros (0,3)

$e_T(1) = a_{T+1}$ e $e_T(2) = a_{T+2} + 0{,}6a_{T+1}$. Em geral, $e_T(h) = \sum_{j=0}^{h-1} 0{,}6^j a_{T+h-j}$: são h choques futuros, um MA$(h-1)$.

Rubrica	Pontos
Os dois erros	0,15
A forma MA$(h-1)$ com $\psi_j = 0{,}6^j$	0,15

c) Variâncias (0,3)

$\text{Var}(e_T(h)) = 9\sum_{j<h} 0{,}36^j$: 9; 12,24; 13,4064.

Rubrica	Pontos
A fórmula, com o $\psi_0 = 1$	0,1
Os três valores	0,2

d) Intervalos (0,3)

- $h = 1$: $53 \pm 1{,}96(3) = [47{,}12;\ 58{,}88]$;
- $h = 2$: $\sqrt{12{,}24} = 3{,}4986$, logo $51{,}8 \pm 6{,}8572 = [44{,}94;\ 58{,}66]$.

Rubrica	Pontos
Uso do **desvio-padrão**, não da variância	0,1
Os dois intervalos	0,2

e) Longo prazo (0,2)

$0{,}6^h \to 0$: a previsão volta à média, 50, e a variância do erro tende a $\gamma_0 = 9/(1-0{,}36) = 14{,}0625$.

Rubrica	Pontos
Os dois limites	0,2

Questão 9 (1,0) — questão-tipo 9

Origem na lista: (lista, Q16).

a) O modelo (0,3)

$$(1-B)(1-B^4)\,y_t = (1-0{,}5B)(1-0{,}3B^4)\,a_t, \qquad (1-0{,}5B)(1-0{,}3B^4) = 1-0{,}5B-0{,}3B^4+0{,}15B^5.$$

Assim, $w_t = y_t - y_{t-1} - y_{t-4} + y_{t-5} = a_t - 0{,}5a_{t-1} - 0{,}3a_{t-4} + 0{,}15a_{t-5}$. O termo $+0{,}15B^5$ vem do produto $(-0{,}5)(-0{,}3)$.

Rubrica	Pontos
Os quatro polinômios	0,1
A expansão com o termo cruzado positivo	0,2

b) Contagens (0,2)

São **3 parâmetros**: θ, Θ e σ^2; o 0,15 não conta, porque é imposto. Perdem-se $d + sD = 1 + 4 = 5$ observações: restam **95**.

Rubrica	Pontos
Parâmetros	0,1
Observações efetivas	0,1

c) FAC (0,4)

- $\rho_1 = -0{,}5/1{,}25 = -0{,}4$;
- $\rho_4 = -0{,}3/1{,}09 = -0{,}2752$;
- satélites: $\rho_3 = \rho_5 = \rho_1\rho_4 = 0{,}1101$;
- $\rho_2 = \rho_6 = 0$, porque nenhum par de choques fica àquela distância.

É a assinatura do multiplicativo com $s = 4$: pico em 4 e satélites em 4 ± 1.

Rubrica	Pontos
ρ_1 e ρ_4	0,2
Os satélites	0,1
Os zeros	0,1

d) Critério (0,1)

O rival contém o modelo: com $\phi = 0$, volta ao original. Compara-se pelo **BIC**, ou pelo **LR** com $\chi^2(1)$ e crítico 3,84, com o mesmo T efetivo.

Rubrica	Pontos
BIC ou LR, com o motivo	0,1

Depois de corrigir

1. Some os pontos por questão e compare com o Simulado 01, questão-tipo por questão-tipo.
2. Para cada item com perda, escreva uma linha no log com a causa (H, A, N, L, R, V, E ou T) e atualize a coluna S2 do placar.
3. **Na mesma noite**, refaça no papel a questão-tipo do guia correspondente ao item de maior perda, sem olhar, e confira linha a linha.

CAPÍTULO 9

Simulado 03 — gabarito

Enunciado em simulado_03.md. Números de prova.R. Erros vão para o log.

Questão 1 (1,5)

Origem na lista: (lista, Q2) e (lista, Q10): tendência determinística × estocástica e sobrediferenciação.

a) TS (0,4)

- $E(y_t) = 2 + 0{,}5t + E(u_t) = 2 + 0{,}5t$, porque u é um AR(1) estacionário de média zero. Logo $E(y_{10}) = 7$.
- $\text{Var}(y_t) = \text{Var}(u_t) = \sigma^2/(1 - 0{,}6^2) = 1{,}5625$, **constante**. A média tem tendência; a variância, não.

b) DS (0,3)

$z_t = 0{,}5t + \sum_{j=1}^{t} \varepsilon_j$, logo $E(z_t) = 0{,}5t$ e $\text{Var}(z_t) = t\sigma^2$: $\text{Var}(z_{10}) = 10$. A variância cresce com t.

c) Persistência do choque (0,3)

- Em y: $\partial y_{t+5}/\partial \varepsilon_t = \psi_5 = 0{,}6^5 = 0{,}0778$. O choque é **transitório** e morre geometricamente.
- Em z: $\partial z_{t+5}/\partial \varepsilon_t = 1$, e o mesmo vale para todo horizonte. O choque é **permanente**: é a raiz unitária (D03.1).

d) Diferenciar a TS (0,5)

$\Delta y_t = 0{,}5 + \Delta u_t$. Aplicando $(1 - 0{,}6B)$:

$$(1 - 0{,}6B)(\Delta y_t - 0{,}5) = (1 - B)\varepsilon_t,$$

um ARMA(1,1) com $\theta = 1$, cujo MA tem raiz sobre o círculo: **não invertível**. Pela fórmula da Q9, $\rho_1 = -(1 - \phi)/2 = -0{,}2$.

Como tirar a não estacionariedade:

- y (TS): regredir em 1 e t e modelar o resíduo u_t como AR(1). Diferenciar sobrediferencia.
- z (DS): diferenciar. Tirar a tendência por regressão deixa uma raiz unitária no resíduo, com risco de regressão espúria.

Na prática, quem decide qual é o caso é o ADF com tendência (Mattos; Enders, cap. 4; lista, Q10).

Rubrica	Pontos
a)	0,4
b)	0,3
c) os dois efeitos com a palavra transitório/permanente	0,3
d) forma ARMA e raiz unitária no MA	0,2
d) $\rho_1 = -0{,}2$	0,1
d) regra para cada série	0,2

Questão 2 (2,0)

Origem na lista: (lista, Q8), modelo (I), com o ARMA(1,1) da (lista, Q6).

Convenção: sinal positivo. Os momentos auxiliares, multiplicando o modelo por u_t e por u_{t-1}, são:

- $E(Y_t u_t) = \sigma^2$;
- $E(Y_t u_{t-1}) = \alpha\sigma^2 + \beta\sigma^2 = (\alpha+\beta)\sigma^2$.

Multiplicando por Y_t e por Y_{t-1}:

$$\gamma_0 = \alpha\gamma_1 + \sigma^2 + \beta(\alpha+\beta)\sigma^2, \qquad \gamma_1 = \alpha\gamma_0 + \beta\sigma^2.$$

1. Verdadeira. Substituindo γ_1 na primeira: $\gamma_0(1-\alpha^2) = \sigma^2(1 + \alpha\beta + \alpha\beta + \beta^2)$. Com os números, $\gamma_0 = 1{,}75/0{,}75 = 2{,}3333$.

2. Verdadeira.

$$\gamma_1 = \alpha\gamma_0 + \beta\sigma^2 = \frac{\alpha + 2\alpha^2\beta + \alpha\beta^2 + \beta - \alpha^2\beta}{1-\alpha^2}\sigma^2 = \frac{(1+\alpha\beta)(\alpha+\beta)}{1-\alpha^2}\sigma^2.$$

Com os números, $\gamma_1 = 1{,}25/0{,}75 = 1{,}6667$ e $\rho_1 = 0{,}7143$.

3. Verdadeira. Para $h \geq 2$, $E(u_t Y_{t-h}) = E(u_{t-1}Y_{t-h}) = 0$ *[causalidade]*, então $\gamma_h = \alpha\gamma_{h-1}$ e $\rho_2 = \alpha\rho_1 = 0{,}3571$.

4. Falsa. $\sigma^2/(1-\alpha^2) = 1{,}3333$ é a variância do AR(1) puro. O MA soma $(2\alpha\beta + \beta^2)\sigma^2/(1-\alpha^2)$, e o certo é 2,3333.

5. Falsa. $\pi(B) = \frac{1-\alpha B}{1+\beta B} = (1-\alpha B)\sum_j (-\beta)^j B^j$. Então $\pi_j = (\alpha+\beta)(-\beta)^{j-1}$, com **sinal alternado**: $\pi_1 = 1$, $\pi_2 = -0{,}5$, $\pi_3 = 0{,}25$. A expressão da afirmativa é a da convenção BJ com $\beta \to \theta$.

6. Falsa. A invertibilidade depende só do MA: exige $|\beta| < 1$, isto é, a raiz de $1 + \beta z$ fora do círculo. $|\alpha| < 1$ garante a **estacionariedade**.

Rubrica	Pontos
Momentos auxiliares e o sistema de γ_0, γ_1	0,4
Cada afirmativa julgada **com** a conta que a sustenta (6 × 0,25)	1,5
Conferência numérica	0,1

> **Erro que custa ponto aqui**
>
> "V" ou "F" sem demonstração vale zero. O enunciado manda demonstrar: a conclusão é a última linha, não a única. É a lição da Q5 da P1 de Econometria I, que parou antes de concluir.

Questão 3 (2,0)

Origem na lista: (lista, Q12).

a) Expansão (0,6)

$$(1-0{,}5B)(1-B) = 1-1{,}5B+0{,}5B^2,$$

$$(1-1{,}5B+0{,}5B^2)(1-B^4) = 1-1{,}5B+0{,}5B^2-B^4+1{,}5B^5-0{,}5B^6,$$

$$\boxed{y_t = 1{,}5y_{t-1}-0{,}5y_{t-2}+y_{t-4}-1{,}5y_{t-5}+0{,}5y_{t-6}+a_t-0{,}6a_{t-4}}$$

b) Observações perdidas (0,2)

$d + sD = 1 + 4 = 5$.

c) Previsões (1,0)

Regra: valor conhecido fica; y futuro vira a própria previsão; $E(a_{T+j} \mid \mathcal{F}_T) = 0$ para $j \geq 1$.

h	Conta	$y_{T+h\|T}$
1	$1{,}5(103)-0{,}5(107)+98-1{,}5(104)+0{,}5(100)-0{,}6(1{,}0)$	92,4
2	$1{,}5(92{,}4)-0{,}5(103)+101-1{,}5(98)+0{,}5(104)-0{,}6(-0{,}5)$	93,4
3	$1{,}5(93{,}4)-0{,}5(92{,}4)+107-1{,}5(101)+0{,}5(98)-0{,}6(0{,}8)$	97,92
4	$1{,}5(97{,}92)-0{,}5(93{,}4)+103-1{,}5(107)+0{,}5(101)-0{,}6(0{,}4)$	92,94
5	$1{,}5(92{,}94)-0{,}5(97{,}92)+92{,}4-1{,}5(103)+0{,}5(107)$	81,85

Leitura mais curta de $h = 1$: a previsão é $y_{T-3} + (y_T - y_{T-4}) + 0{,}5[(y_T - y_{T-4}) - (y_{T-1} - y_{T-5})] - 0{,}6\hat{a}_{T-3}$. Ou seja, o mesmo trimestre do ano anterior, mais a variação anual recente, mais a correção AR, menos o choque sazonal.

d) MA e longo prazo (0,2)

O termo $-0{,}6a_{T+h-4}$ usa resíduos observados só até $h = 4$. Em $h = 5$, ele é a_{T+1}, de esperança zero. Daí em diante, as previsões seguem a equação homogênea, cujas raízes são 1 (dupla), -1, $\pm i$ e 2: **tendência linear + padrão sazonal fixo de período 4 + termo $0{,}5^h$ que some** (lista, Q12c).

Rubrica	Pontos
a)	0,6
b)	0,2
c) regra da esperança condicional escrita	0,2
c) cinco previsões (0,16 cada)	0,8
d)	0,2

> **Ganhe tempo**
>
> Escreva a equação do item a) uma vez e, para cada h, só substitua. Errar $h = 1$ contamina os outros, mas a rubrica dá o ponto do método em cada linha.

Questão 4 (1,5)

Origem na lista: (lista, Q16), item (d), e (lista, Q14).

a) Parâmetros e observações (0,3)

- M1: ϕ, θ, Θ e σ^2, isto é, $k = 4$.
- M2: ϕ_1, ϕ_2, θ, Θ e σ^2, isto é, $k = 5$.
- Observações efetivas: $240 - (1 + 12) = 227$.

b) Critérios (0,6)

Modelo	AIC $= -2 \ln L + 2k$	BIC $= -2 \ln L + k \ln 227$
M1	**833,2**	**846,900**
M2	833,8	850,925

Os dois escolhem M1.

c) LR (0,4)

- H_0: $\phi_2 = 0$ (M1).
- $LR = 2(-411{,}9 + 412{,}6) = 1{,}4 \sim \chi^2(1)$.
- $1{,}4 < 3{,}84$, com $p = 0{,}237$: não se rejeita H_0.
- **Conclusão:** fica M1.

d) Recomendação (0,2)

O **BIC**, porque é consistente. Como os modelos são aninhados, o LR é a confirmação formal. Se o objetivo for prever, o AIC e o erro fora da amostra são os árbitros (lista, Q16d).

Rubrica	Pontos
a)	0,3
b)	0,6
c)	0,4
d)	0,2

Questão 5 (1,5)

Origem na lista: (lista, Q15), item (c), no caso MA(q).

a) Previsões (0,5)

Convenção: BJ, com $\theta(B) = 1 - \theta_1 B - \theta_2 B^2$, $\theta_1 = 0{,}5$ e $\theta_2 = -0{,}2$. É um MA(2), sempre estacionário. É invertível? As raízes de $1 - 0{,}5z + 0{,}2z^2$ são complexas, com módulo $\sqrt{1/0{,}2} = 2{,}2361 > 1$: sim.

- $y_{T+1|T} = 3 - 0{,}5(1) + 0{,}2(-2) = 2{,}1$.
- $y_{T+2|T} = 3 + 0{,}2(1) = 3{,}2$.
- $y_{T+3|T} = 3$.

b) Variâncias e intervalo (0,5)

$\psi_0 = 1$, $\psi_1 = -0{,}5$, $\psi_2 = 0{,}2$, e então:

- $\text{Var}(e_T(1)) = 1$;
- $\text{Var}(e_T(2)) = 1 + 0{,}25 = 1{,}25$;
- $\text{Var}(e_T(3)) = 1{,}25 + 0{,}04 = 1{,}29 = \gamma_0/\sigma^2$.

IC de 95% para $h = 3$: $3 \pm 1{,}96\sqrt{1{,}29} = 3 \pm 2{,}2261$.

c) A memória finita (0,5)

$y_{T+h} = \mu + a_{T+h} - \theta_1 a_{T+h-1} - \theta_2 a_{T+h-2}$. Para $h > 2$, todos os choques são **futuros**, com esperança condicional zero. Logo:

- $y_{T+h|T} = \mu$;
- $e_T(h) = y_{T+h} - \mu$, cuja variância é $\text{Var}(y_t) = \gamma_0$.

Conclusão: um MA(q) só "lembra" q períodos. Além disso, a melhor previsão é a média incondicional, e o intervalo tem a largura da distribuição marginal.

Rubrica	Pontos
a) convenção e três previsões	0,5
b) variâncias com $\psi_0 = 1$ e intervalo	0,5
c) argumento e conclusão	0,5

Questão 6 (1,5)

Origem na lista: (lista, Q16), item (c), lido ao contrário: da FAC amostral para o modelo.

a) Banda (0,3)

Com 227 observações efetivas, a banda é $\pm 2/\sqrt{227} = \pm 0{,}1327$ (com 1,96, $\pm 0{,}1301$).

- **FAC** significativa nas defasagens 1, 11, 12 e 13.
- **FACP** significativa nas defasagens 1, 2, 12, 13 e 24, decaindo.

b) O modelo (0,6)

FAC cortando em 1 e em 12, com os "satélites" 11 e 13, e FACP decaindo: **SARIMA**$(0,1,1)(0,1,1)_{12}$, o modelo das companhias aéreas. Com $\theta = \Theta = 0{,}5$:

- $\rho_1 = -\theta/(1+\theta^2) = -0{,}4$;
- $\rho_{12} = -0{,}4$;
- $\rho_{11} = \rho_{13} = \theta\Theta/[(1+\theta^2)(1+\Theta^2)] = 0{,}16$;
- zero nas demais.

Os valores amostrais $-0{,}41$, $-0{,}39$, 0,17 e 0,15 batem.

c) Ljung-Box (0,4)

- $\nu = 24 - 0 - 1 - 0 - 1 = 22$.
- $Q = 30{,}1 < 33{,}92$, com $p = 0{,}116$: não se rejeita H_0 de ausência de autocorrelação.
- **Conclusão:** os resíduos se comportam como ruído branco até a defasagem 24.

d) Pico em 12 nos resíduos (0,2)

A parte **sazonal** está mal especificada: falta um termo em B^{12}, ou o Θ estimado está errado. Se $\widehat{\Theta} \approx 1$, há **sobrediferenciação sazonal**: a sazonalidade é determinística, e o melhor é usar dummies mensais com $D = 0$ (módulo 03, Q12d).

Rubrica	Pontos
a)	0,3
b) modelo	0,2
b) quatro valores teóricos e comparação	0,4
c)	0,4
d)	0,2

CAPÍTULO 10

Simulado 04 — gabarito

Enunciado em simulado_04.md. Números de prova.R. Erros vão para o log.

Questão 1 (1,5)

Origem na lista: (lista, Q4): o componente determinístico de Wold no item b) e a invertibilidade como escolha entre θ e $1/\theta$ no item c).

a) O processo harmônico é estacionário (0,4)

- $E(z_t) = \cos(\omega t)E(A) + \sin(\omega t)E(B) = 0$, para todo t.
- Como $\text{Cov}(A, B) = 0$ e $\text{Var}(A) = \text{Var}(B) = \sigma^2$:

$$\text{Cov}(z_t, z_{t-k}) = \sigma^2\big[\cos(\omega t)\cos(\omega(t-k)) + \sin(\omega t)\sin(\omega(t-k))\big] = \sigma^2\cos(\omega k),$$

pela identidade $\cos(x - y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$.

Conclusão: média constante e autocovariância que só depende de k: **estacionário de segunda ordem**. A variância é σ^2, finita.

b) Covariâncias e o componente determinístico (0,4)

Com $\omega = \pi/2$: $\text{Cov}(z_t, z_{t-1}) = \cos(\pi/2) = 0$ e $\text{Cov}(z_t, z_{t-2}) = \cos(\pi) = -1$. Uma simulação com 20 mil pares (A, B) dá $-0{,}9996$ para $z_7 z_5$, sem depender de t.

Por que é determinístico: duas observações bastam para resolver A e B e, daí em diante, **todo o futuro é previsto sem erro**. Não há choque novo: o erro de previsão um passo à frente é zero. No Teorema de Wold, $y_t = \sum_j \psi_j \varepsilon_{t-j} + V_t$, esse é o termo V_t, previsível linearmente a partir do passado remoto e não correlacionado com os ε. Um processo "puramente não determinístico" é aquele em que $V_t = 0$ (lista, Q4a; Hamilton, cap. 4).

c) Duas representações para a mesma FAC (0,7)

Convenção: sinal positivo, $\theta(L) = 1 + \theta L$.

- $x_t = a_t + 0{,}5a_{t-1}$, $\sigma^2 = 2$: $\gamma_0 = (1 + 0{,}25)\cdot 2 = 2{,}5$, $\gamma_1 = 0{,}5 \cdot 2 = 1$, $\rho_1 = 0{,}4$.
- $x_t^* = e_t + 2e_{t-1}$, $\sigma^2 = 0{,}5$: $\gamma_0 = (1 + 4)\cdot 0{,}5 = 2{,}5$, $\gamma_1 = 2 \cdot 0{,}5 = 1$.

Em geral, θ e $1/\theta$ dão o mesmo $\rho_1 = \theta/(1 + \theta^2)$. A raiz de $1 + 0{,}5z$ é $z = -2$, com módulo 2, fora do círculo. A de $1 + 2z$ tem módulo 0,5, dentro.

Escolha: o invertível, x_t. Só ele tem uma representação AR(∞) convergente, $a_t = \sum_j (-0{,}5)^j x_{t-j}$. Isso permite recuperar os choques a partir dos dados, o que é necessário para a verossimilhança e para a previsão. Fixar a invertibilidade é o que torna o MA **identificado** (lista, Q4c).

Rubrica	Pontos
a) média e Cov $= \sigma^2\cos(\omega k)$ com a identidade citada	0,3
a) conclusão	0,1

Rubrica	Pontos
b) os dois valores	0,1
b) previsível sem erro $\Rightarrow$ termo V_t de Wold	0,3
c) convenção declarada e as duas FAC	0,4
c) raízes, escolha do invertível e o porquê	0,3

Questão 2 (2,0)

Origem na lista: (lista, Q7), com a FACP e os pesos ψ do cap. 2.

a) Estacionariedade (0,4)

- Triângulo: $\phi_1 + \phi_2 = 0{,}8 < 1$; $\phi_2 - \phi_1 = -0{,}2 < 1$; $|\phi_2| = 0{,}3 < 1$. As três valem.
- Raízes de $1 - 0{,}5z - 0{,}3z^2 = 0$: $z = 1{,}1736$ e $z = -2{,}8403$, ambas fora do círculo unitário.

Conclusão: estacionário. Como as raízes são reais, não há ciclo: a FAC decai sem a forma de senoide amortecida.

b) Yule-Walker (0,5)

Multiplicando o modelo por y_{t-k}, $k \geq 1$, e dividindo por γ_0: $\rho_k = \phi_1\rho_{k-1} + \phi_2\rho_{k-2}$.

- $k = 1$: $\rho_1 = \phi_1 + \phi_2\rho_1 \Rightarrow \rho_1 = \frac{\phi_1}{1-\phi_2} = \frac{0{,}5}{0{,}7} = 0{,}7143$.
- $k = 2$: $\rho_2 = \phi_1\rho_1 + \phi_2 = 0{,}6571$.
- $k = 3$: $\rho_3 = \phi_1\rho_2 + \phi_2\rho_1 = 0{,}5429$.

c) Variância (0,4)

Multiplicando por y_t: $\gamma_0 = \phi_1\gamma_1 + \phi_2\gamma_2 + \sigma^2$, logo

$$\gamma_0 = \frac{\sigma^2}{1 - \phi_1\rho_1 - \phi_2\rho_2} = \frac{(1-\phi_2)\sigma^2}{(1+\phi_2)\left[(1-\phi_2)^2 - \phi_1^2\right]} = \frac{0{,}7}{1{,}3 \cdot 0{,}24} = 2{,}2436.$$

d) FACP (0,3)

$\phi_{11} = \rho_1 = 0{,}7143$; $\phi_{22} = \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1-\rho_1^2} = 0{,}3 = \phi_2$; $\phi_{33} = 0$. **A FACP de um AR(2) corta depois da defasagem 2**, e o último coeficiente não nulo é o próprio ϕ_2.

e) Pesos ψ (0,4)

$\psi_j = \phi_1\psi_{j-1} + \phi_2\psi_{j-2}$, com $\psi_0 = 1$ e $\psi_{-1} = 0$: $\psi_1 = 0{,}5$, $\psi_2 = 0{,}25 + 0{,}3 = 0{,}55$, $\psi_3 = 0{,}275 + 0{,}15 = 0{,}425$.

Rubrica	Pontos
a) desigualdades e raízes, com a conclusão	0,4
b) equação geral de YW	0,2
b) três valores	0,3
c) γ_0 com a fórmula escrita	0,4

Rubrica	Pontos
d)	0,3
e) recursão com $\psi_0 = 1$ e os três valores	0,4

Erro que custa ponto aqui

Escrever $\rho_2 = \phi_2$ ou $\phi_{22} = \rho_2$. Quem é igual a ϕ_2 é a **FACP** em 2, não a FAC.

Questão 3 (2,0)

Origem na lista: itens a) e b): (lista, Q11); itens c) e d): (lista, Q10).

a) SAR$(1)_4$ (0,7)

O modelo é um AR(1) em "anos": y_t só se liga a y_{t-4}, y_{t-8}, e assim por diante.

- $\gamma_0 = \sigma^2/(1-\Phi^2) = 1/0{,}64 = 1{,}5625$.
- $\rho_{4m} = \Phi^m$: $\rho_4 = 0{,}6$ e $\rho_8 = 0{,}36$.
- $\rho_k = 0$ fora dos múltiplos de 4, em particular $\rho_1 = \rho_3 = 0$. Multiplicando por y_{t-1}: $\gamma_1 = \Phi\gamma_3$ e $\gamma_3 = \Phi\gamma_1$, logo $\gamma_1(1-\Phi^2) = 0$.

A **FACP** tem um único pico, $\phi_{44} = 0{,}6$, e é zero no resto. É o AR(1) "esticado" de 1 para 4 (lista, Q11).

b) O AR(5) restrito (0,6)

$$(1-0{,}5B)(1-0{,}6B^4) = 1 - 0{,}5B - 0{,}6B^4 + 0{,}3B^5 \implies y_t = 0{,}5y_{t-1} + 0{,}6y_{t-4} - 0{,}3y_{t-5} + \varepsilon_t.$$

É um AR(5) com **três restrições**: $\phi_2 = \phi_3 = 0$ e $\phi_5 = -\phi_1\phi_4$, isto é, $-0{,}3 = -(0{,}5)(0{,}6)$. O AR(5) livre teria 5 coeficientes; o multiplicativo tem 2.

c) ARIMA(1,1,1) (0,4)

$(1-0{,}4B)(1-B) = 1 - 1{,}4B + 0{,}4B^2$, então

$$\boxed{y_t = 1{,}4y_{t-1} - 0{,}4y_{t-2} + a_t - 0{,}7a_{t-1}}$$

Os coeficientes AR somam 1: é a raiz unitária aparecendo na equação em nível.

d) A diferença é ARMA(1,1) (0,3)

$(1-0{,}4B)(1-B)y_t = (1-0{,}4B)w_t = (1-0{,}7B)a_t$. A raiz AR é 2,5 e a raiz MA é 1,4286, ambas fora do círculo: **estacionário e invertível**. O ARIMA(p,1,q) é, por definição, um ARMA(p,q) na diferença (lista, Q10a).

Rubrica	Pontos
a) γ_0, ρ_4, ρ_8	0,3
a) zeros fora dos múltiplos, com a justificativa	0,2
a) FACP	0,2
b) produto e equação	0,3
b) as três restrições	0,3

Rubrica	Pontos
c)	0,4
d)	0,3

Questão 4 (1,5)

Origem na lista: itens a) e b): (lista, Q14); item c): (lista, Q13).

a) Critérios (0,8)

$AIC = \frac{-2\ln L + 2k}{T}$ e $BIC = \frac{-2\ln L + k\ln T}{T}$ (AU02), com k incluindo σ^2.

Modelo	k	AIC (R)	BIC (R)	AIC/T	BIC/T
ARMA(1,1)	3	346,8	355,162	**2,890**	**2,960**
AR(2)	3	349,8	358,162	2,915	2,985
ARMA(2,1)	4	347,6	358,750	2,897	2,990

Os dois critérios escolhem o ARMA(1,1). Dividir por T não muda a ordenação; só muda a escala.

b) Razão de verossimilhança (0,4)

- H_0: ARMA(1,1), isto é, $\phi_2 = 0$; H_1: ARMA(2,1).
- $LR = 2(\ell_1 - \ell_0) = 2(-169{,}8 + 170{,}4) = 1{,}2 \sim \chi^2(1)$ sob H_0.
- $1{,}2 < 3{,}84$, com $p = 0{,}273$: **não se rejeita** H_0.
- **Conclusão:** o segundo coeficiente AR não melhora o ajuste o bastante, e fica o ARMA(1,1), em linha com o BIC.

c) Exata × condicional (0,3)

A exata acrescenta a densidade de $y_1 \sim N\big(0, \sigma^2/(1-\phi^2)\big)$:

$$\ell_{ex} = \ell_{cond} - \tfrac{1}{2}\ln(2\pi) - \tfrac{1}{2}\ln\frac{\sigma^2}{1-\phi^2} - \frac{(1-\phi^2)y_1^2}{2\sigma^2}.$$

Esse termo não é quadrático em ϕ, então a exata não tem forma fechada. Mas é **uma** parcela contra $T-1$: os dois estimadores são assintoticamente equivalentes (Hamilton, cap. 5).

Rubrica	Pontos
a) fórmulas da AU02 com k correto	0,2
a) números e escolha	0,6
b) quatro linhas do teste	0,4
c)	0,3

Questão 5 (1,5)

Origem na lista: (lista, Q15): item a) é o item (b)–(d) e item b) é o item (e).

a) ARMA(1,1) com sinal positivo (1,0)

Convenção: sinal positivo, $\theta = 0{,}4$ entra **somando**.

- $z_{T+1|T} = 0{,}5 z_T + 0{,}4\hat{a}_T = 1 + 0{,}4 = 1{,}4$.
- $z_{T+2|T} = 0{,}5 \cdot 1{,}4 = 0{,}7$ e $z_{T+3|T} = 0{,}35$: depois do primeiro passo, o MA some e a previsão decai como ϕ^{h-1}.
- $\psi_1 = \phi + \theta = 0{,}9$ e $\psi_2 = \phi\psi_1 = 0{,}45$. Na convenção BJ, seria $\phi - \theta$.
- $\mathrm{Var}(e_T(h)) = \sigma^2 \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2$: 1; 1,81; 2,0125.
- IC de 95% para $h = 2$: $0{,}7 \pm 1{,}96\sqrt{1{,}81} = 0{,}7 \pm 2{,}6369$, isto é, $[-1{,}9369;\ 3{,}3369]$.

b) ARIMA(0,1,1) e suavização exponencial (0,5)

Convenção: BJ, $\theta = 0{,}7$.

- $y_{T+1|T} = y_T - \theta\hat{a}_T = 50 - 1{,}4 = 48{,}6$.
- Para $h \geq 2$: $y_{T+h|T} = y_{T+h-1|T}$. **A previsão é 48,6 para todo** h.

Como $\hat{a}_T = y_T - y_{T|T-1}$:

$$y_{T+1|T} = (1-\theta)y_T + \theta\, y_{T|T-1} = \alpha y_T + (1-\alpha) y_{T|T-1}, \qquad \alpha = 1 - \theta = 0{,}3.$$

Iterando, os pesos das observações passadas são $\alpha(1-\alpha)^j$: 0,3; 0,21; e assim por diante. É a suavização exponencial simples (lista, Q15e).

Rubrica	Pontos
a) convenção declarada e três previsões	0,3
a) ψ_1, ψ_2 e variâncias	0,4
a) intervalo	0,3
b) previsão constante	0,2
b) forma de SES e $\alpha = 1 - \theta$	0,3

A troca de convenção é a armadilha da prova

Em 5a, $\psi_1 = \phi + \theta$; em 5b, a previsão leva $-\theta\hat{a}_T$. Quem resolve tudo na mesma convenção perde os dois itens. A lista faz isso de propósito na Q8.

Questão 6 (1,5)

Origem na lista: itens a) e b): (lista, Q16); itens c) e d): (lista, Q12), a previsão e o diagnóstico.

a) Modelo (0,4)

$$(1-\phi B)(1-B^{12})y_t = (1-\Theta B^{12})a_t \implies y_t = \phi y_{t-1} + y_{t-12} - \phi y_{t-13} + a_t - \Theta a_{t-12}.$$

b) Parâmetros e observações (0,2)

São ϕ, Θ e σ^2: 3 parâmetros. Perdem-se $sD = 12$ observações; sobram 132.

c) Previsões (0,4)

$$y_{T+1|T} = \phi y_T + y_{T-11} - \phi y_{T-12} - \Theta \hat{a}_{T-11},$$
$$y_{T+13|T} = \phi\, y_{T+12|T} + y_{T+1|T} - \phi y_T.$$

O termo MA usa resíduos até $\hat{a}_T$, o que vale para $h \leq 12$. Em $h = 13$, ele já envolve a_{T+1}, cuja esperança é zero. O padrão sazonal de cada mês é carregado pelo y_{T+h-12}, ou pela sua previsão.

d) Ljung-Box (0,5)

- H_0: $\rho_1 = \cdots = \rho_{24} = 0$ nos erros; H_1: alguma autocorrelação.
- $Q = T(T+2)\sum_{k=1}^{24} \hat{r}_k^2/(T-k) = 28{,}5 \sim \chi^2(\nu)$, com $\nu = K - p - q - P - Q = 24 - 1 - 0 - 0 - 1 = 22$.
- $28{,}5 < 33{,}92$, com $p = 0{,}160$: não se rejeita H_0.
- **Conclusão:** os resíduos não mostram autocorrelação até a defasagem 24, e o modelo capturou a dinâmica.

Rubrica	Pontos
a)	0,4
b)	0,2
c)	0,4
d) $\nu = 22$ descontando os parâmetros	0,2
d) decisão e conclusão	0,3

CAPÍTULO 11

Log de erros

Toda questão errada, incompleta ou resolvida acima do tempo-alvo entra aqui **no mesmo dia**, venha ela de um simulado, do banco ou da lista. A revisão segue o espaçamento +1, +3 e +7 dias: refaça a questão do zero, sem olhar a resolução, e anote a data em que acertou.

Como preencher

Uma linha por erro, não por questão: se uma derivação teve dois erros (esqueceu a hipótese e trocou o sinal), são duas linhas. A coluna "ação" diz o que muda no próximo treino. "Estudar mais" não vale.

Códigos

Os mesmos do log de Econometria I, para comparar as duas disciplinas.

Coluna	Valores
tipo (T)	**D** derivação · **C** cálculo · **T** conceitual · **V/F** julgamento
causa (C)	**H** hipótese não citada · **A** álgebra ou sinal · **N** notação ou convenção do MA · **L** leitura do enunciado (s, T, convenção) · **R** regra de decisão invertida · **V** conclusão sem interpretação · **E** esquecimento do resultado · **T** tempo
revisão	data da revisão; `ok` quando acertou sem consulta; `x` quando errou de novo (volta para +1)

Herança da P1 de Econometria I (09/10/2026)

Os seis erros da P1 de Econometria I, com a ação traduzida para séries temporais. Eles **não** se refazem como questões de Econometria I: a coluna "treino aqui" diz qual item desta prova exercita o mesmo músculo.

questão (Econ. I)	erro	C	treino aqui	ação
P1, Q1	$\mathbf{X}'\mathbf{X}$, inversa e $\hat{\beta}$ em branco	T	S1 Q4b; banco Q14	fazer os itens de conta antes das demonstrações; cronometrar 5 min
P1, Q2d	efeito marginal sem o termo $2\beta_3 EXP$	A	S1 Q1c ($4\gamma_x$); S4 Q5a ($\psi_1 = \phi + \theta$)	escrever a fórmula geral e a convenção antes dos números
P1, Q3c	rejeitou H_0 sem calcular F	E	S4 Q4b (LR); S4 Q6d (Ljung-Box)	teste em quatro linhas, com a estatística calculada
P1, Q4a	plim em branco	E	S1 Q2b (momentos auxiliares do ARMA)	refazer D02.2 de cabeça até sair em 8 min
P1, Q5	Gauss-Markov sem a conclusão "semidefinida positiva"	E	S1 Q3a (raiz $\Rightarrow$ não invertível $\Rightarrow$ sem AR(∞)); S1 Q5a	reler o verbo e fechar com a frase pedida
P1, Q6	FWL incompleto	E	S3 Q3 (previsão em cadeia)	escrever a equação expandida uma vez e só substituir

Registro

data	questão	T/C	erro	ação	revisões (+1 · +3 · +7)
01/11	S1 Q1c	T/E	classificou como ARMA(1,2) uma FAC que corta em 2	FAC que corta em $q \Rightarrow$ MA(q); AR nunca zera a FAC	03/11 · 04/11
01/11	S1 Q1a, b	T/V	sem a frase de fecho (não estacionário; FAC que decai devagar)	fechar todo item com a frase do verbo	03/11 · 04/11
01/11	S1 Q1a	D/N	Var $= (y_t - \mu)^2$ sem o E	escrever $E(\cdot)$ em toda linha de momento	03/11 · 04/11
01/11	S1 Q2b	D/N	$\gamma_0 = \mathrm{Cov}(z_t, z_{t-1})$: definição trocada, e travou	$\gamma_0 = E(z_t^2)$, $\gamma_1 = E(z_t z_{t-1})$; roteiro de quatro movimentos	03/11 · 04/11
01/11	S1 Q2a, Q3a	C/N	raiz do polinômio escrita com a série ($\phi(z_t)$)	variável do polinômio é um número: $\phi(x) = 0$	03/11 · 04/11
01/11	S1 Q3a	D/A	$y_t - y_{t-1} = \varepsilon_t$ (do passeio) e forma copiada do enunciado	derivar: multiplicar $(1 - 0{,}5B)y_t = \varepsilon_t$ por $(1 - B)$	03/11 · 04/11
01/11	S1 Q4a	C/R	modelo escolhido pelo $\ln L$, sem AIC nem BIC	AIC e BIC com k incluindo σ^2; menor vence	03/11 · 04/11
01/11	S1 Q4b, Q5, Q6	C/T	contas curtas em branco (cerca de 3 pontos)	25 minutos de contas curtas antes das derivações	03/11 · 04/11

Placar por causa

Atualize depois de cada simulado. A causa com mais linhas vira o foco do treino seguinte.

causa	S1 (01/11)	S2 (03/11)	S3 (04/11)
H hipótese	0		
A álgebra ou sinal	1		
N notação ou convenção	3		
L leitura	0		
R regra de decisão	1		
V conclusão	1		
E esquecimento	1		
T tempo	1		

Parte V

Formulário

CAPÍTULO 12

Formulário

O MA está na convenção **Box-Jenkins**, $\theta(B) = 1 - \theta_1 B - \cdots$, salvo indicação. Para a convenção de sinal positivo dos slides, troque $\theta \to -\theta$. Ver CONVENCOES §2.

Processos de referência

Processo	$E(y_t)$	$\mathrm{Var}(y_t)$	$\mathrm{Cov}(y_t, y_{t-k})$
RB$(0, \sigma^2)$	0	σ^2	0
Passeio aleatório, y_0 fixo	y_0	$t\sigma^2$	$(t-k)\sigma^2$
Passeio com drift c	$y_0 + ct$	$t\sigma^2$	$(t-k)\sigma^2$
Drift e tendência δt	$y_0 + ct + \delta t(t+1)/2$	$t\sigma^2$	$(t-k)\sigma^2$
Processo linear $\sum \psi_j \varepsilon_{t-j}$	μ	$\sigma^2 \sum \psi_j^2$	$\sigma^2 \sum_j \psi_j \psi_{j+k}$

AR, MA e ARMA

Modelo	γ_0	FAC	FACP
AR(1)	$\sigma^2/(1-\phi^2)$	$\rho_k = \phi^k$	$\phi_{11} = \phi$; zero depois
AR(2)	$\dfrac{(1-\phi_2)\sigma^2}{(1+\phi_2)[(1-\phi_2)^2 - \phi_1^2]}$	$\rho_1 = \frac{\phi_1}{1-\phi_2}$, $\rho_2 = \phi_1\rho_1 + \phi_2$	corta após 2
MA(1)	$(1+\theta^2)\sigma^2$	$\rho_1 = -\theta/(1+\theta^2)$; zero depois	decai
MA(q), sinal positivo	$\sigma^2 \sum_{j=0}^{q} \theta_j^2$	$\gamma_k = \sigma^2 \sum_{j=0}^{q-k} \theta_j \theta_{j+k}$; corta em q	decai
ARMA(1,1)	$\frac{1+\theta^2-2\phi\theta}{1-\phi^2}\sigma^2$	$\rho_1 = \frac{(1-\phi\theta)(\phi-\theta)}{1+\theta^2-2\phi\theta}$, $\rho_k = \phi^{k-1}\rho_1$	decai

- **Pesos do ARMA(1,1):** $\psi_j = (\phi - \theta)\phi^{j-1}$ e $\pi_j = (\phi - \theta)\theta^{j-1}$.
- **Yule-Walker:** $\rho_k = \sum_i \phi_i \rho_{k-i}$ para $k \geq 1$, e $\gamma_0 = \sigma^2/(1 - \sum_i \phi_i \rho_i)$.
- **FACP:** $\phi_{11} = \rho_1$ e $\phi_{22} = (\rho_2 - \rho_1^2)/(1 - \rho_1^2)$.
- **Estacionariedade e invertibilidade:** as raízes de $\phi(z)$ e de $\theta(z)$ devem ficar fora do círculo unitário.
- **AR(2):** $\phi_1 + \phi_2 < 1$, $\phi_2 - \phi_1 < 1$ e $|\phi_2| < 1$.
- **MA(1):** $|\rho_1| \leq \frac{1}{2}$.
- **Média e constante:** $c = (1 - \sum \phi_i)\mu$.
- **Equação de diferenças (D02.4):** $y_{t+1} + a y_t = c$ dá $y_t = (y_0 - \frac{c}{1+a})(-a)^t + \frac{c}{1+a}$, estável se $|a| < 1$. No AR(2), raízes características complexas dão um ciclo de período $2\pi/\omega$, com $\cos\omega = \phi_1/(2\sqrt{-\phi_2})$.
- **Banda da FAC (D02.5):** $\pm 1{,}96/\sqrt{T}$ vale para ruído branco. Num MA(q) e $k > q$, use $\mathrm{Var}(\hat{\rho}_k) \approx (1 + 2\sum_{j \leq q} \rho_j^2)/T$.

Integração e sazonalidade

- **Sobrediferenciação:** se $\phi(B)y_t = \theta(B)\varepsilon_t$, então $\phi(B)\Delta y_t = (1-B)\theta(B)\varepsilon_t$, e o MA fica não invertível. Se y é RB, $\rho_1(\Delta y) = -1/2$.
- **TS diferenciada:** $y_t = \alpha + \beta t + u_t$ dá $\Delta y_t = \beta + u_t - u_{t-1}$.
- **SAR(1)$_s$:** $\gamma_{ms} = \Phi^m\sigma^2/(1-\Phi^2)$ e zero fora dos múltiplos de s. A FACP tem um pico, em s.
- **Multiplicativo:** $(1-\phi B)(1-\Phi B^s) = 1 - \phi B - \Phi B^s + \phi\Phi B^{s+1}$.
- **Observações perdidas** com $(1-B)^d(1-B^s)^D$: $d + sD$.

Raiz unitária

- **ADF:** $\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum \delta_i \Delta y_{t-i} + e_t$, com $H_0 : \gamma = 0$.
- **Críticos assintóticos de 5%:** −1,95 sem determinísticos, −2,86 com constante e −3,41 com constante e tendência.
- **KPSS:** H_0 é estacionariedade.
- **Poder (D03.3):** com $\phi = 0{,}95$ e $T = 100$, o DF rejeita só uma vez em oito. Não rejeitar não é aceitar a raiz unitária: cruze com o KPSS.
- **Quebra de nível (D03.4):** ignorada, ela empurra o ADF para "raiz unitária". Com a data conhecida, ponha a dummy na regressão e use o crítico próprio.

Estimação e seleção

- **AR(1), MV condicional:** $\hat\phi = \sum y_t y_{t-1} / \sum y_{t-1}^2$, que é o MQO. Assintoticamente, $\mathrm{Var}(\hat\phi) \approx (1-\phi^2)/T$.
- **Critérios no R:** $AIC = -2\ln L + 2k$ e $BIC = -2\ln L + k\ln T$.
- **Critérios na AU02:** os mesmos divididos por T.
- **Contagem de k:** ARMA(p,q) com média tem $k = p+q+1$, mais σ^2 se a questão contar a variância.

Diagnóstico (AU03)

Teste	H_0	Estatística	Distribuição
Ljung-Box	$\rho_1 = \cdots = \rho_K = 0$	$T(T+2)\sum_{i=1}^{K} \hat\rho_i^2/(T-i)$	χ^2_{K-p-q} (resíduos)
Jarque-Bera	$S = 0$ e $K = 3$	$\frac{T}{6}\hat S^2 + \frac{T}{24}(\widehat K - 3)^2$	χ^2_2
ARCH-LM	$\alpha_1 = \cdots = \alpha_p = 0$	nR^2 de $\hat\varepsilon_t^2$ em p defasagens	χ^2_p
Breusch-Godfrey	sem autocorrelação até m	nR^2 da auxiliar	χ^2_m
Chow (data a priori)	coeficientes iguais	F	$F(k, T-2k)$
Diebold-Mariano	$E(d_t) = 0$	$\bar d/\sqrt{\hat V(\bar d)}$	$N(0,1)$

Previsão

- **Previsor ótimo:** $y_{T+h|T} = E(y_{T+h} \mid \mathcal{F}_T)$.
- **Erro e sua variância:** $e_T(h) = \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j a_{T+h-j}$ e $\mathrm{Var} = \sigma^2 \sum_{j<h} \psi_j^2 \to \gamma_0$.
- **ARMA(1,1):** $y_{T+1|T} = \phi y_T - \theta a_T$ e $y_{T+h|T} = \phi^{h-1} y_{T+1|T}$.
- **ARIMA(0,1,1) = SES:** $y_{T+1|T} = (1-\theta)y_T + \theta y_{T|T-1}$, com $\alpha = 1-\theta$.

- **MASE:** $\frac{1}{n}\sum|e_t|/Q$, com $Q = \frac{1}{T_{tr}-m}\sum|y_t - y_{t-m}|$.
- **Winkler:** $W = (u-\ell) + \frac{2}{\alpha}(\ell - y)\mathbf{1}\{y < \ell\} + \frac{2}{\alpha}(y-u)\mathbf{1}\{y > u\}$.
- **CRPS da normal (D05.2):** $\sigma\left[z(2\Phi(z)-1) + 2\varphi(z) - 1/\sqrt{\pi}\right]$, com $z = (y-\mu)/\sigma$; com $\sigma \to 0$, vira $|y-\mu|$.
- **Christoffersen:** $\mathrm{LR}_{cc} = \mathrm{LR}_{uc} + \mathrm{LR}_{ind} \sim \chi^2_2$. A taxa de violações certa não basta: elas também têm de ser independentes.

Regressão dinâmica (AU06)

- **Exogeneidade:** contemporânea, $E(\varepsilon_t \mid x_t) = 0$; predeterminação, $E(x_s\varepsilon_t) = 0$ para $s \le t$; estrita, $E(\varepsilon_t \mid x_1, \ldots, x_T) = 0$. Sem a estrita, o MQO é viesado mas consistente; sem a contemporânea, inconsistente.
- **DL(q):** o choque temporário dá $\partial y_{t+k}/\partial x_t = \beta_k$; o permanente acumula até $\beta(1) = \sum_j \beta_j$.
- **ARDL(p,q):** os multiplicadores seguem $m_k = \beta_k + \sum_i \phi_i m_{k-i}$. No ARDL(1,1), $m_0 = \beta_0$ e $m_k = \phi_1^{k-1}(\phi_1\beta_0 + \beta_1)$.
- **Longo prazo:** $\theta = \beta(1)/\lambda(1) = \sum_j \beta_j/(1 - \sum_i \phi_i)$, com erro padrão pelo método delta.
- **Omitir** y_{t-1}, com x AR(1) de parâmetro ρ: plim $\hat{\beta}_0 = \beta_0/(1-\phi_1\rho)$.
- **ECM do ARDL(1,1):** $\Delta y_t = \phi_0 + \beta_0\Delta x_t + \alpha(y_{t-1} - \theta x_{t-1}) + \varepsilon_t$, com $\alpha = \phi_1 - 1$. A meia-vida é $\ln 0{,}5/\ln\phi_1$.
- **Granger:** F de exclusão de $x_{t-1}, \ldots, x_{t-p}$ na equação de y, sem x_t. Teste nas duas direções. *Feedback* $x_t = g x_{t-1} + \gamma y_{t-1} + v_t$ implica $E(\varepsilon_t x_{t+1}) = \gamma\sigma^2_\varepsilon$.
- **Diagnóstico:** Breusch-Godfrey, não Durbin-Watson, quando y_{t-1} é regressor. Resíduo autocorrelacionado pede mais defasagens, não HAC.