

Metodos No Parametricos - Final

Gonzalo Barrera Borla

Lunes 15/08/2019

Índice

1. Notación	1
2. Ejercicios	2
2.1. Practica 1, ej. 4	2
2.2. Práctica 2, ej. 2	5
2.3. Práctica 3, ej. 8	7
3. Demostraciones	8
3.1. Consistencia del test de Wilcoxon	8
3.1.1. Normalidad asintótica de T^+ bajo H_0	9
3.1.2. Convergencia en Probabilidad de \bar{T}	11
3.2. Teorema de Proyeccion	15
3.3. Distribución exacta de los estadísticos del test de Mann-Whitney- Wilcoxon (MWW) bajo H_0	16
4. Apendice	16
4.1. Condiciones suficientes de consistencia	16

1. Notación

- $[n]$ representa el conjunto de los naturales de 1 hasta n , $1, 2, 3, \dots, n$
- \mathbb{I} representa la función indicadora, $\mathbb{I}(P) = \begin{cases} 1 & \text{si } P \text{ es verdadera} \\ 0 & \text{si } P \text{ es falsa} \end{cases}$
- $\Pr(X)$ es la probabilidad del evento X
- $E, \text{Var}, \text{cov}$ son los operadores esperanza, varianza y covarianza, respectivamente.
- $X \perp Y$ indica que las VAs X, Y son independientes entre sí.

2. Ejercicios

2.1. Practica 1, ej. 4

Un empresario de la industria alimenticia asegura que menos del 10 % de sus frascos de café instantáneo contiene menos café del que garantiza la etiqueta. Para probar esta afirmación se eligen al azar 15 frascos de café y se pesa su contenido. Su afirmación es aceptada si a lo sumo dos frascos contienen menos café del garantizado.

1. ¿Qué hipótesis se deben testear?
2. ¿Cuál es el nivel de la regla de decisión planteada? ¿Le parece razonable?
3. Encuentre la probabilidad de que la afirmación del empresario sea aceptada cuando el porcentaje real de frascos que contienen menos café del garantizado en la etiqueta es 5 %, 10 % y 20 %.
4. Grafique la función de potencia del test planteado inicialmente. Muestre que es insesgado.
5. Con el tamaño de muestra dado, ¿es posible obtener un test de nivel 0.05? Hallar el tamaño de muestra mínimo para obtener un test de nivel 0.05, manteniendo la misma región de rechazo que el test anterior.

El planteo de las hipótesis a testear suele ser un poco idiosincrático, y dependerá de dónde queramos que caiga la carga de la prueba. La frase "su afirmación será *aceptada*" (id est, *no rechazada*), nos sugiere que coloquemos la afirmación del empresario en la hipótesis nula. Este arreglo es equivalente a la "inocencia hasta que se pruebe lo contrario", e implica que salvo que haya clara evidencia contra la proporción de frascos defectuosos, asumiremos que está debajo del 10 %:

H_0 : Menos del 10 % de los frascos contienen menos café del garantizado.
vs. H_1 : Más del 10 % de los frascos contiene menos café del garantizado.

La estrategia tradicional, sin embargo, consiste en colocar "lo que se desea probar" en la hipótesis alternativa, de manera que sólo se acepte su afirmación si la evidencia está a su favor. Por razones que quedarán claras al resolver el punto (5), esta parece ser la estrategia correcta en el ejercicio:

H_0 : 10 % o más de los frascos contienen menos café del garantizado.
vs. H_1 : Menos del 10 % de los frascos contiene menos café del garantizado.

Sea $X_i = 1$ si el i -ésimo frasco de café tiene menos café del que garantiza la etiqueta, y 0 en caso contrario. Supongamos además que la probabilidad p de que un frasco de café contenga menos café del garantizado, es constante e idéntica para todos los frascos de manera que $X_i \stackrel{iid}{\sim} \text{Ber}(p) \forall i \in [n]$, y $\sum_{i=1}^n X_i = T \sim$

$Bi(n, p)$ (en nuestro caso, $n = 15$). Bajo estos supuestos, dos formas equivalentes y matemáticamente tratables de las hipótesis son

$$H_0 := p \geq 0,1 \quad vs. \quad H_1 := p < 0,1$$

$$H_0 := p \in \Theta_0 = [0,1, 1] \quad vs. \quad H_1 := p \in \Theta_1 = [0, 0,1)$$

Sea $\Phi(T) = \mathbb{I}(T \leq k)$ un test que rechaza la hipótesis nula (*acepta* la afirmación del empresario) para valores bajos de T . El nivel de significación α es igual al supremo de su esperanza bajo la hipótesis nula. En general,

$$E(\Phi|p = p_0) = E_{p_0}(\mathbb{I}(T \leq k)) = \Pr_{p_0}(T \leq k) = \Pr(Bi(n, p_0) \leq k)$$

Y en particular, $n = 15, k = 2$ nos dan el test del enunciado, con región de rechazo $RR = \{0, 1, 2\}$. Sea $f_{n,k}(p) = \Pr(Bi(n, p) \leq k)$ la probabilidad acumulada a *izquierda* para una VA binomial, como función de p para $0 < k < n$ dados. f es *estrictamente decreciente* en p , ya que a mayor p , menor es la probabilidad de que T realice un valor por debajo de k , de manera que $\sup_{p \in [a,b]} f_{n,k}(p) = f(a)$. Luego,

$$\alpha = \sup_{p_0 \in [0,1,1]} E_{p_0}(\Phi) = \Pr_{0,1}(T \leq 2) = \sum_{i=0}^2 \binom{15}{i} 0,1^i 0,9^{15-i} \approx 0,8159$$

En general, un test que rechace la hipótesis nula aún cuando ésta es verdadera (*id est*, acepte la afirmación del empresario aún cuando miente) 4 de cada 5 veces, no es razonable. Tradicionalmente, esperaríamos $\alpha \leq 0,5$.

La probabilidad de que la afirmación del empresario sea aceptada cuando la proporción real de frascos de café es p_0 , es simplemente la probabilidad de que T caiga en la región de rechazo

$$\Pr(\Phi = 1|p = p_0) = \Pr_{p_0}(T \leq k) = \Pr(Bi(n, p_0) \leq k) = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} p_0^i (1 - p_0)^{n-i}$$

$$\Pr_{0,05}(T \leq 2) = \sum_{i=0}^2 \binom{15}{i} 0,05^i 0,95^{15-i} \approx 0,9638$$

$$\Pr_{0,1}(T \leq 2) \approx 0,8159$$

$$\Pr_{0,2}(T \leq 2) \approx 0,3980$$

Se dice que el test $\Phi(T)$ es insesgado para las hipótesis H_0, H_1 cuando es menos probable rechazar la hipótesis nula en caso de que esta sea verdadera, que cuando es falsa. Más formalmente, dado un test $\Phi(T) = \mathbb{I}(T \in RR)$ basado en un estadístico cuya función de distribución está unívocamente determinada por un único parámetro $\theta : T \sim F_\theta$ y un par de hipótesis $H_0 : \theta \in \Theta_0 \quad vs. \quad H_1 :$

$$\theta \in \Theta_1$$

$$\Pr(\text{rech. } H_0 | H_0 \text{ es V}) < \Pr(\text{rech. } H_0 | H_0 \text{ es F})$$

$$\Pr(\Phi = 1 | \theta \in \Theta_0) < \Pr(\Phi = 1 | \theta \in \Theta_1)$$

$$E_{\theta_0}(\Phi) < E_{\theta_1}(\Phi)$$

$$\forall \theta_0 \in \Theta_0, \theta_1 \in \Theta_1$$


$$\sup_{\theta \in \Theta_0} E_{\theta}(\Phi) < \inf_{\theta \in \Theta_1} E_{\theta}(\Phi)$$

$$\Rightarrow \Phi \text{ es insesgado para } H_0, H_1$$

En nuestro caso particular, $\Theta_0 = [0,1,1]$, $\Theta_1 = [0,0,1]$ y $E(\Phi) = f_{n,k}(p)$ es una función estrictamente *decreciente*. Como $\inf \Theta_0 = 0,1 < \sup \Theta_1$, entonces $\sup_{\theta \in \Theta_0} E_{\theta}(\Phi) < \inf_{\theta \in \Theta_1} E_{\theta}(\Phi)$ y Φ es insesgado para H_0, H_1 . La *potencia* de un test, es justamente la probabilidad de rechazar H_0 :


- cuando $\theta \in \Theta_0$, el supremo de la función de potencia nos da el nivel de significación α del test, y
- cuando $\theta \in \Theta_1$, obtenemos la probabilidad de detectar la hipótesis alternativa (la potencia propiamente dicha).

Con una simple función de R, agregando referencias horizontales para el nivel de significación del test ($\alpha \approx 0,8159$) y $p = 0,1$, se intuye claramente la insesgadez que antes demostramos:



Finalmente, debemos encontrar el mínimo n tal que el nivel de significación del test sea $\leq 0,05$, manteniendo la misma $RR = \{0, 1, 2\}$. Si al comienzo del ejercicio nos hubiésemos decidido por el *set* de hipótesis que coloca la afirmación del empresario en H_0 , la región de rechazo hubiese sido $RR = \{3, \dots, 15\}$, ¡que rechaza para valores “centrales” de T ! Aún siendo razonables y tomando $RR = \{3, \dots, n\}$, consideremos $g_{k,p}(n) = \Pr_p(T \in RR) = \Pr(Bi(n, p) > k)$ para $0 \leq k < n$, $0 < p < 1$ dados. $g_{k,p}$ es una función estrictamente creciente en n , de manera que subiendo el tamaño muestral, ¡aumentaría α ! Evidentemente, esta última consigna sólo tiene sentido si planteamos las hipótesis con la afirmación del empresario en H_1 .

Estamos buscando mín $n : \Pr(Bi(n, p) \leq k) = 1 - g_{k,p}(n) \leq \alpha$, y si g era estrictamente creciente, $1 - g$ será estrictamente decreciente en n . Además, ya vimos que $\Pr(Bi(n, p) \leq k)$ es *estrictamente decreciente* en p , y por ende alcanza su máximo en $p = \inf \Theta_0 = 0,1 \forall n$. Tomando $\alpha = 0,05$, $p = 0,1$, $k = 2$, podemos buscar n con la ayuda de R, y encontramos que $\Pr(Bi(60, 0,1) \leq 2) \approx 0,0530 > 0,05 > 0,0491 \approx \Pr(Bi(61, 0,1) \leq 2)$, de manera que el mínimo tamaño muestral que nos garantiza $\alpha \leq 0,05$ dada $RR = \{0, 1, 2\}$, es $n = 61$.



2.2. Práctica 2, ej. 2

Construya el gráfico de $S(\theta)$ para n impar y deduzca el estimador y el intervalo de confianza para θ .

Supongamos que $\forall i \in [n], X_i \stackrel{iid}{\sim} F(t - \theta), F \in \Omega_0$ (distribuciones absolutamente continuas con única mediana en 0) de manera que las X_i tienen única mediana en θ . Definamos el estadístico $S(\theta) = \#\{i : X_i - \theta > 0, i \in [n]\}$, y considerando que los conjuntos $\{X_1, \dots, X_n\}$ y $\{X^{(1)}, \dots, X^{(n)}\}$ son idénticos, reescribámoslo como

$$S(\theta) = \#\{X_i - \theta > 0\} = \#\{X^{(i)} - \theta > 0\} = \#\{X^{(i)} > \theta\}$$

Así se ve claramente que $S(\theta)$ es una función continua a derecha, en escalera decreciente con saltos de tamaño 1 en los estadísticos de orden $X^{(i)}$. Visto de otra forma,

$$S(\theta) = n - k \Leftrightarrow X^{(k)} \leq \theta < X^{(k+1)}$$


$$S(\theta) \leq k \Leftrightarrow \theta \geq X^{(n-k)}$$

$$S(\theta) > k \Leftrightarrow \theta < X^{(n-k)}$$

Nótese que bajo $H_0, \forall (F, \theta, i) \in (\Omega_0 \times \mathbb{R} \times [n]), Y_i = \mathbb{I}(X_i - \theta > 0) \stackrel{iid}{\sim} Ber(\frac{1}{2})$, y por ende $S(\theta) \sim Bi(n, \frac{1}{2})$ y es simétrica alrededor de $\frac{n}{2}$. Luego, si elegimos $k : \Pr(Bi(n, \frac{1}{2}) \leq k) = \Pr(Bi(n, \frac{1}{2}) \geq n - k) = \frac{\alpha}{2}$,

$$\begin{aligned} 1 - \alpha &= 1 - \frac{\alpha}{2} - \frac{\alpha}{2} \\ &= \Pr(S \in \mathbb{R}) - \Pr(S \leq k) - \Pr(S \geq n - k) \\ &= \Pr(k < S < n - k) \\ \Pr(k < S < n - k) &= \Pr(S \leq n - (k + 1) \cap S > k) \\ &= \Pr(\theta \geq X^{(n - [n - (k + 1)])} \cap \theta < X^{(n - k)}) \\ &= \Pr(X^{(k+1)} \leq \theta < X^{(n-k)}) \end{aligned}$$

Y resulta que $[X^{(k+1)}, X^{(n-k)})$ es un intervalo de confianza de nivel $1 - \alpha$ para θ . Como la distribución de S es simétrica alrededor de $\frac{n}{2}$, buscamos un estimador puntual $\hat{\theta} : S(\hat{\theta}) = \frac{n}{2}$. Graficando la función (por ejemplo, para $n = 9$),



vemos que cuando $\theta < X^{(\frac{n+1}{2})} \Rightarrow S(\theta) < \frac{n-1}{2}$ y si $\theta \geq X^{(\frac{n+1}{2})} \Rightarrow S(\theta) > \frac{n+1}{2}$. Luego, el valor más razonable del estimador puntual será la única mediana de la muestra, $\hat{\theta} = X^{(\frac{n+1}{2})}$.

2.3. Práctica 3, ej. 8

Suponga que $\forall i \in [n], X_i \stackrel{iid}{\sim} F \in \Omega_s$ (distribuciones simétricas con única mediana en 0).

1. Usando que $g(X_1, \dots, X_n)$ y $g(-X_1, \dots, -X_n)$ tienen la misma distribución, muestre que si $g(X_1, \dots, X_n) + g(-X_1, \dots, -X_n) = \mu_0$, entonces $g(X_1, \dots, X_n)$ está simétricamente distribuída alrededor de $\mu_0/2$, Hint: Muestre que $P(g(X_1, \dots, X_n) \leq \frac{\mu_0}{2} - t) = P(g(X_1, \dots, X_n) \geq \frac{\mu_0}{2} + t)$.
2. Aplique (1) al estadístico del test de rangos signados de Wilcoxon para demostrar que T^+ tiene distribución simétrica bajo la hipótesis nula. ¿Cuál es el punto de simetría?

Para simplificar la notación, consideremos el vector aleatorio $\bar{X} = (X_1, \dots, X_n)$. Además, por hipótesis $g(\bar{X}) = \mu_0 - g(-\bar{X})$ y como $g(\bar{X}), g(-\bar{X})$ tienen la misma distribución, $\Pr(g(\bar{X}) \leq k) = \Pr(g(-\bar{X}) \leq k)$.

$$\forall k \in \mathbb{R}, \Pr(g(\bar{X}) \leq k) = \Pr(\mu_0 - g(-\bar{X}) \leq k) = \Pr(\mu_0 - k \leq g(-\bar{X})) = \Pr(\mu_0 - k \leq g(\bar{X}))$$

Tomando $k = \frac{\mu_0}{2} - t$, $\Pr(g(\bar{X}) \leq \frac{\mu_0}{2} - t) = \Pr(\mu_0 - \frac{\mu_0}{2} - t \leq g(\bar{X})) = \Pr(g(\bar{X}) \geq \frac{\mu_0}{2} + t)$ y por definición, g es simétrica alrededor de $\frac{\mu_0}{2}$, su mediana.

En particular, $T^+ = \sum_{i \in [n]} sg(X_i) R(X_i)$ es función de \bar{X} y entre los supuestos del test, se encuentra que $\forall i \in [n]$, $X_i \stackrel{iid}{\sim} F \in \Omega_s$. Luego, $T^+(\bar{X})$, $T^+(-\bar{X})$ tienen la misma distribución¹. Además, asumiendo que F es absolutamente continua, y considerando que $R_i = R(X_i) = R(-X_i)$ en la muestra ordenada por valores absolutos,

$$\begin{aligned} \frac{n(n+1)}{2} &= \sum_{i \in [n]} i = \sum_{i \in [n]} 1R_i \\ &= \sum_{i \in [n]} \left[\mathbb{I}(X_i > 0) + \overbrace{\mathbb{I}(X_i = 0)}^{=0} + \mathbb{I}(X_i < 0) \right] R_i \\ &= \sum_{i \in [n]} \mathbb{I}(X_i > 0) R(X_i) + \sum_{i \in [n]} \mathbb{I}(X_i < 0) R(X_i) \\ &= \sum_{i \in [n]} \mathbb{I}(X_i > 0) R(X_i) + \sum_{i \in [n]} \mathbb{I}(-X_i > 0) R(-X_i) \\ &= \sum_{i \in [n]} sg(X_i) R(X_i) + \sum_{i \in [n]} sg(-X_i) R(-X_i) \\ \frac{n(n+1)}{2} &= T^+(\bar{X}) + T^+(-\bar{X}) \end{aligned}$$

Y T^+ tiene distribución simétrica alrededor de $\frac{n(n+1)}{4}$.

3. Demostraciones

3.1. Consistencia del test de Wilcoxon

Sea $\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)$ una muestra aleatoria tal que $\forall i \in [n]$, $X_i \stackrel{iid}{\sim} F(t - \theta)$, $F \in \Omega_s$ (distribuciones simétricas con única mediana en 0), y las hipótesis a testear $H_0 : \theta = 0$ vs. $H_1 : \theta > 0$. Definamos

- el rango de $|X_i|$ en la muestra ordenada segun valores absolutos: $R(X_i) = R_i = \#\{j : |X_j| \leq |X_i|, j \in [n]\}$,
- el *antirrango* $D_j = i \Leftrightarrow R_i = j$, la “función inversa” de R_i , que dado el rango j de un elemento en la muestra ordenada por valores absolutos, devuelve el índice en la muestra original.

¹Se puede probar que si $\forall i \in [n]$, $X_i \stackrel{iid}{\sim} F \in \Omega_s$, $g(X_1, \dots, X_n) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tiene la misma distribución que $g(-X_1, \dots, -X_n)$ ya sea en general o al menos para el caso particular de T^+ para completar la demostración, pero ya que el enunciado dice “usando...”, lo tomamos como dado.

- la "función signo" $sg(x) = \mathbb{I}(x > 0)$, y
- el estadístico $T^+ = \sum_{i \in [n]} R_i sg(X_i) = \sum_{j \in [n]} j W_j$, donde $W_j = sg(X_{D_j})$

Nótese que con F absolutamente continua no hay empates, y $D_{R_i} = i$, $R_{D_j} = j$, $[n] = \{1, \dots, n\} = \{R_1, \dots, R_n\} = \{D_1, \dots, D_n\}$.

Para probar la consistencia de $\Phi_n = \mathbb{I}(T_n^+ > k_n)$ para las hipótesis usando el Teorema 6 del anexo, necesitamos las siguientes condiciones:

- $T_n^+ \xrightarrow{p} \mu(G) = \begin{cases} \mu_0 & \forall G \in \Omega_{nul} \\ > \mu_0 & \forall G \in \Omega_c \subset \Omega_{alt} \end{cases}$
- Bajo H_0 , $\exists \sigma_0 : \sqrt{n} \frac{T_n^+ - \mu_0}{\sigma_0} \xrightarrow{D} N(0, 1)$

Para probar la normalidad asintótica, veremos que bajo H_0 , T^+ se puede expresar como combinación lineal de variables independientes entre sí. Para la convergencia en probabilidad de T^+ , encontraremos la esperanza y varianza exactas del estadístico recurriendo a los promedios de Walsh.

3.1.1. Normalidad asintótica de T^+ bajo H_0

Teorema 1. *Bajo $H_0 : \theta = 0$, $F \in \Omega_s$ las VA $sg(X_1), \dots, sg(X_n)$ y el vector (R_1, \dots, R_n) son mutuamente independientes.*

Demostración. Como $X_i \perp X_j \forall i \neq j$ por definición, y las funciones $|X_i|, sg(X_i)$ sólo dependen de X_i , los pares $(sg(X_i), |X_i|) \perp (sg(X_j), |X_j|) \forall i \neq j$. Recordando que como $\theta = 0$, $F \in \Omega_s \Rightarrow F(-t-0) = 1 - F(t-0)$, y veamos que $sg(X_i) \perp |X_i|$:

$$\begin{aligned}
\Pr(sg(X_i) = 0 \cap |X_i| \leq k) &= \Pr(X_i \leq 0 \cap -k \leq X_i \leq k) \\
&= \Pr(-k \leq X_i \leq 0) \\
&= F(0) - F(-k) & \Pr(X_i = -k) = 0 \\
&= \frac{1}{2} (1 - 2F(-k)) \\
&= \frac{1}{2} [F(k) - F(-k)] \\
&= \Pr(X_i > 0) \Pr(-k \leq X_i \leq k)
\end{aligned}$$

$$\Pr(sg(X_i) = 0 \cap |X_i| \leq k) = \Pr(sg(X_i)) \Pr(|X_i| \leq k)$$

Un planteo similar para $sg(X_i) = 1$ nos permite concluir que $sg(X_i) \perp |X_i|$. Como $R_k = f(|X_1|, \dots, |X_n|)$, $sg(X_i) \perp |X_j| \forall j \in [n] \Rightarrow sg(X_i) \perp R_k \forall i, k \in [n]^2$. Análogamente, $D_k = g(|X_1|, \dots, |X_n|) \Rightarrow sg(X_i) \perp D_k \forall i, k \in [n]^2$. \square

Teorema 2. *Bajo $H_0 : \theta = 0$, $F \in \Omega_s$, $sg(X_{D_j}) = W_j \stackrel{iid}{\sim} Ber(\frac{1}{2})$.*

Demostración. Sea $D = (D_1, \dots, D_n)$ el vector de antirrangos como variables aleatorias, $d = (d_1, \dots, d_n)$ una de las $n!$ configuraciones posible de ellos y $s = (s_1, \dots, s_n) \in \{0, 1\}^n$. Por el teorema de la probabilidad total,

$$\begin{aligned}
\Pr \left(\bigcap_{i \in [n]} sg(X_{D_i}) = s_i \right) &= \sum_d \left[\Pr \left(\bigcap_{i \in [n]} sg(X_{D_i}) = s_i \mid D = d \right) \Pr(D = d) \right] \\
&= \sum_d \left[\Pr \left(\bigcap_{i \in [n]} sg(X_{d_i}) = s_i \right) \Pr(D = d) \right] \\
&= \sum_d \left[\left(\prod_{i \in [n]} \Pr(sg(X_{d_i}) = s_i) \right) \Pr(D = d) \right] \quad sg(X_i) \perp sg(X_j) \\
&= \sum_d \left[\left[\prod_{i \in [n]} \frac{1}{2} \right] \Pr(D = d) \right] \\
&= \left(\frac{1}{2} \right)^n \sum_d \overbrace{[\Pr(D = d)]}^{=1} \\
\Pr \left(\bigcap_{i \in [n]} sg(X_{D_i}) = s_i \right) &= 2^{-n} \forall (s_1, \dots, s_n) \in \{0, 1\}^n
\end{aligned}$$

Es decir, las 2^n posibles configuraciones de signos son equiprobables, y $\forall (s_1, \dots, s_n) \in \{0, 1\}^n$, $\Pr \left(\bigcap_{i \in [n]} W_i = s_i \right) = \prod_{i \in [n]} \Pr(W_i = s_i) = 2^{-n}$ y $\Pr(W_i = 1) = \Pr(W_i = 0) = \frac{1}{2} \forall i \in [n]$. Luego, $W_i \stackrel{iid}{\sim} Ber(p) \forall i \in [n]$. \square

Teorema 3. Sean $X_i \stackrel{iid}{\sim} E(X_1) = 0$, $\text{Var}(X_1) = \sigma^2 \in (0, \infty)$, y defínase $T = n^{-\frac{1}{2}} \sum_{i \in [n]} a_i X_i$. Si

$$\frac{\max |a_i|}{\sqrt{\sum_{i \in [n]} a_i^2}} \rightarrow 0$$

entonces $\frac{T}{\sqrt{\text{Var}(T)}} \xrightarrow{D} N(0, 1)$ con $\text{Var}(T) = n^{-1} \sigma^2 \sum_{i \in [n]} a_i^2$.

Demostración. Es una variante del Teorema Central del Límite de Lindeberg. Cf. Teorema A9 en Hettmansperger, p. 301. \square

Ahora sí estamos en condiciones de probar la normalidad asintótica de $T^+ = \sum_{i \in [n]} i sg(X_{D_i}) = \sum_{i \in [n]} i W_i$ bajo H_0 . Sean $X_i = W_i - \frac{1}{2}$, $a_i = i$. Luego, $E(X_i) = E(W_i) - \frac{1}{2} = 0$ y $\text{Var}(X_i) = \text{Var}(W_i) = \frac{1}{4} = \sigma^2 \in (0, \infty)$. Además,

cuando $n \rightarrow \infty$

$$\begin{aligned} \frac{\max |a_i|}{\sqrt{\sum_{i \in [n]} a_i^2}} &= \frac{\max |i|}{\sqrt{\sum_{i \in [n]} i^2}} = \frac{n}{\sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}} = \frac{n}{\sqrt{\frac{1}{3}n^3 + \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{6}n}} \\ &= \frac{\mathcal{N}}{\mathcal{N}\sqrt{n} \underbrace{\sqrt{\frac{1}{3} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2}}}_{\rightarrow \sqrt{1/3}}} = \sqrt{\frac{3}{n}} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned} T &= n^{-\frac{1}{2}} \sum_{i \in [n]} a_i X_i = n^{-\frac{1}{2}} \sum_{i \in [n]} i \left(W_i - \frac{1}{2} \right) = \frac{T^+ - \frac{n(n+1)}{4}}{\sqrt{n}} \\ \text{Var}(T) &= n^{-1} \sigma^2 \sum_{i \in [n]} a_i^2 = \frac{\sum_{i \in [n]} i^2}{4n} = \frac{(n+1)(2n+1)}{24} \end{aligned}$$

Y finalmente,

$$\frac{T}{\sqrt{\text{Var}(T)}} = \frac{T^+ - \frac{n(n+1)}{4}}{\sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}}} \xrightarrow{D} N(0, 1)$$

3.1.2. Convergencia en Probabilidad de \bar{T}

Recordemos que T^+ admite la siguiente definición en base a los promedios de Walsh,

$$\begin{aligned} T^+ &= \# \left\{ i, j : \frac{X_i + X_j}{2} > 0, 1 \leq i \leq j \leq n \right\} = \sum_{i=1}^j \sum_{j=1}^n \mathbb{I}(X_i + X_j > 0) \\ T^+ &= \sum_{i=1}^j \sum_{j=1}^n T_{ij} \end{aligned}$$

donde $T_{ij} = (X_i + X_j > 0)$. Utilicemos esta ultima forma para desarrollar la esperanza y varianza de T^+ , dada cierta distribucion subyacente fija $F_0 \in \Omega_0(F_0 \in \Omega_s, \theta = 0)$. Gracias a la linealidad de la esperanza, y el hecho de que $E(\mathbb{I}(Q)) = \Pr(Q)$,

$$\begin{aligned} E(T^+) &= E \left[\sum_{i=1}^j \sum_{j=1}^n \mathbb{I}(X_i + X_j > 0) \right] = \sum_{i=1}^j \sum_{j=1}^n E[\mathbb{I}(X_i + X_j > 0)] = \sum_{i=1}^j \sum_{j=1}^n \Pr(X_i + X_j > 0) \\ E(T^+) &= \sum_{i=j} \Pr(X_i > 0) + \sum_{i < j} \Pr(X_i + X_j > 0) \end{aligned}$$

Sean ahora $p_1 = \Pr(X_i > 0)$, $p_2 = \Pr(X_i + X_j > 0 | i \neq j)$ (cuando $i = j$, $\Pr(X_i + X_j > 0) = \Pr(2X_i > 0) = p_1$). Se observa que hay n sumandos donde $i = j$ y $\frac{(n-1)n}{2}$ sumandos donde $i < j$. Luego, $E(T^+) = np_1 + \frac{(n-1)n}{2}p_2$.

Para el cálculo de la varianza de T^+ , usaremos el hecho de que, en general, si $Y = \sum_i X_i$, entonces

$$\begin{aligned}\text{Var}(Y) &= \text{cov}(Y, Y) = \text{cov}\left(\sum_i X_i, \sum_i X_i\right) \\ &= \sum_i \sum_j \text{cov}(X_i, X_j) \\ &= \sum_i \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{i < j} \text{cov}(X_i, X_j)\end{aligned}$$

Para ello, tendremos que encontrar la expresion de la covarianza para todas las combinaciones unicas de subindices.

$$\text{Var}(T^+) = \text{Var}\left(\sum_{i \leq j} T_{ij}\right) = \sum_{i \leq j} \sum_{k \leq l} \text{cov}(T_{ij}, T_{kl})$$

Recordemos que si $X \perp Y \Rightarrow E(XY) = E(X)E(Y) \Rightarrow \text{cov}(X, Y) = 0$. Además, para funciones determinísticas arbitrarias f, g , si $X \perp Y \Rightarrow f(X) \perp g(Y)$. Como $T_{ij} = f(X_i, X_j)$, y $X_i \perp X_j \forall i \neq j$, siempre y cuando los pares $(i, j), (k, l)$ no compartan ningún índice, $\text{cov}(T_{ij}, T_{kl}) = 0$. ¿Cuántos pares (T_{ij}, T_{kl}) comparten algún índice en la expresión de $\text{Var}(T^+)$? Tengamos en cuenta que cada elemento T_{ij} figura en exactamente $\frac{n(n+1)}{2}$ términos, “cruzado” una vez con cada uno de los promedios de Walsh:

$$\begin{array}{cccccccc} T_{11} & T_{12} & \dots & T_{1i} & \dots & T_{1j} & \dots & T_{1n} \\ & T_{22} & \dots & T_{2i} & \dots & T_{2j} & \dots & T_{2n} \\ & & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ & & & T_{ii} & \dots & T_{ij} & \dots & T_{in} \\ & & & & \dots & \dots & \dots & \dots \\ & & & & & T_{jj} & \dots & T_{jn} \\ & & & & & & \dots & \dots \\ & & & & & & & T_{nn} \end{array}$$

Cuando $i < j$, T_{ij} comparte 2 índices con T_{ij}, T_{ii}, T_{jj} y 1 índice con $\overbrace{(i-1)}^{col\ i} + \overbrace{(n-i-1)}^{fila\ i} + \overbrace{(j-2)}^{col\ j} + \overbrace{(n-j)}^{fila\ j} = 2(n-2)$ elementos. Cuando $i = j$, T_{ii} comparte 2 índices con T_{ii} , y 1 índice con $\overbrace{(i-1)}^{col\ i} + \overbrace{(n-i)}^{fila\ i} = n-1$ elementos. Luego, sólo tenemos que preocuparnos por términos de las formas

$$\text{cov}(T_{11}, T_{11}) = \text{Var}T_{11} \quad \text{cov}(T_{12}, T_{12}) = \text{Var}T_{12} \quad \text{cov}(T_{11}, T_{12}) \quad \text{cov}(T_{12}, T_{13})$$

Luego,

$$\begin{aligned}\forall i \neq j, \quad \sum_{k \leq l} \text{cov}(T_{ij}, T_{kl}) &= \text{Var}(T_{12}) + 2\text{cov}(T_{11}, T_{12}) + 2(n-2)\text{cov}(T_{12}, T_{13}) \\ \forall i = j, \quad \sum_{k \leq l} \text{cov}(T_{ii}, T_{kl}) &= \text{Var}(T_{11}) + (n-1)\text{cov}(T_{11}, T_{12})\end{aligned}$$

Y entonces

$$\begin{aligned}\text{Var}(T^+) &= \sum_{i=j} \sum_{k \leq l} \text{cov}(T_{ij}, T_{kl}) + \sum_{i < j} \sum_{k \leq l} \text{cov}(T_{ij}, T_{kl}) \\ &= n \left(\sum_{k \leq l} \text{cov}(T_{ii}, T_{kl}) \right) + \frac{n(n-1)}{2} \left(\sum_{k \leq l} \text{cov}(T_{ij}, T_{kl}) \right) \\ &= \frac{n(n-1)}{2} \text{Var}(T_{12}) + 2 \frac{n(n-1)}{2} \text{cov}(T_{11}, T_{12}) + 2 \frac{n(n-1)}{2} (n-2) \text{cov}(T_{12}, T_{13}) \\ &\quad + n \text{Var}(T_{11}) + n(n-1) \text{cov}(T_{11}, T_{12}) \\ \text{Var}(T^+) &= n \text{Var}(T_{11}) + \frac{n(n-1)}{2} \text{Var}(T_{12}) + 2n(n-1) \text{cov}(T_{11}, T_{12}) \\ &\quad + n(n-1)(n-2) \text{cov}(T_{12}, T_{13})\end{aligned}$$

Recordemos las definiciones de $p_1 = \Pr(X_1 > 0)$, $p_2 = \Pr(X_1 + X_2 > 0)$. Usando que $\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$ y $\mathbb{I}(P) \times \mathbb{I}(Q) = \mathbb{I}(P \wedge Q)$ (y por ende $[\mathbb{I}(P)]^2 = \mathbb{I}(P \wedge P) = \mathbb{I}(P)$), calculamos

$$\begin{aligned}\text{Var}(T_{11}) &= E(T_{11}^2) - E(T_{11})^2 = E(\mathbb{I}(X_1 > 0)^2) - E(\mathbb{I}(X_1 > 0))^2 \\ &= E(\mathbb{I}(X_1 > 0))(1 - E(\mathbb{I}(X_1 > 0))) \\ &= \Pr(X_1 > 0)(1 - \Pr(X_1 > 0)) \\ &= p_1(1 - p_1) \\ \text{Var}(T_{12}) &= E(T_{12}^2) - E(T_{12})^2 = E(\mathbb{I}(X_1 + X_2 > 0)^2) - E(\mathbb{I}(X_1 + X_2 > 0))^2 \\ &= E(\mathbb{I}(X_1 + X_2 > 0))(1 - E(\mathbb{I}(X_1 + X_2 > 0))) \\ &= \Pr(X_1 + X_2 > 0)(1 - \Pr(X_1 + X_2 > 0)) \\ &= p_2(1 - p_2) \\ \text{cov}(T_{11}, T_{12}) &= E(T_{11}T_{12}) - E(T_{11})E(T_{12}) \\ &= E(\mathbb{I}(X_1 > 0 \wedge X_1 + X_2 > 0)) - E(\mathbb{I}(X_1 > 0))E(\mathbb{I}(X_1 + X_2 > 0)) \\ &= \Pr(X_1 > 0 \wedge X_1 + X_2 > 0) - p_1 \cdot p_2 \\ &= p_3 - p_1 \cdot p_2 \quad , \text{ digamos} \\ \text{cov}(T_{12}, T_{13}) &= E(T_{12}T_{13}) - E(T_{12})E(T_{13}) \\ &= E(\mathbb{I}(X_1 + X_2 > 0 \wedge X_1 + X_3 > 0)) - E(\mathbb{I}(X_1 + X_2 > 0))E(\mathbb{I}(X_1 + X_3 > 0)) \\ &= \Pr(X_1 + X_2 > 0 \wedge X_1 + X_3 > 0) - p_2^2 \\ &= p_4 - p_2^2 \quad , \text{ digamos}\end{aligned}$$

Finalmente,

$$\text{Var}(T^+) = np_1(1-p_1) + \frac{n(n-1)}{2}p_2(1-p_2) + 2n(n-1)(p_3 - p_1 \cdot p_2) + n(n-1)(n-2)(p_4 - p_2^2)$$

Consideremos la esperanza y varianza del estadístico $\bar{T} = \frac{T^+}{\frac{n(n+1)}{2}}$:

$$\text{E}(\bar{T}) = \text{E}\left(\frac{T^+}{\frac{n(n+1)}{2}}\right) = \frac{2}{n(n+1)}\text{E}(T^+) = \frac{2}{n(n+1)}\left(np_1 + \frac{(n-1)n}{2}p_2\right)$$

$$\text{E}(\bar{T}) = \frac{2}{n+1}p_1 + \frac{n-1}{n+1}p_2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} p_2$$

$$\text{Var}(\bar{T}) = \frac{4}{n^2(n+1)^2}\text{Var}(T^+)$$

$$\text{Var}(\bar{T}) = n^{-3}k_1 + n^{-2}k_2 + n^{-1}k_3 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

donde k_1, k_2, k_3 son las expresiones constantes e independientes de n que resultan al distribuir el coeficiente $\frac{4}{n^2(n+1)^2}$ entre la cornucopia de términos de $\text{Var}(T^+)$. En consecuencia, $\bar{T} \xrightarrow{p} p_2$. Nos resta calcular p_2 para las distribuciones $F \in \Omega_{nul}$, $F \in \Omega_c \subset \Omega_{alt}$.

$$\begin{aligned} p_2 &= \Pr(X_1 + X_2 > 0) = \Pr(X_1 > -X_2) = \iint \mathbb{I}(x_1 > -x_2) f(x_1) f(x_2) dx_2 dx_1 \\ &= \iint_{-x_2}^{\infty} f(x_1) f(x_2) dx_1 dx_2 = \int f(x_2) \left[F(x) \Big|_{-x_2}^{\infty} \right] dx_2 = \int f(x_2) [1 - F(-x_2)] dx_2 \end{aligned}$$

Cuando $F \in \Omega_s$, $\theta = 0 \Rightarrow 1 - F(-x) = F(x)$, de manera que $f(x) [1 - F(-x)] = f(x) F(x)$, que tiene como primitiva a $\frac{1}{2} F(x)^2$. Luego,

$$p_2 = \int f(x_2) [1 - F(-x_2)] dx_2 = \frac{1}{2} \left(F(x)^2 \Big|_{-\infty}^{\infty} \right) = \frac{1}{2}$$

Consideremos ahora la clase de distribuciones *estocásticamente positivas* Ω_p . Diremos que $G \in \Omega_p$ si $\forall k \in \mathbb{R}$, $1 - G(k) \geq G(-k)$, con desigualdad estricta en un conjunto de medida no-nula. Si $X_i \stackrel{iid}{\sim} G \in \Omega_p$,

$$p_2 = \int g(x_2) [1 - G(-x_2)] dx_2 > \int g(x_2) [G(x_2)] dx_2 = \frac{1}{2} \left(G(x)^2 \Big|_{-\infty}^{\infty} \right) = \frac{1}{2}$$

y luego

$$\bar{T} \rightarrow p_2(F, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{si } F(t - \theta) \in \Omega_s \wedge \theta = 0 \\ > \frac{1}{2} & \text{si } F \in \Omega_p \end{cases}$$

Vale notar que cuando $F \in \Omega_s$, $\theta > 0$, la desigualdad que caracteriza a Ω_p se cumple estrictamente en todo punto

$$1 - F(t) > 1 - F(t + \theta) = F(\theta - t) > F(t)$$

y si $\Omega_{>} = \{F \text{ con unica mediana en } \theta > 0\}$ $(\Omega_s \cap \Omega_{>}) \subset \Omega_p$. Luego, \bar{T} es un test consistente para las hipotesis originales.

3.2. Teorema de Proyeccion

Teorema 4. (de Proyeccion) Sea X_1, \dots, X_n una muestra aleatorio con distribucion arbitraria $X_i \stackrel{iid}{\sim} F \forall i \in [n]$, y $V = f(X_1, \dots, X_n)$ una variable aleatoria con $EV = 0$. Si W es una variable aleatoria de la forma $W = \sum_i g_i(X_i)$, entonces $E[(V - W)^2]$ se minimiza eligiendo las funciones $g_i = g_i^*$:

$$g_i^*(x) = E(V | X_i = x)$$

$V_p = \sum_i g_i^*(X_i)$ se denomina la **proyeccion de V** sobre la clase de VAs independientes, y se cumple que

$$E[(V - V_p)^2] = \text{Var}(V) - \text{Var}(V_p)$$

Demostración. Sumando y restando V_p ,

$$\begin{aligned} E[(V - W)^2] &= E[(V - V_p) + (V_p - W)]^2 \\ &= E[(V - V_p)^2] + E[(V_p - W)^2] + 2E(V - V_p)E(V_p - W) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(V - V_p) &= E\left(V - \sum_i g_i^*(X_i)\right) = E\left(V - g_i^*(X_i) - \sum_{i \neq j} g_j^*(X_j)\right) \\ &= E\left[E\left(V - g_i^*(X_i) - \sum_{i \neq j} g_j^*(X_j) \mid X_i\right)\right] \\ &= E\left[E(V | X_i) - E(g_i^*(X_i)) - \sum_{i \neq j} E(g_j^*(X_j) | X_i)\right] \\ &= E\left[\cancel{E(V | X_i)} - \cancel{E(V | X_i)} - \sum_{i \neq j} E(g_j^*(X_j) | X_i)\right] & g_j^*(X_j) \perp X_i \\ &= E\left[-\sum_{i \neq j} E(E(V | X_j))\right] = E\left[-\sum_{i \neq j} EV\right] = 0 \end{aligned}$$

Retomando la expresion anterior,

$$\begin{aligned} E[(V - W)^2] &= E[(V - V_p)^2] + E[(V_p - W)^2] + 2 \times 0 \times \cancel{E(V_p - W)} \\ E[(V - W)^2] &\geq E[(V - V_p)^2] \end{aligned}$$

con igualdad estricta $\Leftrightarrow W = V_p$. Ademàs, $EV_p = \sum_i E[E(V|X_i)] = nEV = 0$, de manera que tomando $W = 0$, obtenemos la expresion de la varianza:

$$EV^2 = E(V - V_p)^2 + EV_p^2 \Rightarrow E(V - V_p)^2 = \text{Var}V - \text{Var}V_p$$

□

En general, bajo la hipotesis nula, los estadísticos de los test no paramétricos que consideramos se pueden expresar como una suma (de funciones) de variables aleatorias independientes entre sí, y contamos con toda una artillería para probar la normalidad asintótica de expresiones bajo esas condiciones. Bajo la hipótesis alternativa, sin embargo, es común perder la independencia entre dichas expresiones, y por ende necesitamos una expresión alternativa de los estadísticos sobre la que podamos dar alguna aproximación en grandes números.

Intuitivamente, el teorema de proyección nos ofrece una solución elegante. Primero, hay que notar que $\forall i, g_i^*(X_i) = E(V|X_i)$ es una VA que *dependen únicamente de X_i* , entonces $\forall i \neq j, g_i^*(X_i) \perp g_j^*(X_j)$ y $V = \sum_i g_i^*$ es nuevamente una función lineal de VA independientes con $E = 0$. Luego, a medida que $n \rightarrow \infty$, podemos pensar que salvo casos patológicos, la influencia de cada X_i particular sobre EV tiende a cero², y $E(V - V_p)^2 \rightarrow 0$, de manera que si $f(V_p) \xrightarrow{D} N(0, 1)$, $f(V)$ también lo hará. Con la distribución asintótica bajo la alternativa, podemos explorar características del estimador como su eficiencia asintótica relativa.

3.3. Distribución exacta de los estadísticos del test de Mann-Whitney-Wilcoxon (MWW) bajo H_0

4. Apéndice

4.1. Condiciones suficientes de consistencia

Definición 5. Sea X_1, \dots, X_n una muestra aleatoria tal que $\forall i \in [n], X_i \stackrel{iid}{\sim} F \in \Omega$. Se dice que la sucesión de tests $\{\Phi_n\}$ de nivel asintótico α es consistente para las hipótesis $H_0 : F \in \Omega_0 \subset \Omega$ vs. $H_1 : F \in \Omega_1 \subset \Omega$, si

$$\blacksquare \quad \alpha \geq E_{F_0}(\Phi_n) \geq \gamma > 0 \quad \forall F_0 \in \Omega_0, \text{ y}$$

²De más está decir que estas afirmaciones se pueden cuantificar formalmente, y de hecho eso lo que debemos hacer al aplicar este teorema sobre estadísticos particulares.

$$\blacksquare E_{F_1}(\Phi_n) \rightarrow 1 \quad \forall F_1 \in \Omega_1,$$

donde $E_G(T(X_1, \dots, X_n)) = E(T|X_i \stackrel{iid}{\sim} G)$. Es decir, que el nivel de significación del test se mantiene acotado por encima del cero para toda la sucesión, mientras que la potencia tiende a 1 para la alternativa, a medida que aumenta el tamaño muestral.

El conjunto de todas las distribuciones para las cuales $\{\Phi_n\}$ es consistente se denomina *clase de consistencia* $\Omega_c \subset \Omega_1$.

El siguiente teorema es útil para determinar la clase de consistencia en ciertos test comunes.

Teorema 6. *Sea Φ_n un test de nivel asintótico α basado en T_n que rechaza H_0 para valores grandes, para las hipótesis previamente definidas. Si*

$$T_n \xrightarrow{p} \mu(F) = \begin{cases} \mu_0 & \forall F \in \Omega_0 \\ > \mu_0 & \forall F \in \Omega_c \end{cases}$$

y además existe σ_0 tal que

$$\sqrt{n} \frac{T_n - \mu_0}{\sigma_0} \xrightarrow{D} N(0, 1) \quad \forall F \in \Omega_0$$

entonces existe una sucesión de valores k_n tal que la sucesión de tests $\Phi_n = \mathbb{I}(T_n \geq k_n)$ es consistente para la clase Ω_c .