

# Análisis convexo, desigualdades variacionales y métodos numéricos

Franz Chouly

En Construcción (6 de septiembre de 2026)



# Tabla de contenido

---

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Agradecimientos</b>                                 | <b>9</b>  |
| <b>1. Introducción</b>                                 | <b>11</b> |
| <b>2. Descenso de gradiente</b>                        | <b>13</b> |
| 2.1. Aplicaciones . . . . .                            | 13        |
| 2.1.1. Aprendizaje automático . . . . .                | 13        |
| 2.1.2. Optimización de forma . . . . .                 | 14        |
| 2.2. Gradiente a paso constante . . . . .              | 14        |
| 2.2.1. Definición . . . . .                            | 15        |
| 2.2.2. Python . . . . .                                | 15        |
| 2.2.3. Análisis . . . . .                              | 16        |
| 2.3. Otros métodos de minimización . . . . .           | 18        |
| 2.3.1. Gradiente a paso variable . . . . .             | 18        |
| 2.3.2. Método del gradiente conjugado . . . . .        | 18        |
| 2.3.3. Método BiCG . . . . .                           | 18        |
| 2.4. Para profundizar . . . . .                        | 19        |
| <b>3. Funciones convexas</b>                           | <b>21</b> |
| 3.1. Contexto . . . . .                                | 21        |
| 3.1.1. Definiciones . . . . .                          | 21        |
| 3.1.2. Algunos ejemplos . . . . .                      | 22        |
| 3.1.3. Existencia de sucesiones minimizantes . . . . . | 23        |
| 3.1.4. Existencia de mínimos globales . . . . .        | 23        |
| 3.1.5. Aplicación . . . . .                            | 24        |
| 3.2. Conjuntos y funciones convexas . . . . .          | 24        |
| 3.2.1. Definiciones . . . . .                          | 24        |
| 3.2.2. Obstáculo . . . . .                             | 25        |
| 3.2.3. Funciones convexas y mínimos . . . . .          | 27        |
| 3.3. Mínimos con convexidad fuerte . . . . .           | 29        |
| 3.3.1. Resultado general . . . . .                     | 29        |

|           |                                                                    |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.3.2.    | Caso estrictamente convexo . . . . .                               | 34        |
| 3.4.      | Mínimos en el caso convexo . . . . .                               | 36        |
| 3.4.1.    | Un ejemplo . . . . .                                               | 36        |
| 3.4.2.    | Espacio de Hilbert separable . . . . .                             | 37        |
| 3.4.3.    | Convergencia débil . . . . .                                       | 38        |
| 3.4.4.    | Propiedades de la convergencia débil . . . . .                     | 41        |
| 3.4.5.    | Compacidad para la topología débil . . . . .                       | 43        |
| 3.4.6.    | Convexos cerrados . . . . .                                        | 46        |
| 3.5.      | Convexidad con diferencial . . . . .                               | 48        |
| 3.6.      | Para profundizar . . . . .                                         | 49        |
| <b>4.</b> | <b>Newton semi-suave</b>                                           | <b>51</b> |
| 4.1.      | Unos ejemplos . . . . .                                            | 51        |
| 4.1.1.    | Un primer ejemplo . . . . .                                        | 51        |
| 4.1.2.    | Un otro ejemplo . . . . .                                          | 53        |
| 4.2.      | Dominios de funciones convexas . . . . .                           | 54        |
| 4.2.1.    | Subdiferencial de funciones convexas . . . . .                     | 56        |
| 4.2.2.    | Caracterización de mínimos . . . . .                               | 58        |
| 4.3.      | Newton semi-suave . . . . .                                        | 60        |
| 4.4.      | Restricciones . . . . .                                            | 60        |
| 4.4.1.    | Penalización . . . . .                                             | 60        |
| 4.4.2.    | Lagrangiano . . . . .                                              | 60        |
| 4.4.3.    | Lagrangiano aumentado . . . . .                                    | 60        |
| <b>5.</b> | <b>Desigualdades variacionales</b>                                 | <b>61</b> |
| 5.1.      | Ejemplos . . . . .                                                 | 61        |
| 5.1.1.    | Problema de Signorini (contacto unilateral sin fricción) . . . . . | 61        |
| 5.1.2.    | Problema de torsión (Saint-Venant) . . . . .                       | 62        |
| 5.1.3.    | Problema de Tresca (fricción) . . . . .                            | 62        |
| 5.1.4.    | Problema de Bingham (fluido visco-plástico) . . . . .              | 63        |
| 5.1.5.    | Formulación con forma bilineal no simétrica . . . . .              | 63        |
| 5.2.      | Teoría general . . . . .                                           | 64        |
| 5.2.1.    | Teorema de Stampacchia . . . . .                                   | 64        |
| 5.2.2.    | Teorema de Lions-Stampacchia . . . . .                             | 64        |
| 5.3.      | Galerkin y elementos finitos . . . . .                             | 64        |
| 5.3.1.    | Penalización . . . . .                                             | 64        |

|           |                                                   |           |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|
| 5.3.2.    | Nitsche y Lagrangiano . . . . .                   | 65        |
| 5.3.3.    | Newton semi-suave . . . . .                       | 65        |
| 5.3.4.    | Implementación en scikit-fem . . . . .            | 65        |
| 5.3.5.    | Comentarios adicionales . . . . .                 | 66        |
| <b>6.</b> | <b>Dualidad</b>                                   | <b>67</b> |
| 6.1.      | Preliminares y notación . . . . .                 | 67        |
| 6.2.      | La función conjugada de Fenchel . . . . .         | 67        |
| 6.3.      | Ejemplos en una dimensión . . . . .               | 68        |
| 6.4.      | Propiedades principales . . . . .                 | 69        |
| 6.5.      | La dualidad de Fenchel–Rockafellar . . . . .      | 70        |
| 6.6.      | Del conjugado al Lagrangiano . . . . .            | 71        |
| 6.7.      | Lagrangiano aumentado . . . . .                   | 73        |
| 6.8.      | Nota contextual e histórica . . . . .             | 74        |
| <b>7.</b> | <b>Perspectivas</b>                               | <b>77</b> |
| 7.1.      | Optimización matemática . . . . .                 | 77        |
| 7.2.      | Control y sistemas dinámicos . . . . .            | 77        |
| 7.3.      | Aprendizaje automático . . . . .                  | 78        |
| 7.4.      | Economía y finanzas . . . . .                     | 78        |
| 7.5.      | Teoría de juegos . . . . .                        | 78        |
| 7.6.      | Geometría y computación . . . . .                 | 78        |
| 7.7.      | Procesamiento de señales e imágenes . . . . .     | 79        |
| 7.8.      | Teoría de la información . . . . .                | 79        |
| 7.9.      | Mecanica e fisica no lineal y no suave . . . . .  | 79        |
| 7.10.     | Optimizacion de forma . . . . .                   | 79        |
| <b>A.</b> | <b>Lema de Baire</b>                              | <b>81</b> |
| <b>B.</b> | <b>Newton and Clarke</b>                          | <b>85</b> |
| B.1.      | Motivación y contexto . . . . .                   | 85        |
| B.2.      | Elementos de análisis no diferenciable . . . . .  | 86        |
| B.3.      | El algoritmo de Newton semi-suave . . . . .       | 86        |
| B.4.      | Ejemplo en dimensión uno . . . . .                | 88        |
| B.5.      | Desigualdades variacionales penalizadas . . . . . | 89        |
| B.5.1.    | Formulación general . . . . .                     | 89        |
| B.5.2.    | Ejemplo en dimensión finita . . . . .             | 90        |

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| B.5.3. Ejemplo en dimensión infinita . . . . .                   | 90         |
| B.6. Origen histórico . . . . .                                  | 92         |
| B.7. Convergencia: cuadro resumen . . . . .                      | 93         |
| B.8. Nota final: por qué importa . . . . .                       | 94         |
| <b>C. Newton convexo</b>                                         | <b>97</b>  |
| C.1. ¿Por qué la subdiferencial de Clarke y no la clásica? . . . | 97         |
| C.1.1. La subdiferencial clásica exige convexidad . . . .        | 97         |
| C.1.2. En el caso convexo, Clarke y Rockafellar coinciden        | 97         |
| C.1.3. El problema aparece con funciones no convexas .           | 98         |
| C.1.4. Comparación de las tres subdiferenciales . . . . .        | 99         |
| C.1.5. Síntesis . . . . .                                        | 99         |
| C.2. Adaptación del Newton semi-suave al caso convexo . . .      | 99         |
| C.2.1. Marco de trabajo . . . . .                                | 100        |
| C.2.2. El algoritmo en el caso convexo . . . . .                 | 100        |
| C.2.3. Convergencia en el caso convexo . . . . .                 | 101        |
| C.2.4. Ventajas estructurales del caso convexo . . . . .         | 101        |
| C.2.5. Ejemplo: problema del obstáculo como caso convexo         | 102        |
| C.3. Referencia canónica para el caso convexo . . . . .          | 103        |
| C.3.1. Lectura recomendada . . . . .                             | 104        |
| C.4. Resumen ejecutivo . . . . .                                 | 105        |
| <b>D. Más sobre conjuntos convexos</b>                           | <b>107</b> |
| D.1. Definición y propiedades . . . . .                          | 108        |
| D.1.1. Para empezar . . . . .                                    | 108        |
| D.1.2. Interior y clausura de un conjunto convexo . . . .        | 109        |
| D.2. Conos convexos . . . . .                                    | 110        |
| D.2.1. Definición . . . . .                                      | 110        |
| D.2.2. Ejemplos . . . . .                                        | 111        |
| D.2.3. Propiedades principales . . . . .                         | 112        |
| D.3. Envoltura convexa . . . . .                                 | 112        |
| D.3.1. Caracterización . . . . .                                 | 112        |
| D.3.2. Técnicas para calcular la envoltura convexa . . .         | 113        |
| D.3.3. Algoritmo de Graham Scan . . . . .                        | 114        |
| D.3.4. Algoritmo QuickHull . . . . .                             | 117        |
| D.3.5. Aplicaciones . . . . .                                    | 119        |
| D.4. Separación de convexos . . . . .                            | 119        |

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| D.5. Para profundizar . . . . .                          | 119        |
| <b>E. Funciones convexas en dimensión finita</b>         | <b>121</b> |
| E.1. Caso general . . . . .                              | 121        |
| E.1.1. Definición, ejemplos y propiedades . . . . .      | 121        |
| E.1.2. Propiedades de continuidad . . . . .              | 125        |
| E.1.3. Subdiferencial de funciones convexas . . . . .    | 127        |
| E.1.4. Caracterización de mínimos . . . . .              | 129        |
| E.2. Existencia de mínimo . . . . .                      | 131        |
| E.3. Caso diferenciable . . . . .                        | 131        |
| <b>F. Más métodos</b>                                    | <b>133</b> |
| F.1. Método de penalización . . . . .                    | 133        |
| F.2. Método de Lagrange . . . . .                        | 133        |
| F.3. Método de Lagrange aumentado . . . . .              | 133        |
| F.3.1. Definición . . . . .                              | 133        |
| F.3.2. Algoritmo . . . . .                               | 134        |
| F.3.3. Ejemplo . . . . .                                 | 135        |
| F.4. Métodos cuasi-Newton (BFGS) . . . . .               | 135        |
| <b>G. Medida y análisis funcional</b>                    | <b>137</b> |
| G.1. Medida . . . . .                                    | 137        |
| G.2. Medida y funciones . . . . .                        | 138        |
| G.2.1. Funciones BV . . . . .                            | 138        |
| G.2.2. Continuidad absoluta . . . . .                    | 138        |
| G.2.3. Teorema de aproximación de Lebesgue . . . . .     | 139        |
| G.2.4. Teorema de Lebesgue . . . . .                     | 139        |
| G.2.5. Teorema de Rademacher . . . . .                   | 140        |
| G.2.6. Resumen de Relaciones entre Propiedades . . . . . | 140        |
| G.3. Hahn–Banach . . . . .                               | 140        |
| G.4. Espacios de Hilbert . . . . .                       | 141        |
| G.5. Espacios de Lebesgue . . . . .                      | 141        |
| G.6. Derivada débil . . . . .                            | 142        |
| G.7. Espacios de Sobolev . . . . .                       | 142        |
| G.8. Ejemplos . . . . .                                  | 142        |
| G.8.1. Generales . . . . .                               | 142        |
| G.8.2. Indicador . . . . .                               | 143        |

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| G.9. Más espacios funcionales . . . . .                              | 144        |
| G.9.1. Espacios de Sobolev $H^s(\mathbb{R})$ . . . . .               | 144        |
| G.9.2. Espacios de Besov $\mathcal{B}_{p,q}^s(\mathbb{R})$ . . . . . | 145        |
| G.9.3. Exponente de Hölder . . . . .                                 | 145        |
| G.10. Fractales . . . . .                                            | 145        |
| G.10.1. Función de Weierstrass . . . . .                             | 145        |
| G.10.2. Función de Takagi . . . . .                                  | 146        |
| G.10.3. Movimiento browniano fraccionario . . . . .                  | 146        |
| G.10.4. Conjunto de Cantor . . . . .                                 | 147        |
| G.10.5. Función de Cantor-Lebesgue . . . . .                         | 147        |
| G.11. Ecuaciones elípticas . . . . .                                 | 147        |
| <b>H. Ejemplos para minimizar con descenso de gradiente</b>          | <b>149</b> |
| H.1. Ridge . . . . .                                                 | 149        |
| H.1.1. Contexto . . . . .                                            | 149        |
| H.1.2. Funcional . . . . .                                           | 149        |
| H.1.3. Propiedades . . . . .                                         | 150        |
| H.1.4. Ejemplo . . . . .                                             | 150        |
| H.2. Energía potencial de un sistema de resortes . . . . .           | 150        |
| H.2.1. Contexto . . . . .                                            | 150        |
| H.2.2. Funcional . . . . .                                           | 150        |
| H.2.3. Propiedades . . . . .                                         | 150        |
| H.2.4. Ejemplo . . . . .                                             | 151        |
| H.3. Optimización de forma . . . . .                                 | 151        |
| H.3.1. Contexto . . . . .                                            | 151        |
| H.3.2. Funcional . . . . .                                           | 151        |
| H.3.3. Penalización . . . . .                                        | 151        |
| H.3.4. Ejemplo . . . . .                                             | 151        |
| H.4. Aprendizaje automático . . . . .                                | 152        |
| H.4.1. Contexto . . . . .                                            | 152        |
| H.4.2. Funcional . . . . .                                           | 152        |
| H.4.3. Propiedades . . . . .                                         | 152        |
| H.4.4. Ejemplo . . . . .                                             | 152        |
| <b>Referencias bibliográficas</b>                                    | <b>153</b> |

# Agradecimientos

---

Agradezco al Centro de Matemática, a la Facultad de Ciencias, a PEDECIBA Matemática y al IRL CNRS 2030 IFUMI. También por sus consejos y apoyo: Dominique Attali, Juan Pablo Borthagaray, Federico Correa, Lucas Curci, Françoise Dal'Bo, Jean-Baptiste Hiriart Urruty, Sofía Llavayol, Mauricio Velasco.



# Capítulo 1

## Introducción

---

El análisis convexo es una rama fundamental de las matemáticas que estudia funciones y conjuntos convexos, ofreciendo herramientas teóricas y prácticas para resolver problemas complejos en ciencia, ingeniería y economía. Este libro aborda desde los fundamentos matemáticos del análisis convexo hasta sus aplicaciones más avanzadas, incluyendo desigualdades variacionales, optimización convexa, aprendizaje automático e inteligencia artificial, geometría algorítmica y teoría de juegos.

Se presentan las definiciones y propiedades esenciales de conjuntos y funciones convexas, junto con conceptos clave como el subgradiente, la cáscara convexa y la dualidad. Estos fundamentos son la base para entender algoritmos de optimización y técnicas numéricas que se desarrollan en varios capítulos.

Para el desarrollo de este trabajo, nos apoyaremos fundamentalmente en las obras de G. Allaire [1], de S. Boyd and L. Vandenberghe [5], de H. Brezis [7], de R. Glowinski [14], de J.-B. Hiriart-Urruty and C. Lemaréchal [18] y de D. G. Luenberger [22]. A partir de ahora, utilizaremos la notación  $V$  para designar un espacio de Hilbert (espacio vectorial normado completo). Notaremos  $(\cdot, \cdot)_V$  el producto interno de  $V$  y  $\|\cdot\|_V$  la norma asociada. Cuando  $V$  sea de dimensión finita, y cuando se precisa, lo denotaremos por  $V_n$ , donde  $n$  indica la dimensión de  $V$ .



# Capítulo 2

## Descenso de gradiente

---

El descenso de gradiente es un algoritmo iterativo de optimización de primer orden utilizado para minimizar funciones. Su idea central es moverse en la dirección opuesta al gradiente de la función en el punto actual, lo que garantiza una disminución local del valor de la función. Este método es ampliamente aplicado en aprendizaje automático y optimización numérica debido a su simplicidad y eficacia. La elección del tamaño de paso, o tasa de aprendizaje, es crucial para la convergencia del algoritmo. Sin embargo, su rendimiento puede verse afectado por la elección de parámetros y la geometría de la función. Seguimos [1].

### 2.1. Aplicaciones

Antes de describir el algoritmo y hacer su análisis, presentemos ya algunas aplicaciones donde es relevante.

#### 2.1.1. Aprendizaje automático

En aprendizaje automático, la regresión Ridge busca minimizar el error cuadrático entre las predicciones de un modelo lineal y los datos reales, añadiendo un término de regularización para evitar el sobreajuste.

Dada una matriz de datos  $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times d}$ , un vector de etiquetas  $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ , y un vector de pesos  $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^d$ , la funcional a minimizar es:

$$\mathcal{J}(\mathbf{w}) := \frac{1}{2n} \|\mathbf{X}\mathbf{w} - \mathbf{y}\|_V^2 + \varepsilon \|\mathbf{w}\|_V^2$$

donde  $\varepsilon > 0$  es el parámetro de regularización, y

$$\|\mathbf{y}\|_V^2 := y_1^2 + \cdots + y_n^2, \quad \|\mathbf{w}\|_V^2 := w_1^2 + \cdots + w_d^2.$$

Aquí tenemos  $V = V_d = \mathbb{R}^d$ , con la norma Euclidiana.

### 2.1.2. Optimización de forma

Ahora presentamos un problema simplificado de optimización de forma. Se buscan las coordenadas de los vértices de un triángulo que maximice su área, sujetas a una restricción de perímetro fijo. Para un triángulo con vértices

$$\mathbf{p}_1 = (x_1, y_1), \quad \mathbf{p}_2 = (x_2, y_2), \quad \mathbf{p}_3 = (x_3, y_3),$$

y un perímetro  $\mathcal{P}$  fijo:

- **Área** (a maximizar):

$$\mathcal{A}(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3) := \frac{1}{2} |(\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1) \times (\mathbf{p}_3 - \mathbf{p}_1)|,$$

donde  $\times$  es el producto vectorial en dos dimensiones.

- **Restricción:**

$$\mathcal{R}(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3) = 0$$

con

$$\mathcal{R}(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3) = \|\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1\|_{\mathbb{R}^2} + \|\mathbf{p}_3 - \mathbf{p}_2\|_{\mathbb{R}^2} + \|\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_3\|_{\mathbb{R}^2} - \mathcal{P}.$$

Para transformar el problema restringido en uno no restringido, se usa, por ejemplo:

$$\mathcal{J}(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3) = -\mathcal{A}(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3) + \frac{1}{\varepsilon} (\mathcal{R}(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3))^2$$

a minimizar en  $V_6 = \mathbb{R}^6$ , y donde  $\varepsilon > 0$  es un parámetro de penalización.

## 2.2. Gradiente a paso constante

Sea  $V = V_n = \mathbb{R}^n$  y

$$\mathcal{J} : V \rightarrow \mathbb{R}$$

una función  $\mathcal{C}^1(V; \mathbb{R})$ . Notamos  $\nabla \mathcal{J}$  su gradiente:

$$\nabla \mathcal{J} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n.$$

El objetivo es encontrar un mínimo de esta función.

### 2.2.1. Definición

El método de descenso de gradiente a paso constante se define como:

$$x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla \mathcal{J}(x_k) \quad (2.1)$$

con  $k \geq 0$ , a partir de  $x_0 \in V$  y donde:

- $x_k$  es la posición actual en la iteración  $k$ ,
- $\alpha$  es el tamaño del paso (constante),
- $\nabla \mathcal{J}(x_k)$  es el gradiente de la función  $\mathcal{J}$  evaluado en  $x_k$ .

### 2.2.2. Python

```
1 import numpy as np
2
3 def J(x):
4     return x*2 + 2*x + 1
5
6 def dJ(x):
7     return 2*x + 2
8
9 def gradient_descent(alpha, x0, max_iter=1000):
10     x = x0
11     for _ in range(max_iter):
12         grad = dJ(x)
13         x = x - alpha * grad
14     return x
15
16 # Ejemplo de uso
17
18 alpha = 0.1
19 x0 = 5.0
20 x_min = gradient_descent(alpha, x0)
21 print(f"Mínimo encontrado en x = {x_min:.4f}")
```

Listado 2.1: Gradiente a paso constante.

### 2.2.3. Análisis

Supongamos, para simplificar, que  $\mathcal{J}$  cumple las siguientes condiciones:

1. Existe un único mínimo estricto global de  $\mathcal{J}$ .
2.  $\mathcal{J}$  es de clase  $\mathcal{C}^2(V; \mathbb{R})$  (continuamente diferenciable en  $V$ ).
3. Existe una constante  $c_{\mathcal{J}} > 0$  tal que, para todo  $x, y \in V$ :

$$(\nabla \mathcal{J}(x) - \nabla \mathcal{J}(y), x - y)_V \geq c_{\mathcal{J}} \|x - y\|_V^2. \quad (2.2)$$

De hecho, veremos luego que 2 y 3 implican 1. Entonces, tenemos lo siguiente:

**Teorema 1.** *Sea  $\mathcal{J} : V \rightarrow \mathbb{R}$  una función de clase que cumple con las condiciones 1, 2 y 3 anteriores. Sea  $x^*$  el único mínimo estricto global de  $\mathcal{J}$ . Entonces, si  $\alpha > 0$  es suficientemente pequeño, el método de gradiente descendente:*

$$x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla \mathcal{J}(x_k),$$

*converge hacia  $x^*$ .*

*Demostración.* Sea  $x_0 \in V$  y  $B_0 \subset V$  una bola cerrada y acotada que contiene  $x^*$  y  $x_0$ , centrada en  $x^*$ . Supongamos  $x_k \in B_0$ . Ahora, consideremos la iteración del gradiente descendente:

$$x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla \mathcal{J}(x_k).$$

Queremos analizar  $\|x_{k+1} - x^*\|^2$ . Desarrollamos:

$$\|x_{k+1} - x^*\|_V^2 = \|x_k - \alpha \nabla \mathcal{J}(x_k) - x^*\|_V^2$$

y luego

$$\|x_{k+1} - x^*\|_V^2 = \|x_k - x^*\|_V^2 - 2\alpha(x_k - x^*, \nabla \mathcal{J}(x_k))_V + \alpha^2 \|\nabla \mathcal{J}(x_k)\|_V^2.$$

Veamos primero:

$$(x_k - x^*, \nabla \mathcal{J}(x_k))_V = (x_k - x^*, \nabla \mathcal{J}(x_k) - \nabla \mathcal{J}(x^*))_V \geq c_{\mathcal{J}} \|x_{k+1} - x^*\|_V^2.$$

Hemos utilizado  $\nabla \mathcal{J}(x^*) = 0$  y (2.2). Esto implica

$$-2\alpha(x_k - x^*, \nabla \mathcal{J}(x_k))_V \leq -2\alpha c_{\mathcal{J}} \|x_{k+1} - x^*\|_V^2.$$

Además, como  $\mathcal{J}$  es de clase  $\mathcal{C}^2(B; \mathbb{R}^d)$ , en  $B_0$ , acotada y cerrada, entonces  $\nabla \mathcal{J}$  es Lipschitz en  $B_0$ . Existe  $L > 0$  tal que:

$$\|\nabla J(x_k)\|_V \leq L \|x_k - x^*\|_V.$$

Por lo tanto:

$$\alpha^2 \|\nabla J(x_k)\|_V^2 \leq \alpha^2 L^2 \|x_k - x^*\|_V^2.$$

Sustituyendo todo en la desigualdad:

$$\|x_{k+1} - x^*\|_V^2 \leq \|x_k - x^*\|_V^2 - 2\alpha c_{\mathcal{J}} \|x_k - x^*\|_V^2 + \alpha^2 L^2 \|x_k - x^*\|_V^2.$$

Simplificando:

$$\|x_{k+1} - x^*\|_V^2 \leq (1 - 2\alpha c_{\mathcal{J}} + \alpha^2 L^2) \|x_k - x^*\|_V^2.$$

Elegimos  $\alpha$  tal que:

$$1 - 2\alpha c_{\mathcal{J}} + \alpha^2 L^2 < 1.$$

Esto se cumple si:

$$-2\alpha c_{\mathcal{J}} + \alpha^2 L^2 < 0 \quad \Rightarrow \quad 2\alpha c_{\mathcal{J}} > \alpha^2 L^2.$$

La desigualdad se satisface si:

$$\alpha < \frac{2c_{\mathcal{J}}}{L^2}.$$

Por lo tanto, para  $\alpha$  suficientemente pequeño, existe  $\rho \in (0, 1)$  tal que:

$$\|x_{k+1} - x^*\|_V^2 \leq \rho \|x_k - x^*\|_V^2.$$

Verificamos que  $x_{k+1}$  queda en  $B_0$ . Esto implica que la secuencia  $\{x_k\}$  converge linealmente hacia  $x^*$ .  $\square$

## 2.3. Otros métodos de minimización

Mencionamos brevemente otros métodos de minimización que se basan únicamente en el cálculo del gradiente, como el *método del gradiente con paso variable* y el *método del gradiente conjugado*. Para más detalles, referirse a [1, 12].

### 2.3.1. Gradiente a paso variable

En el método de *descenso de gradiente a paso variable*, el tamaño del paso  $\alpha_k$  puede cambiar en cada iteración. Una estrategia común es usar una *búsqueda de línea* (line search) para elegir  $\alpha_k$  que minimice  $\mathcal{J}(x_k - \alpha_k \nabla \mathcal{J}(x_k))$ . La actualización se escribe como:

$$x_{k+1} = x_k - \alpha_k \nabla \mathcal{J}(x_k).$$

### 2.3.2. Método del gradiente conjugado

En el método del *gradiente conjugado*, se optimiza la minimización de funciones cuadráticas de la forma  $\mathcal{J}(x) = \frac{1}{2}x^T A x - \mathbf{b}^T x + c$ , donde  $A$  es una matriz simétrica y definida positiva. Este método acelera la convergencia del descenso de gradiente al utilizar direcciones conjugadas con respecto a  $A$ . La actualización se escribe como:

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k d_k,$$

donde  $d_k$  es la dirección conjugada y  $\alpha_k$  se elige mediante una búsqueda de línea o fórmula analítica [2, 12].

### 2.3.3. Método BiCG

El método *BiCG* (Biconjugate Gradient) está adaptado para resolver sistemas lineales no simétricos de la forma  $Ax = b$  [12, S. 11.7.8], donde  $A$  es una matriz cuadrada no necesariamente simétrica. Es una extensión del gradiente conjugado para matrices no simétricas. La actualización se basa en residuos biconjugados y se escribe como:

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k,$$

donde  $p_k$  es la dirección de búsqueda y  $\alpha_k$  se calcula para minimizar el error en un subespacio de Krylov.

## 2.4. Para profundizar

Para un análisis más detallado sobre los métodos de descenso de gradiente y sus variantes, se puede consultar [12, Capítulo 11] y [1, Capítulos 9–10].



# Capítulo 3

## Funciones convexas

---

Las funciones convexas juegan un papel fundamental en optimización, ya que garantizan que cualquier mínimo local es también un mínimo global. Una función  $\mathcal{J} : V \rightarrow \mathbb{R}$  es convexa si el segmento de línea que une cualquier par de puntos en su gráfico siempre queda por encima del gráfico. Esta propiedad simplifica significativamente el análisis y la resolución de problemas de optimización. Además, las funciones convexas tienen derivadas monótonas, lo que facilita la aplicación de métodos numéricos. Su estudio es esencial para entender la eficiencia de algoritmos como el descenso de gradiente.

### 3.1. Contexto

Consideramos el problema de minimización de una función objetivo  $\mathcal{J}$  sobre un conjunto  $K \subseteq V$ , donde  $V$  es un espacio de Hilbert. El objetivo es encontrar el **ínfimo** de  $J$  en  $K$  y, en caso de existir, un punto donde este ínfimo se alcance. El problema se formula como:

$$\inf_K \mathcal{J}. \quad (3.1)$$

#### 3.1.1. Definiciones

**Definición 1** (Ínfimo). *Dado un conjunto  $K \subseteq V$  y una función  $\mathcal{J} : K \rightarrow \mathbb{R}$ , el ínfimo de  $J$  sobre  $K$  se define como:*

$$\inf_{v \in K} \mathcal{J}(v) = \inf\{\mathcal{J}(v) \mid v \in K\}.$$

*Es el mayor de las cotas inferiores de  $\mathcal{J}$  en  $K$ . No necesariamente existe un punto  $v \in K$  tal que  $\mathcal{J}(v) = \inf_{v \in K} \mathcal{J}(v)$ .*

**Definición 2** (Punto de mínimo local). *Un punto  $u^* \in K$  es un mínimo local de  $\mathcal{J}$  en  $K$  si existe  $\delta > 0$  tal que:*

$$\mathcal{J}(u^*) \leq \mathcal{J}(v) \quad \forall v \in K \text{ con } \|v - u^*\| < \delta.$$

**Definición 3** (Punto de mínimo global). *Un punto  $u^* \in K$  es un mínimo global de  $\mathcal{J}$  en  $K$  si:*

$$\mathcal{J}(u^*) \leq \mathcal{J}(v) \quad \forall v \in K.$$

**Definición 4** (Sucesión minimizante). *Una sucesión  $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq K$  se dice **minimizante** para  $\mathcal{J}$  si:*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{J}(u_n) = \inf_{u \in K} \mathcal{J}(u).$$

### 3.1.2. Algunos ejemplos

**Ejemplo 1.** *Consideremos  $V = \mathbb{R}$ ,  $K = \mathbb{R}$ , y  $\mathcal{J}(v) = v^2$ .*

*Entonces:*

$$\inf_{v \in \mathbb{R}} \mathcal{J}(v) = 0,$$

*y el mínimo global se alcanza en  $u^* = 0$ . La sucesión  $u_n = 1/n$  es minimizante, ya que:*

$$\mathcal{J}(u_n) = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \rightarrow 0 = \inf_{v \in \mathbb{R}} \mathcal{J}(v).$$

**Ejemplo 2.** *Sea  $K = [0, +\infty)$  y  $\mathcal{J}(v) = e^{-v}$ .*

*Entonces:*

$$\inf_{v \in K} \mathcal{J}(v) = 0,$$

*pero no existe  $u^* \in K$  tal que  $\mathcal{J}(u^*) = 0$ . Sin embargo, la sucesión  $u_n = n$  es minimizante, pues:*

$$\mathcal{J}(u_n) = e^{-n} \rightarrow 0.$$

### 3.1.3. Existencia de sucesiones minimizantes

La proposición siguiente se establece directamente a partir de la definición del ínfimo.

**Proposición 1.** *Para cualquier función  $\mathcal{J} : K \rightarrow \mathbb{R}$ , siempre existe una sucesión minimizante  $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq K$  tal que:*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{J}(u_n) = \inf_{v \in K} \mathcal{J}(v).$$

### 3.1.4. Existencia de mínimos globales

Retomamos este resultado general y simple de [1].

**Teorema 2.** *Sea  $V$  un espacio vectorial normado de dimensión finita,  $K \subseteq V$  un conjunto cerrado y no vacío, y  $\mathcal{J} : K \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua sobre  $K$ . Supongamos además que:*

$$\text{Si } \{u_n\} \subseteq K \text{ es tal que } \|u_n\| \rightarrow +\infty, \text{ entonces } \mathcal{J}(u_n) \rightarrow +\infty. \quad (3.2)$$

*Entonces, la función  $\mathcal{J}$  : admite al menos un punto de mínimo global en  $K$ .*

*Demostración.* Es un baile en cinco pasos.

*Paso 1. Existencia del ínfimo.* Como  $\mathcal{J}$  está acotada inferiormente (por continuidad y por la condición (3.2)), existe:

$$m = \inf_{v \in K} \mathcal{J}(v) \in \mathbb{R}.$$

*Paso 2. Existencia de una sucesión minimizante.* Por la Proposición anterior, para todo  $n \in \mathbb{N}$ , existe  $u_n \in K$  tal que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{J}(u_n) = m.$$

*Paso 3. Acotación de la sucesión minimizante.* Supongamos que  $\{u_n\}$  no estuviera acotada en  $V$ . Entonces, existiría una subsucesión  $\{u_{n_k}\}$  tal que  $\|u_{n_k}\|_V \rightarrow +\infty$ . Por hipótesis (3.2), esto implicaría que:

$$\mathcal{J}(u_{n_k}) \rightarrow +\infty,$$

lo cual contradice que  $\mathcal{J}(u_{n_k}) \rightarrow m$ . Por lo tanto,  $\{u_n\}$  está acotada en  $V$ .

*Paso 4. Compacidad en dimensión finita.* En un espacio de dimensión finita, toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente. Sea  $\{u_{n_k}\}$  una subsucesión de  $\{u_n\}$  tal que  $u_{n_k} \rightarrow u^* \in V$ . Como  $K$  es cerrado,  $u^* \in K$ .

*Paso 5. Continuidad de  $\mathcal{J}$ .* Por la continuidad de  $\mathcal{J}$ , se tiene:  $\mathcal{J}(u^*) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mathcal{J}(u_{n_k}) = m$ . Por lo tanto,  $u^*$  es un punto de mínimo global de  $\mathcal{J}$  en  $K$ .  $\square$

### 3.1.5. Aplicación

Volvemos a 2.1.1 y a la regresión Ridge, con funcional:

$$\mathcal{J}(\mathbf{w}) = \frac{1}{2n} \|\mathbf{X}\mathbf{w} - \mathbf{y}\|_V^2 + \varepsilon \|\mathbf{w}\|_V^2$$

Veamos que  $K (= V = \mathbb{R}^d)$  y  $\mathcal{J}$  cumplen con las condiciones del teorema anterior, y entonces  $\mathcal{J}$  admite por lo menos un punto de mínimo global en  $V$ .

**Observación 1.** *El teorema anterior no se extiende en dimensión infinita [1]. Tampoco asegura unicidad. Esto motiva la introducción de los siguientes conceptos.*

## 3.2. Conjuntos y funciones convexas

### 3.2.1. Definiciones

**Definición 5.** *Un conjunto  $K \subset V$  es convexo si para todo  $v, w \in K$  y todo  $\lambda \in [0, 1]$ , se cumple:*

$$\lambda v + (1 - \lambda)w \in K. \quad (3.3)$$

**Definición 6.** *Una función  $\mathcal{J} : V \rightarrow \mathbb{R}$  es convexa si para todo  $v, w \in V$  y todo  $\lambda \in [0, 1]$ , se cumple:*

$$\mathcal{J}(\lambda v + (1 - \lambda)w) \leq \lambda \mathcal{J}(v) + (1 - \lambda) \mathcal{J}(w). \quad (3.4)$$

Es convexa estricta si cumple (3.4) y, si, además,

$$\mathcal{J}(\lambda v + (1-\lambda)w) = \lambda \mathcal{J}(v) + (1-\lambda)\mathcal{J}(w) \text{ implica } (\lambda \in \{0,1\}) \text{ o } (v = w). \quad (3.5)$$

**Definición 7.** Una función  $\mathcal{J} : V \rightarrow \mathbb{R}$  es convexa fuerte, si existe  $c_{\mathcal{J}} > 0$  tal que para todo  $v, w \in V$ , se cumple:

$$\mathcal{J}\left(\frac{1}{2}v + \frac{1}{2}w\right) \leq \frac{1}{2}(\mathcal{J}(v) + \mathcal{J}(w)) - \frac{c_{\mathcal{J}}}{8}\|v - w\|_V^2. \quad (3.6)$$

**Ejemplo 3.** Sea  $V = L^2([0,1])$  el espacio de Hilbert de funciones cuadrado-integrables en  $[0,1]$ . La función

$$\mathcal{J}(v) := \int_0^1 |v(x)|^2 dx$$

es fuertemente convexa en  $V$ .

### 3.2.2. Obstáculo

Recordamos aquí la formulación del problema de obstáculo, descrito con mayor detalle en, por ejemplo, [17]. Sea  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ , con  $n \geq 1$ , un dominio abierto, acotado, poliedro, simplemente conexo y con frontera de Lipschitz. Sea  $\kappa$  un parámetro físico (por ejemplo, la rigidez de una membrana).

Sea  $V = H_0^1(\Omega)$  el espacio de Sobolev usual [1]. Definimos la forma bilineal:

$$a : H_0^1(\Omega) \times H_0^1(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$$

dada por:

$$a(u, v) := \int_{\Omega} \kappa \nabla u(x) \cdot \nabla v(x) dx, \quad \forall u, v \in H_0^1(\Omega).$$

Asimismo, definimos la forma lineal:

$$L(v) := \int_{\Omega} f v dx, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega),$$

donde  $f \in L^2(\Omega)$  es un término fuente.

Consideramos una función de obstáculo dada  $\Psi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ , que cumple  $\Psi \in H^2(\Omega)$  y  $\Psi \geq 0$  en  $\partial\Omega$ .

El problema de minimización asociado consiste en encontrar  $u \in K$  tal que:  $\min_{v \in K} \mathcal{J}(v)$ , donde  $\mathcal{J}$  es la funcional cuadrática definida como:

$$\mathcal{J}(v) := \frac{1}{2}a(v, v) - L(v),$$

y el conjunto convexo  $K$  se define como:

$$K := \{v \in H_0^1(\Omega) \mid v \geq \Psi \text{ c.p.p. en } \Omega\}.$$

Ahora sea la funcional (general) cuadrática:  $\mathcal{J}(v) = \frac{1}{2}a(v, v) - L(v)$ , donde  $a$  es una forma bilineal elíptica (es decir, existe  $c_J > 0$  tal que  $a(v, v) \geq c_J \|v\|_V^2$  para todo  $v \in V (= H_0^1(\Omega))$ ).

Para demostrar que  $\mathcal{J}$  es fuertemente convexa, verificamos la siguiente desigualdad para todo  $u, v \in H_0^1(\Omega)$ :

$$\mathcal{J}\left(\frac{u+v}{2}\right) + \frac{c_J}{8}\|u-v\|_V^2 \leq \frac{1}{2}\mathcal{J}(u) + \frac{1}{2}\mathcal{J}(v).$$

Desarrollo de  $\mathcal{J}\left(\frac{u+v}{2}\right)$ :

$$\mathcal{J}\left(\frac{u+v}{2}\right) = \frac{1}{2}a\left(\frac{u+v}{2}, \frac{u+v}{2}\right) - L\left(\frac{u+v}{2}\right).$$

Usando la bilinealidad y la simetría de  $a$ :

$$a\left(\frac{u+v}{2}, \frac{u+v}{2}\right) = \frac{1}{4}a(u+v, u+v) = \frac{1}{4}(a(u, u) + 2a(u, v) + a(v, v)).$$

Por lo tanto:

$$\mathcal{J}\left(\frac{u+v}{2}\right) = \frac{1}{8}(a(u, u) + 2a(u, v) + a(v, v)) - \frac{1}{2}L(u+v).$$

Combinación convexa de  $\mathcal{J}(u)$  y  $\mathcal{J}(v)$ :

$$\frac{1}{2}\mathcal{J}(u) + \frac{1}{2}\mathcal{J}(v) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}a(u, u) - L(u)\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}a(v, v) - L(v)\right)$$

y luego

$$\frac{1}{2}\mathcal{J}(u) + \frac{1}{2}\mathcal{J}(v) = \frac{1}{4}(a(u, u) + a(v, v)) - \frac{1}{2}L(u + v).$$

Diferencia entre la combinación convexa y  $\mathcal{J}\left(\frac{u+v}{2}\right)$ :

$$\frac{1}{2}\mathcal{J}(u) + \frac{1}{2}\mathcal{J}(v) - \mathcal{J}\left(\frac{u+v}{2}\right) = \frac{1}{8}(a(u, u) - 2a(u, v) + a(v, v))$$

y

$$\frac{1}{2}\mathcal{J}(u) + \frac{1}{2}\mathcal{J}(v) - \mathcal{J}\left(\frac{u+v}{2}\right) = \frac{1}{8}a(u - v, u - v).$$

Por la elipticidad de  $a$ , sabemos que:

$$a(u - v, u - v) \geq c_J \|u - v\|_V^2.$$

Por lo tanto:

$$\frac{1}{2}\mathcal{J}(u) + \frac{1}{2}\mathcal{J}(v) - \mathcal{J}\left(\frac{u+v}{2}\right) \geq \frac{c_J}{8} \|u - v\|_V^2.$$

Reordenando:

$$\mathcal{J}\left(\frac{u+v}{2}\right) \leq \frac{1}{2}\mathcal{J}(u) + \frac{1}{2}\mathcal{J}(v) - \frac{c_J}{8} \|u - v\|_V^2.$$

La funcional  $\mathcal{J}$  es fuertemente convexa con constante  $c_J$ , ya que cumple:

$$\mathcal{J}\left(\frac{u+v}{2}\right) + \frac{c_J}{8} \|u - v\|_V^2 \leq \frac{1}{2}\mathcal{J}(u) + \frac{1}{2}\mathcal{J}(v).$$

### 3.2.3. Funciones convexas y mínimos

Los siguientes resultados son adaptados de [1].

**Teorema 3.** *Si  $\mathcal{J}$  es convexa, entonces todo mínimo local es un mínimo global. Además, el conjunto de mínimos de  $\mathcal{J}$  es convexo.*

*Demostración.* Sea  $u^*$  un mínimo local de  $\mathcal{J}$ , es decir, existe  $\delta > 0$  tal que:

$$\mathcal{J}(u^*) \leq \mathcal{J}(u) \quad \forall u \in K \text{ con } \|u - u^*\|_V \leq \delta.$$

Queremos demostrar que  $u^*$  es un mínimo global. Sea  $u \in K$  arbitrario. Tomamos

$$0 < t \leq \frac{\delta}{\|u - u^*\|_V}$$

entonces  $\|t(u - u^*)\| \leq \delta$  y

$$\mathcal{J}(u^*) \leq \mathcal{J}((1-t)u^* + tu).$$

Ahora, como  $\mathcal{J}$  es convexa, se tiene:

$$\mathcal{J}(u^*) \leq \mathcal{J}((1-t)u^* + tu) \leq (1-t)\mathcal{J}(u^*) + t\mathcal{J}(u).$$

Despejamos

$$\mathcal{J}(u^*) \leq \mathcal{J}(u).$$

Por lo tanto,  $u^*$  es un mínimo global.

Para demostrar que el conjunto de mínimos es convexo, sean  $u_1, u_2$  dos mínimos globales de  $\mathcal{J}$  y  $t \in [0, 1]$ . Entonces:

$$\mathcal{J}(tu_1 + (1-t)u_2) \leq t\mathcal{J}(u_1) + (1-t)\mathcal{J}(u_2)$$

y

$$t\mathcal{J}(u_1) + (1-t)\mathcal{J}(u_2) = t \inf_{v \in K} \mathcal{J}(v) + (1-t) \inf_{v \in K} \mathcal{J}(v) = \inf_{v \in K} \mathcal{J}(v).$$

Como  $\inf_{v \in K} \mathcal{J}(v)$  es el valor mínimo, se tiene:

$$\mathcal{J}(tu_1 + (1-t)u_2) = \inf_{v \in K} \mathcal{J}(v),$$

lo que implica que  $tu_1 + (1-t)u_2$  es también un mínimo global. Por lo tanto, el conjunto de mínimos es convexo.  $\square$

**Teorema 4.** *Si  $\mathcal{J}$  es estrictamente convexa, entonces existe a lo sumo un punto mínimo global.*

*Demostración.* Sean  $u_1$  y  $u_2$  tales que:

$$\mathcal{J}(u_1) = \mathcal{J}(u_2) = \inf_{v \in K} \mathcal{J}(v).$$

Como  $\mathcal{J}$  es estrictamente convexa, para todo  $\lambda \in [0, 1]$  se cumple:

$$\mathcal{J}(\lambda u_1 + (1 - \lambda)u_2) \leq \lambda \mathcal{J}(u_1) + (1 - \lambda)\mathcal{J}(u_2)$$

y

$$\lambda \mathcal{J}(u_1) + (1 - \lambda)\mathcal{J}(u_2) = \lambda \inf_{v \in K} \mathcal{J}(v) + (1 - \lambda) \inf_{v \in K} \mathcal{J}(v) = \inf_{v \in K} \mathcal{J}(v).$$

Esto implica que, para cualquier  $0 \leq \lambda \leq 1$ :

$$\mathcal{J}(\lambda u_1 + (1 - \lambda)u_2) = \mathcal{J}(u_1) = \mathcal{J}(u_2) (= \inf_{v \in K} \mathcal{J}(v)),$$

Deducimos de (3.5) que  $u_1 = u_2$ . □

### 3.3. Mínimos con convexidad fuerte

#### 3.3.1. Resultado general

Tenemos lo siguiente [1].

**Teorema 5.** *Sea  $K$  un conjunto no vacío, cerrado y convexo en un espacio de Hilbert  $V$  y sea  $\mathcal{J}$  una función continua y fuertemente convexa en  $V$ . Entonces  $\mathcal{J}$  admite un único minimizador global  $u$  en  $K$ . Además, para todo  $v \in K$ , se cumple:*

$$\|v - u\|_V^2 \leq \frac{4}{c_J} (\mathcal{J}(v) - \mathcal{J}(u)),$$

y toda subsucesión minimizante de  $\mathcal{J}$  converge hacia  $u$ .

*Demostración. Paso 1: Existencia de una sucesión minimizante y acotación.* Dado que  $\mathcal{J}$  está acotada inferiormente, por la Proposición 3, existe  $I = \inf_{v \in K} \mathcal{J}(v) > -\infty$ . Sea  $\{u_n\}$  una sucesión minimizante para  $\mathcal{J}$  en  $K$

(existe por definición del ínfimo y dado que  $K$  es no vacío). Por definición de sucesión minimizante, se tiene

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{J}(u_n) = I.$$

*Paso 2: Uso de la fuerte convexidad.* Aplicamos la propiedad de fuerte convexidad de  $\mathcal{J}$  con constante  $c_J > 0$ . Para  $n, m \in \mathbb{N}$  arbitrarios, se cumple:

$$\mathcal{J}\left(\frac{u_n + u_m}{2}\right) \leq \frac{1}{2}\mathcal{J}(u_n) + \frac{1}{2}\mathcal{J}(u_m) - \frac{c_J}{8}\|u_n - u_m\|_V^2.$$

Restando  $I$  a ambos lados y usando que  $\mathcal{J}\left(\frac{u_n + u_m}{2}\right) \geq I$  (pues  $I$  es el ínfimo), obtenemos:

$$\frac{c_J}{8}\|u_n - u_m\|_V^2 \leq \frac{1}{2}\mathcal{J}(u_n) + \frac{1}{2}\mathcal{J}(u_m) - I.$$

Como  $\mathcal{J}(u_n) \rightarrow I$  y  $\mathcal{J}(u_m) \rightarrow I$ , el lado derecho tiende a cero cuando  $n, m \rightarrow \infty$ . Por lo tanto,  $\{u_n\}$  es una sucesión de Cauchy en  $K$ .

*Paso 3: Convergencia y minimizador global.* Dado que  $K$  es cerrado y  $V$  es completo,  $\{u_n\}$  converge a un elemento  $u \in K$ . Por la continuidad de  $\mathcal{J}$ :

$$\mathcal{J}(u) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{J}(u_n) = I.$$

Así,  $u$  es un minimizador global de  $\mathcal{J}$  en  $K$ .

*Paso 4: Unicidad del minimizador.* Supongamos que existe otro minimizador  $\tilde{u} \in K$ . Aplicando la fuerte convexidad:

$$I = \mathcal{J}(u) \leq \mathcal{J}\left(\frac{u + \tilde{u}}{2}\right) \leq \frac{1}{2}\mathcal{J}(u) + \frac{1}{2}\mathcal{J}(\tilde{u}) - \frac{c_J}{8}\|u - \tilde{u}\|_V^2.$$

Como  $\mathcal{J}(u) = \mathcal{J}(\tilde{u}) = I$ , esto implica:

$$0 \leq -\frac{c_J}{8}\|u - \tilde{u}\|_V^2.$$

Dado que  $c_J > 0$ , se deduce que  $\|u - \tilde{u}\|_V^2 = 0$ , es decir,  $u = \tilde{u}$ . Por lo tanto, el minimizador es único.

*Paso 5: Desigualdad para el minimizador.* Sea  $v \in K$ . Como  $K$  es convexo,  $(u + v)/2 \in K$ . Aplicando la fuerte convexidad:

$$\mathcal{J}\left(\frac{u+v}{2}\right) \leq \frac{1}{2}\mathcal{J}(u) + \frac{1}{2}\mathcal{J}(v) - \frac{c_J}{8}\|u - v\|_V^2.$$

Dado que  $u$  es minimizador,  $\mathcal{J}\left(\frac{u+v}{2}\right) \geq \mathcal{J}(u)$ . Sustituyendo:

$$\mathcal{J}(u) \leq \frac{1}{2}\mathcal{J}(u) + \frac{1}{2}\mathcal{J}(v) - \frac{c_J}{8}\|u - v\|_V^2.$$

Simplificando:

$$\frac{c_J}{8}\|u - v\|_V^2 \leq \frac{1}{2}(\mathcal{J}(v) - \mathcal{J}(u)).$$

Multiplicando por 4:

$$\|u - v\|_V^2 \leq \frac{4}{c_J}(\mathcal{J}(v) - \mathcal{J}(u)).$$

Se deduce finalmente de lo anterior toda subsucesión minimizante de  $\mathcal{J}$  converge hacia  $u$ . Esto concluye la demostración.  $\square$

Aquí el enunciado del Teorema de Hahn-Banach (versión geométrica: separación de un convexo cerrado por un hiperplano) en un espacio de Hilbert, junto con una prueba simplificada que utiliza el teorema de proyección en un convexo cerrado.

**Teorema 6** (Teorema de Hahn-Banach (Separación)). *Sea  $V$  un espacio de Hilbert y  $K \subset V$  un conjunto no vacío, cerrado y convexo. Si*

$$v_0 \in V \setminus K,$$

*entonces existe un hiperplano cerrado que separa estrictamente  $v_0$  de  $K$ . Es decir, existen  $z \in V$  y  $\beta \in \mathbb{R}$  tales que:*

$$(z, v_0)_V < \beta < (z, w)_V, \quad \forall w \in K.$$

*Demostración.* Es una valse en tres pasos.

*Paso 1: Proyección sobre el convexo cerrado.* Dado que  $K$  es cerrado y convexo, por el teorema de proyección en un convexo cerrado, existe un único  $w_0 \in K$  tal que, para todo  $w \in K$ :

$$(v_0 - w_0, w - w_0)_V \leq 0.$$

Este  $w_0$  es la proyección ortogonal de  $v_0$  sobre  $K$ .

*Paso 2: Construcción del hiperplano separador.* Definimos

$$m := \frac{w_0 + v_0}{2}, \quad z := w_0 - m = \frac{w_0 - v_0}{2}.$$

Como  $v_0 \notin K$ ,  $z$  es no nulo. Ahora, consideramos el hiperplano:

$$\mathcal{H} := \{v \in V \mid (z, v)_V = \beta\},$$

donde  $\beta = (z, m)_V$ .

*Paso 3: Separación estricta.* Primero tenemos

$$(z, m - v_0)_V = \frac{1}{4}(w_0 - v_0, w_0 - v_0) > 0$$

y luego

$$(z, v_0) < (z, m)_V = \beta.$$

También para todo  $w \in K$ :

$$(z, w)_V = \frac{1}{2}(w_0 - v_0, w)_V = \frac{1}{2}((w_0 - v_0, w - w_0)_V + (w_0 - v_0, w_0)_V).$$

y como

$$(v_0 - w_0, w - w_0)_V \leq 0,$$

entonces

$$(z, w)_V \geq \frac{1}{2}(w_0 - v_0, w_0)_V.$$

Acotamos ahora

$$(z, w)_V - \beta \geq \frac{1}{2}(w_0 - v_0, w_0)_V - (z, m)_V$$

y luego

$$(z, w)_V - \beta \geq \frac{1}{2}(w_0 - v_0, w_0)_V - \frac{1}{4}(w_0 - v_0, w_0 + v_0)_V.$$

Agrupamos los términos:

$$(z, w)_V - \beta \geq (w_0 - v_0, \frac{1}{2}w_0 - \frac{1}{4}w_0 - \frac{1}{4}v_0)_V > 0.$$

Concluimos:

$$(z, w)_V - \beta \geq \frac{1}{4}(w_0 - v_0, w_0 - v_0)_V > 0.$$

□

**Proposición 2** (Proposición (9.2.5, Allaire)). *Si  $\mathcal{J}$  es convexa y continua sobre un conjunto  $K$  cerrado, convexo y no vacío, entonces existen  $\delta \in \mathbb{R}$  y  $L \in V'$  tales que para todo  $v \in K$ :*

$$\mathcal{J}(v) \geq L(v) + \delta.$$

*Demostración.* Como  $\mathcal{J}$  es convexa y continua, su epigrafo:

$$\text{epi}(\mathcal{J}) = \{(v, \mu) \in V \times \mathbb{R} \mid \mathcal{J}(v) \leq \mu\}$$

es un conjunto convexo y cerrado en  $V \times \mathbb{R}$ . Además, como  $K$  es no vacío, existe al menos un punto  $(v_0, \mathcal{J}(v_0)) \in \text{epi}(\mathcal{J})$ . Sea  $\mu_0 < \mathcal{J}(v_0)$ . Por el teorema anterior de separación de Hahn-Banach, existen  $z \in V$  y  $\zeta, \beta \in \mathbb{R}$  que verifican

$$(z, v_0)_V + \zeta\mu_0 < \beta < (z, v)_V + \zeta\mu$$

para todo  $(v, \mu) \in \text{epi}(\mathcal{J})$ . Fijamos  $v = v_0$ . Tomando  $\mu$  suficientemente grande, deducimos  $\zeta \geq 0$ . Además,  $\zeta = 0$  llevaría a una contradicción. Entonces  $\zeta > 0$ . Luego, para  $v \in K$ ,  $(v, \mathcal{J}(v)) \in \text{epi}(\mathcal{J})$  y

$$\zeta\mathcal{J}(v) + (z, v)_V \geq \beta.$$

Esto termina la demostración. □

**Proposición 3.** *Además, si  $\mathcal{J}$  es fuertemente convexa, entonces existen  $\gamma > 0$  y  $\delta \in \mathbb{R}$  tales que para todo  $v \in V$ :*

$$\mathcal{J}(v) \geq \gamma\|v\|^2 + \delta.$$

*Demostración.* Ver [1].

□

### 3.3.2. Caso estrictamente convexo

Unos ejemplos de funciones estrictamente convexas, pero no fuertemente convexas.

**Ejemplo 4.** *Función cuadrática degenerada. Consideremos la función  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  definida por:*

$$f(x, y) = x^2 + y^4.$$

*Es estrictamente convexa: su matriz hessiana es*

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 12y^2 \end{pmatrix},$$

*que es positiva definida para todo  $(x, y) \neq (0, 0)$  (pues  $12y^2 > 0$  si  $y \neq 0$  y  $2 > 0$ ). Además,  $f$  cumple la desigualdad de convexidad estricta:*

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) < \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y), \quad \forall \lambda \in (0, 1), x \neq y.$$

*No es fuertemente convexa. No existe  $\alpha > 0$  tal que  $f(x, y) - \frac{\alpha}{2}\|(x, y)\|^2$  sea convexa. En particular, la segunda derivada en la dirección  $y$  tiende a 0 cuando  $y \rightarrow 0$ , lo que impide la existencia de una constante global  $\alpha > 0$  que acote inferiormente el hessiano.*

**Ejemplo 5.** *Función exponencial. Consideremos la función  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por:*

$$g(x) = e^x.$$

*Es estrictamente convexa: su segunda derivada es  $g''(x) = e^x > 0$  para todo  $x \in \mathbb{R}$ , lo que garantiza convexidad estricta. No es fuertemente convexa: no existe  $\alpha > 0$  tal que  $g''(x) \geq \alpha$  para todo  $x \in \mathbb{R}$ , ya que  $g''(x) = e^x \rightarrow 0$  cuando  $x \rightarrow -\infty$ .*

**Ejemplo 6.** *Funcional asociado al  $p$ -Laplaciano con  $1 < p < 2$ . Sea  $\Omega \subset \mathbb{R}^d$  un dominio acotado y consideremos el funcional*

$$\mathcal{J} : W_0^{1,p}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$$

*definido por:*

$$\mathcal{J}(v) = \frac{1}{p} \int_{\Omega} |\nabla v|^p.$$

*Es estrictamente convexo: el operador  $p$ -Laplaciano*

$$-\Delta_p u = -\operatorname{div} (|\nabla u|^{p-2} \nabla u)$$

*es estrictamente monótono para  $1 < p < \infty$ , lo que implica que  $\mathcal{J}$  es estrictamente convexo. No es fuertemente convexo: para  $1 < p < 2$ , el funcional  $\mathcal{J}$  no es fuertemente convexo en  $W_0^{1,p}(\Omega)$ . Esto se debe a que la derivada de  $|\nabla v|^p$  no está acotada inferiormente por una constante positiva uniforme en todo el espacio. En particular, la fuerte convexidad falla porque la segunda derivada del término  $|\nabla v|^p$  no es uniformemente elíptica.*

**Ejemplo 7** (superficie mínima). Consideremos el funcional  $\mathcal{J} : H^1(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$  definido por:

$$\mathcal{J}(v) = \int_{\Omega} \sqrt{1 + |\nabla v|^2},$$

Sea  $\Phi : \partial\Omega \rightarrow \mathbb{R}$  una función  $\mathcal{C}^1$ . El problema de minimización de  $\mathcal{J}$  en el subespacio afín

$$V = \{v \in H^1(\Omega) \mid v|_{\partial\Omega} = \Phi\}$$

es un problema de superficie mínima [9, 19]. Sea

$$f(x) = \sqrt{1 + x^2}.$$

La primera derivada de la función es:

$$f'(x) = \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}}.$$

La segunda derivada de la función es:

$$f''(x) = -\frac{x^2}{(x^2 + 1)^{3/2}} + \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}.$$

Después de simplificar, se obtiene:

$$f''(x) = \frac{1}{(x^2 + 1)^{3/2}}.$$

Como  $f''(x) > 0$  para todo  $x$ ,  $f$  es estrictamente convexa, y entonces  $\mathcal{J}$  es estrictamente convexa. Como no existe  $\alpha > 0$  que verifique  $f''(x) \geq \alpha$

para todo  $x$ ,  $f$  no es fuertemente convexa, y  $\mathcal{J}$  tampoco. Este problema de superficie mínima se puede aproximar mediante elementos finitos, ver<sup>1</sup> y <sup>2</sup>.

```

1  ...
2  @NonlinearForm(hessian=True)
3  def energy(u, _):
4      return jnp.sqrt(1. + dot(grad(u), grad(u)))
5
6  D = m.boundary_nodes()
7  x = np.sin(np.pi * m.p[0])
8
9  for itr in range(100):
10     x_prev = x.copy()
11     x += solve(*condense(*energy.assemble(basis, x=x), D=D
12                ))
...

```

Listado 3.1: Superficie mínima.

## 3.4. Mínimos en el caso convexo

Veamos ahora un resultado sobre existencia de mínimos en el caso convexo.

### 3.4.1. Un ejemplo

**Ejemplo 8.** *Funcional asociado al operador  $p$ -Laplaciano con  $p = 1$ . Consideremos el funcional  $\mathcal{J} : BV(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$  definido por:*

$$\mathcal{J}(v) = \int_{\Omega} |\nabla v|,$$

donde  $BV(\Omega)$  es el espacio de funciones de variación acotada. El funcional  $\mathcal{J}$  es convexo porque  $|\nabla v|$  es una norma (y las normas son convexas).

<sup>1</sup><https://scikit-fem.readthedocs.io/en/latest/listofexamples.html#example-10-nonlinear-minimal-surface-problem>

<sup>2</sup><https://github.com/kinnala/scikit-fem/blob/master/docs/examples/ex45.py>

No estrictamente convexo porque no cumple la desigualdad estricta de convexidad. Por ejemplo, si  $u$  y  $v$  son funciones con  $\nabla u = \nabla v$ , entonces:

$$\mathcal{J}\left(\frac{u+v}{2}\right) = \frac{1}{2}\mathcal{J}(u) + \frac{1}{2}\mathcal{J}(v)$$

(no hay desigualdad estricta).

### 3.4.2. Espacio de Hilbert separable

Sea  $V$  un espacio de Hilbert separable con producto interno  $(\cdot, \cdot)_V$  y norma inducida  $\|\cdot\|_V$ , y sea  $\{e_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  una base hilbertiana (ortonormal) de  $V$ . Entonces tenemos:

1. *Descomposición ortonormal*: Todo  $v \in V$  admite una representación única:

$$v = \sum_{i=1}^{\infty} (v, e_i)_V e_i,$$

con convergencia en la norma de  $V$ .

2. *Desigualdad de Cauchy-Schwarz*: Para todo  $u, v \in V$ :

$$|(u, v)_V| \leq \|u\|_V \|v\|_V.$$

3. *Identidad de Parseval*: Para todo  $u, v \in V$ :

$$(u, v)_V = \sum_{i=1}^{\infty} (u, e_i)_V (v, e_i)_V,$$

y en particular, para  $u = v$ :

$$\|u\|_V^2 = \sum_{i=1}^{\infty} |(u, e_i)_V|^2.$$

### 3.4.3. Convergencia débil

Veamos ahora la convergencia débil en un espacio de Hilbert.

**Definición 8.** Sea  $V$  un espacio de Hilbert. Una secuencia  $\{u_n\} \subset V$  converge débilmente a  $u \in V$  si:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n, v)_V = (u, v)_V, \quad \forall v \in V.$$

Se denota  $u_n \rightharpoonup u$ .

La siguiente proposición caracteriza la convergencia débil en un espacio de Hilbert separable.

**Proposición 4.** Sea  $V$  un espacio de Hilbert separable. Entonces, una secuencia  $\{u_n\} \subset V$  converge débilmente a  $u \in V$  si y solo si:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n, e_i)_V = (u, e_i)_V, \quad \forall i \in \mathbb{N},$$

donde  $\{e_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  es una base hilbertiana (base ortonormal completa) de  $V$ .

*Demostración. Implicación directa ( $\Rightarrow$ ):* Si  $u_n \rightharpoonup u$ , entonces por definición de convergencia débil:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n, v)_V = (u, v)_V, \quad \forall v \in V.$$

En particular, esto vale para  $v = e_i$  (pues  $e_i \in V$ ).

*Implicación inversa ( $\Leftarrow$ ):* Supongamos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n, e_i)_V = (u, e_i)_V$$

para todo  $i \in \mathbb{N}$ . Sea  $v \in V$ . Como  $\{e_i\}$  es una base hilbertiana, podemos escribir:

$$v = \sum_{i=1}^{\infty} (v, e_i)_V e_i,$$

con convergencia en la norma de  $V$ .

Queremos demostrar que  $\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n, v)_V = (u, v)_V$ . Para ello, consideremos:

$$|(u_n, v)_V - (u, v)_V| = \left| \sum_{i=1}^{\infty} (u_n - u, e_i)_V (v, e_i)_V \right|.$$

Dado  $\varepsilon > 0$ , elegimos  $I \in \mathbb{N}$  tal que:

$$\left| \sum_{i>I} (u_n - u, e_i)_V (v, e_i)_V \right| \leq \frac{\varepsilon}{2},$$

lo cual es posible gracias a la convergencia de la serie y a Parseval.

Por otro lado, como  $I$  es finito y  $\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n - u, e_i)_V = 0$  para cada  $i$ , existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que para todo  $n \geq N$ :

$$\left| \sum_{i=1}^I (u_n - u, e_i)_V (v, e_i)_V \right| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Combinando ambas desigualdades, obtenemos:

$$|(u_n, v)_V - (u, v)_V| \leq \left| \sum_{i>I} (u_n - u, e_i)_V (v, e_i)_V \right| + \left| \sum_{i=1}^I (u_n - u, e_i)_V (v, e_i)_V \right|$$

y

$$|(u_n, v)_V - (u, v)_V| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

□

**Ejemplo 9.** En  $\ell^2$ , la secuencia  $u_n = (0, 0, \dots, 1, 0, 0, \dots)$  (con 1 en la posición  $n$  y 0 en las demás) satisface:

$$u_n \rightharpoonup 0$$

(pues  $(u_n, v)_V = v_n \rightarrow 0$  para todo  $v \in \ell^2$ ). Por otro lado,  $\|u_n\|_V = 1$  para todo  $n$ , por lo que no converge fuertemente a 0.

**Ejemplo 10.** En  $L^2(0; \pi)$ , la secuencia de funciones  $\{u_n\}$  definidas por

$$u_n(x) = \sin^2(nx)$$

verifica

$$u_n \rightharpoonup \frac{1}{2}$$

pero no converge fuertemente, ver [6].

Para calcular la primitiva de  $\sin^2(nx)$ , utilizamos la identidad trigonométrica:

$$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos(2\theta)}{2}.$$

Aplicando esta identidad a  $\sin^2(nx)$ :

$$\sin^2(nx) = \frac{1 - \cos(2nx)}{2}.$$

La primitiva se calcula como sigue:

$$\int \sin^2(nx) dx = \int \frac{1 - \cos(2nx)}{2} dx = \frac{1}{2} \int 1 dx - \frac{1}{2} \int \cos(2nx) dx.$$

Resolviendo cada término:

$$\frac{1}{2} \int 1 dx = \frac{x}{2} + C_1,$$

$$-\frac{1}{2} \int \cos(2nx) dx = -\frac{\sin(2nx)}{4n} + C_2.$$

Por lo tanto, la primitiva es:

$$\boxed{\int \sin^2(nx) dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin(2nx)}{4n} + C.}$$

Entonces para una función  $v$  constante a trozos (1 en  $(0, a)$  y 0 en  $(a, \pi)$ ):

$$\int_0^\pi v(x) \sin^2(nx) dx \rightarrow \frac{a}{2} = \int_0^\pi \frac{v(x)}{2} dx$$

y se concluye con un argumento de densidad en  $L^2$ . Ahora, queremos calcular:

$$\int_0^\pi \left( \sin^2(nx) - \frac{1}{2} \right)^2 dx.$$

*Expandimos la expresión*

$$\left(\sin^2(nx) - \frac{1}{2}\right)^2 = \sin^4(nx) - \sin^2(nx) + \frac{1}{4}.$$

*Sustituyendo en la expresión expandida:*

$$\sin^4(nx) - \sin^2(nx) + \frac{1}{4} = \frac{3 - 4\cos(2nx) + \cos(4nx)}{8} - \frac{1 - \cos(2nx)}{2} + \frac{1}{4}.$$

*Simplificando:*

$$= \frac{1 + \cos(4nx)}{8}.$$

*Integrar la expresión simplificada*

$$\int_0^\pi \frac{1 + \cos(4nx)}{8} dx = \frac{1}{8} \int_0^\pi 1 dx + \frac{1}{8} \int_0^\pi \cos(4nx) dx.$$

*Por lo tanto, el resultado es:*

$$\boxed{\int_0^\pi \left(\sin^2(nx) - \frac{1}{2}\right)^2 dx = \frac{\pi}{8}.$$

### 3.4.4. Propiedades de la convergencia débil

**Convergencia fuerte implica convergencia débil**

**Teorema 7.** Si  $\{u_n\}$  converge fuertemente hacia  $u \in V$  entonces  $\{u_n\}$  converge débilmente hacia  $u$ .

*Demostración.* Por hipótesis,  $u_n \rightarrow u$  fuertemente, es decir,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|u_n - u\|_V = 0.$$

Sea  $v \in V$ . Por Cauchy-Schwarz

$$|(u_n, v)_V - (u, v)_V| \leq \|u_n - u\|_V \cdot \|v\|_V \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Por lo tanto,  $u_n \rightharpoonup u$  débilmente. □

### La convergencia débil implica acotación

**Teorema 8.** *Si  $\{u_n\}$  converge débilmente hacia  $u$  en  $V$ , entonces  $\{u_n\}$  está acotada.*

*Demostración.* Si  $\{u_n\}$  converge débilmente, entonces para todo  $f \in V^*$ ,

$$(f, u_n) \rightarrow (f, u).$$

Entonces existe  $M_f > 0$  tal que:

$$|f(u_n)| \leq M_f \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Por el Teorema de Banach-Steinhaus, esto implica que existe  $M > 0$  tal que, para cualquier función dual  $f$ :

$$|f(u_n)| \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Particularmente, tomando  $f(\cdot) = (u_n, \cdot)_V$ , tenemos que  $\{u_n\}$  está acotado en norma:

$$\exists M > 0 \text{ tal que } \|u_n\|_V \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

□

Enunciamos ahora una versión útil, para nosotros, del Teorema de Banach-Steinhaus (se demuestra a partir del Lema de Baire, ver apéndice y [7]).

**Teorema 3.4.1** (Teorema de Banach-Steinhaus para funcionales lineales). *Sea  $V$  un espacio de Banach sobre  $\mathbb{R}$ , y sea  $\mathcal{F} = \{f_\alpha\}_{\alpha \in A} \subseteq V^*$  una familia de funcionales lineales continuas. Si  $\mathcal{F}$  está puntualmente acotada, es decir,*

$$\forall x \in V, \quad \sup_{\alpha \in A} |f_\alpha(x)| < \infty,$$

*entonces  $\mathcal{F}$  está uniformemente acotada:*

$$\sup_{\alpha \in A} \|f_\alpha\|_{V^*} < \infty.$$

### Desigualdad para el límite inferior de las normas

**Teorema 9. Teorema.** Si  $\{u_n\}$  converge débilmente hacia  $u$  en  $V$ , entonces:

$$\|u\|_V \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|u_n\|_V.$$

*Demostración.* Si  $u = 0$  la desigualdad se verifica siempre. Podemos luego considerar  $u \neq 0$  y escribir

$$\|u\|_V = \frac{(u, u)_V}{\|u\|_V} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(u_n, u)_V}{\|u\|_V}.$$

Por Cauchy-Schwarz, acotamos

$$\frac{(u_n, u)_V}{\|u\|_V} \leq \|u_n\|_V$$

y finalmente obtenemos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(u_n, u)_V}{\|u\|_V} = \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{(u_n, u)_V}{\|u\|_V} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|u_n\|_V.$$

□

### 3.4.5. Compacidad para la topología débil

De toda secuencia acotada se puede extraer una subsucesión que converge débilmente (versión simplificada del Teorema de Banach-Alaoglu [7], ver también [1]).

**Lema 1.** Sea  $V$  un espacio de Hilbert separable y  $\{u_n\} \subset V$  una secuencia acotada (es decir,  $\|u_n\| \leq M$  para todo  $n$  y algún  $M > 0$ ). Entonces existe una subsucesión  $\{u_{n_k}\}$  que converge débilmente a algún  $u \in V$ .

*Demostración.* Sea  $V$  un espacio de Hilbert separable y sea  $\{e_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  una base ortonormal de  $V$ . Consideremos una sucesión acotada  $\{u_n\} \subseteq V$ , es decir, existe  $M > 0$  tal que  $\|u_n\|_V \leq M$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ .

*Paso 1: Acotación de las proyecciones.* Para cada  $i \in \mathbb{N}$ , la sucesión  $\{\langle u_n, e_i \rangle_V\}$  está acotada en  $\mathbb{R}$ , ya que:

$$|\langle u_n, e_i \rangle_V| \leq \|u_n\|_V \|e_i\|_V \leq M \cdot 1 = M.$$

*Paso 2: Construcción de la subsucesión diagonal.*

- **Para  $i = 1$ :** Por el Teorema de Bolzano-Weierstrass, existe una subsucesión  $\{u_n^{(1)}\} \subseteq \{u_n\}$  tal que:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (u_{n_k}^{(1)}, e_1)_V \text{ existe.}$$

- **Para  $i = 2$ :** Aplicamos nuevamente Bolzano-Weierstrass a la sucesión  $\{(u_n^{(1)}, e_2)_V\}$ . Existe una subsucesión  $\{u_n^{(2)}\} \subseteq \{u_n^{(1)}\}$  tal que:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (u_{n_k}^{(2)}, e_2)_V \text{ existe.}$$

Además, como  $\{u_n^{(2)}\} \subseteq \{u_n^{(1)}\}$ , se cumple que:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (u_{n_k}^{(2)}, e_1)_V \text{ también existe.}$$

- **Iteración para todo  $i \in \mathbb{N}$ :** Supongamos que para algún  $i \geq 2$ , hemos construido una subsucesión  $\{u_n^{(i)}\} \subseteq \{u_n^{(i-1)}\}$  tal que:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (u_{n_k}^{(i)}, e_j)_V \text{ existe para todo } j = 1, 2, \dots, i.$$

Aplicamos Bolzano-Weierstrass a  $\{(u_n^{(i)}, e_{i+1})_V\}$  para obtener

$$\{u_n^{(i+1)}\} \subseteq \{u_n^{(i)}\}$$

tal que:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (u_{n_k}^{(i+1)}, e_{i+1})_V \text{ existe,}$$

y por construcción, los límites para  $e_1, e_2, \dots, e_i$  también existen.

*Paso 3: Definición de la subsucesión diagonal.* Definimos la subsucesión diagonal  $\{u_{n_k}\}$  como:

$$u_{n_k} := u_k^{(k)}.$$

Es decir:

$$u_{n_1} = u_1^{(1)}, \quad u_{n_2} = u_2^{(2)}, \quad u_{n_3} = u_3^{(3)}, \quad \dots$$

*Paso 4: Convergencia de las proyecciones.* Fijamos  $i \in \mathbb{N}$ . Para todo  $k \geq i$ , se tiene que  $u_{n_k} = u_k^{(k)} \in \{u_n^{(i)}\}$ , ya que  $\{u_n^{(k)}\} \subseteq \{u_n^{(i)}\}$  para  $k \geq i$ . Por lo tanto:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (u_{n_k}, e_i)_V = \lim_{k \rightarrow \infty} (u_k^{(k)}, e_i)_V = a_i,$$

donde  $a_i$  es el límite asociado a la subsucesión  $\{u_n^{(i)}\}$ .

*Paso 5: Existencia del límite  $u \in V$ .* Definimos el candidato a límite como:

$$u := \sum_{i=1}^{\infty} a_i e_i.$$

Para verificar que  $u \in V$ , observamos que:

$$\sum_{i=1}^{\infty} |a_i|^2 \leq M^2.$$

En efecto, por el Teorema de Bessel, para cada  $k$ :

$$\sum_{i=1}^{\infty} |(u_{n_k}, e_i)_V|^2 \leq \|u_{n_k}\|_V^2 \leq M^2.$$

Tomando límite en  $k$ , obtenemos:

$$\sum_{i=1}^{\infty} |a_i|^2 \leq M^2 < \infty,$$

lo que garantiza que  $u \in V$ .

*Paso 6: Convergencia débil de  $\{u_{n_k}\}$  a  $u$ .* Para mostrar que  $u_{n_k} \rightharpoonup u$ , sea  $v \in V$  arbitrario. Como  $\{e_i\}$  es una base ortonormal, podemos escribir:

$$v = \sum_{i=1}^{\infty} b_i e_i, \quad \text{con} \quad \sum_{i=1}^{\infty} |b_i|^2 < \infty.$$

Entonces, por la linealidad y continuidad del producto interno:

$$(u_{n_k}, v)_V = \sum_{i=1}^{\infty} b_i (u_{n_k}, e_i)_V \rightarrow \sum_{i=1}^{\infty} b_i a_i = (u, v)_V.$$

La convergencia de la serie está justificada por la desigualdad de Cauchy-Schwarz:

$$\left| \sum_{i=1}^{\infty} b_i (u_{n_k}, e_i)_V \right| \leq \left( \sum_{i=1}^{\infty} |b_i|^2 \right)^{1/2} \left( \sum_{i=1}^{\infty} |(u_{n_k}, e_i)_V|^2 \right)^{1/2} \leq \|v\|_V \cdot M.$$

Por lo tanto,  $\{u_{n_k}\}$  converge débilmente a  $u \in V$ . □

### 3.4.6. Convexos cerrados

**Lema 2.** *Sea  $V$  un espacio de Hilbert y  $K \subset V$  un conjunto cerrado y convexo. Entonces:*

$$K = \bigcap_{\substack{\mathcal{H} \supset K \\ \mathcal{H} \text{ semiplano cerrado}}} \mathcal{H}.$$

*Demostración.* Por contradicción usando Hahn-Banach.

Claramente,  $K \subset \bigcap_{\mathcal{H} \text{ semiplano cerrado}} \mathcal{H} \supset K$ , ya que todo semiplano cerrado que contiene a  $K$  incluye a  $K$ .

Supongamos que existe  $v_0 \in \bigcap_{\mathcal{H} \text{ semiplano cerrado}} \mathcal{H}$  pero  $v_0 \notin K$ . Como  $K$  es cerrado y convexo, por el Teorema de Hahn-Banach (versión geométrica), existe un hiperplano cerrado que separa estrictamente  $v_0$  de  $K$ . Es decir, existen  $z \in V$  y  $\beta \in \mathbb{R}$  tales que:

$$(z, w)_V \leq \beta < (z, v_0)_V, \quad \forall w \in K.$$

Esto implica que el semiplano cerrado  $\mathcal{H} = \{w \in V \mid (z, w)_V \leq \beta\}$  contiene a  $K$  pero no contiene a  $v_0$ , lo que contradice la hipótesis de que  $v_0$  está en la intersección de todos los semiplanos cerrados que contienen a  $K$ . Por lo tanto,  $v_0 \in K$ .  $\square$

**Lema 3.** *Sea  $V$  un espacio de Hilbert y  $K \subset V$  un conjunto cerrado y convexo. Entonces  $K$  es cerrado para la convergencia débil, es decir: si  $\{v_n\} \subset K$  y  $v_n \rightharpoonup v$ , entonces  $v \in K$ .*

*Demostración.* Por el Lema anterior,  $K$  es la intersección de todos los semiplanos cerrados que lo contienen. Sea  $\mathcal{H} = \{w \in V \mid (z, w) \leq \beta\}$  uno de estos semiplanos. Como  $v_n \in K \subset \mathcal{H}$  para todo  $n$ , se tiene:

$$(z, v_n)_V \leq \beta.$$

Tomando límite cuando  $n \rightarrow \infty$  (por la convergencia débil):

$$(z, v)_V \leq \beta.$$

Por lo tanto,  $v \in \mathcal{H}$  para todo semiplano cerrado  $\mathcal{H}$  que contiene a  $K$ . Por el Lema anterior, esto implica que  $v \in K$ .  $\square$

**Observación 2.** Si el conjunto no es convexo, puede ser cerrado para la topología fuerte sin ser cerrado por la topología débil, tomar por ejemplo  $\mathcal{S} := \{v \in V; \|v\|_V = 1\}$  (ver [7]).

**Lema 4.** Sea  $V$  un espacio de Hilbert,  $K \subset V$  un conjunto cerrado y convexo, y  $\mathcal{J} : K \rightarrow \mathbb{R}$  una función convexa y semi-continua inferiormente (s.c.i.) para la convergencia fuerte. Entonces  $\mathcal{J}$  es también s.c.i. para la convergencia débil.

*Demostración.* Viene directamente de la definición de s.c.i. (epigrafo cerrado) y del resultado anterior.  $\square$

**Teorema 10.** Sea  $V$  un espacio de Hilbert,  $K \subset V$  un conjunto cerrado, convexo y no vacío, y  $\mathcal{J} : K \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua, coerciva (es decir,  $\lim_{\|v\|_V \rightarrow \infty} \mathcal{J}(v) = +\infty$ ) y convexa. Entonces  $\mathcal{J}$  admite un mínimo global en  $K$ .

*Demostración.* Lo hacemos en cuatro tiempos.

1. *Existencia de una secuencia minimizante.* Sea  $I = \inf_{u \in K} \mathcal{J}(u)$ . Por definición del ínfimo, existe una secuencia  $\{u_n\} \subset K$  tal que:

$$\mathcal{J}(u_n) \rightarrow I.$$

2. *La secuencia minimizante es acotada (por contradicción).* Supongamos que  $\{u_n\}$  no es acotada. Entonces existe una subsucesión  $\{u_{n_k}\}$  tal que  $\|u_{n_k}\|_V \rightarrow \infty$ . Como  $\mathcal{J}$  es coerciva:

$$\mathcal{J}(u_{n_k}) \rightarrow +\infty,$$

lo que contradice que  $\mathcal{J}(u_{n_k}) \rightarrow I$ . Por lo tanto,  $\{u_n\}$  es acotada.

3. *Existencia de una subsucesión que converge débilmente.* Por el Lema anterior, existe una subsucesión  $\{u_{n_k}\}$  que converge débilmente a algún  $u \in V$ . Además, por el otro Lema anterior, como  $K$  es cerrado y convexo,  $u \in K$ .

4.  *$\mathcal{J}(u)$  es el mínimo.* Por el ultimo Lema anterior,  $\mathcal{J}$  es s.c.i. para la convergencia débil. Por lo tanto:

$$\mathcal{J}(u) \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \mathcal{J}(u_{n_k}) = I.$$

Como  $I$  es el ínfimo, se tiene  $\mathcal{J}(u) \geq I$ . Por lo tanto,  $\mathcal{J}(u) = I$ , y  $u$  es un minimizador global de  $\mathcal{J}$  en  $K$ .  $\square$

### 3.5. Convexidad con diferencial

Ahora necesitamos los siguientes resultados para caracterizar el mínimo con la diferencial de  $\mathcal{J}$ . Primero adaptamos la Proposición 10.1.4 de G. Allaire [1].

**Proposición 5.** *Si  $\mathcal{J} : V \rightarrow \mathbb{R}$  es convexa y derivable, entonces se cumple para todo  $u$  y  $v$  en  $V$ :*

$$\mathcal{J}(v) \geq \mathcal{J}(u) + \mathcal{J}'(u; v - u).$$

*Demostración.* Sean  $u, v \in V$ . Sea  $t \in (0, 1)$ . La convexidad de  $\mathcal{J}$  da:

$$\mathcal{J}((1-t)u + tv) \leq (1-t)\mathcal{J}(u) + t\mathcal{J}(v).$$

Por lo tanto

$$\frac{\mathcal{J}((1-t)u + tv) - \mathcal{J}(u)}{t} \leq \mathcal{J}(v) - \mathcal{J}(u).$$

O equivalentemente

$$\frac{\mathcal{J}(u + t(v - u)) - \mathcal{J}(u)}{t} \leq \mathcal{J}(v) - \mathcal{J}(u).$$

Haciendo  $t \rightarrow 0$ , se obtiene el resultado. □

Adaptamos luego el Teorema 10.2.1 (desigualdad de Euler):

**Teorema 11.** *Sea  $K$  un subconjunto convexo cerrado no vacío de  $V$  y  $\mathcal{J}$  una función convexa y derivable en  $V$ . Entonces  $u$  es un minimizador global de  $\mathcal{J}$  en  $K$  si y solo si, para todo  $v \in K$ , tenemos*

$$\mathcal{J}'(u; v - u) \geq 0.$$

*Demostración.* Primero suponemos que  $u$  es un minimizador global de  $\mathcal{J}$  en  $K$ , entonces para  $\varepsilon > 0$  pequeño, se tiene, para  $v \in K$ :

$$\frac{\mathcal{J}(u + \varepsilon(v - u)) - \mathcal{J}(u)}{\varepsilon} \geq 0$$

ya que  $u + \varepsilon(v - u) \in K$  por convexidad de  $K$  y tomamos el límite en  $\varepsilon$ .

Supongamos ahora que se cumple la desigualdad variacional. Usamos la Proposición anterior en  $u$ . Para todo  $v \in K$ :

$$\mathcal{J}(v) \geq \mathcal{J}(u) + \mathcal{J}'(u; v - u) \geq \mathcal{J}(u)$$

y por lo tanto  $u$  es un minimizador global. □

**Ejemplo 11.** *Veamos con el anterior que el problema de obstáculo se formula como una desigualdad variacional:  $u \in K$  verifica*

$$a(u, v - u) \geq L(v - u)$$

*para todo  $v \in K$ .*

### 3.6. Para profundizar

Se puede referir a [1], [7], [3], [24].



# Capítulo 4

## Newton semi-suave

---

El método de Newton clásico es una herramienta fundamental para calcular los ceros de una función diferenciable  $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ . Cuando  $g$  es el gradiente de una función  $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , es decir,  $g = \nabla F$ , los ceros de  $g$  corresponden a los puntos críticos de  $F$ . En el contexto convexo, donde  $F$  es una función convexa, el método de Newton puede adaptarse para manejar situaciones en las que  $g$  no es diferenciable en todos los puntos, dando lugar al *método de Newton semi-suave*.

Este método generaliza el enfoque clásico al permitir el uso de *subgradientes* en lugar de gradientes, lo que lo hace aplicable a funciones que no son de clase  $C^1$ . La idea central es que, incluso cuando  $g$  no es diferenciable en un punto  $x$ , el subdiferencial  $\partial g(x)$  (el conjunto de todos los subgradientes en  $x$ ) contiene suficiente información para definir una dirección de descenso. En el caso semi-suave, el subdiferencial varía de manera continua, lo que permite una generalización natural del método de Newton.

### 4.1. Unos ejemplos

Veamos ejemplos sencillos para empezar.

#### 4.1.1. Un primer ejemplo

Consideremos la función  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por

$$g(x) = \max(0, x) - 1.$$

Esta función tiene un único cero en  $x = 1$ , ya que:

$$g(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x \leq 0, \\ x - 1 & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

El subdiferencial de  $g$  está dado por:

$$\partial g(x) = \begin{cases} \{0\} & \text{si } x < 0, \\ [0, 1] & \text{si } x = 0, \\ \{1\} & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

El método de Newton semi-suave se define mediante la iteración:

$$x_{k+1} = x_k - v_k^{-1} g(x_k), \quad \text{donde } v_k \in \partial g(x_k) \text{ y } v_k \neq 0.$$

**Cálculo manual partiendo de  $x_0 = 0$ :**

- **Paso 0:**  $x_0 = 0$ ,  $g(x_0) = -1$ , y  $\partial g(x_0) = [0, 1]$ .
- **Elección 1:**  $v_0 = 1$ .

$$x_1 = 0 - \frac{1}{1} \cdot (-1) = 1.$$

En  $x_1 = 1$ ,  $g(x_1) = 0$ , por lo que el método converge en 1 iteración.

- **Elección 2:**  $v_0 = 0,5$ .

$$x_1 = 0 - \frac{1}{0,5} \cdot (-1) = 2.$$

En  $x_1 = 2$ ,  $g(x_1) = 1$  y  $\partial g(x_1) = \{1\}$ . Tomamos  $v_1 = 1$ :

$$x_2 = 2 - \frac{1}{1} \cdot 1 = 1.$$

En  $x_2 = 1$ ,  $g(x_2) = 0$ , por lo que el método converge en 2 iteraciones.

En este ejemplo, aunque el cero  $x = 1$  es único, la cantidad de iteraciones necesarias para alcanzarlo depende de la elección del subgradiente en el punto inicial  $x_0 = 0$ . Esto ilustra cómo, en el método de Newton semi-suave, la selección del subgradiente puede afectar la eficiencia del algoritmo, incluso cuando el cero es único.

### 4.1.2. Un otro ejemplo

Consideremos la función  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por

$$g(x) = |x| - 1,$$

cuyos ceros son  $x = 1$  y  $x = -1$ . Esta función no es diferenciable en  $x = 0$ , pero su subdiferencial está dado por:

$$\partial g(x) = \begin{cases} \{1\} & \text{si } x > 0, \\ \{-1\} & \text{si } x < 0, \\ [-1, 1] & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

**Cálculo manual partiendo de  $x_0 = 0$ :**

- **Paso 0:**  $x_0 = 0$ ,  $g(x_0) = |0| - 1 = -1$ , y  $\partial g(x_0) = [-1, 1]$ .
- **Elección 1:**  $v_0 = 1$ .

$$x_1 = 0 - \frac{1}{1} \cdot (-1) = 1.$$

En  $x_1 = 1$ ,  $g(x_1) = |1| - 1 = 0$ , por lo que el método converge en un paso al cero  $x = 1$ .

- **Elección 2:**  $v_0 = -1$ .

$$x_1 = 0 - \frac{1}{-1} \cdot (-1) = -1.$$

En  $x_1 = -1$ ,  $g(x_1) = |-1| - 1 = 0$ , por lo que el método converge en un paso al cero  $x = -1$ .

En este ejemplo, aunque  $x_0 = 0$  es un punto no diferenciable, el método de Newton semi-suave converge a un cero de  $g$  en una sola iteración, independientemente de la elección del subgradiente  $v_0 \in \partial g(x_0)$ . Esto ilustra cómo el método puede manejar la no diferenciableidad y aún así aproximar los puntos críticos de manera eficiente.

## 4.2. Dominios de funciones convexas

Veamos ahora nuevas definiciones más generales que en el capítulo anterior.

**Definición 9** (Función convexa). *Una función*

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, +\infty]$$

es **convexa** si su **dominio extendido**  $\text{dom}(f) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) < +\infty\}$  es un conjunto convexo y, para todo  $x, y \in \text{dom}(f)$  y todo  $\lambda \in [0, 1]$ , se cumple:

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y).$$

El **dominio extendido**  $\text{dom}(f)$  incluye todos los puntos donde  $f$  no toma el valor  $+\infty$ . Este concepto es crucial porque:

- Permite manejar funciones definidas solo en subconjuntos específicos de  $\mathbb{R}^n$  (por ejemplo, restricciones en optimización).
- Garantiza que la desigualdad de convexidad se aplique **solo** a pares de puntos donde  $f$  está bien definida.

Las funciones convexas propias son un caso especialmente importante en optimización y análisis convexo, ya que combinan la convexidad con condiciones naturales sobre su dominio y valores. A continuación, presentamos su definición formal.

**Definición 10** (Función convexa propia). *Una función  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, +\infty]$  se denomina **convexa propia** si cumple las siguientes condiciones:*

1. **Convexidad:**  $f$  es convexa en el sentido usual:

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n, \forall \lambda \in [0, 1].$$

2. **Condición de no trivialidad:**  $f(x) < +\infty$  para al menos un  $x \in \mathbb{R}^n$  (es decir,  $\text{dom}(f) \neq \emptyset$ ).


## Ejemplos ilustrativos

**Ejemplo 12** (Función valor absoluto:  $f(x) = |x|$ ). Tiene las características siguientes.

- **Dominio extendido:**  $\text{dom}(f) = \mathbb{R}$ .
- **Convexidad:** Cumple la desigualdad de convexidad (por desigualdad triangular):


$$|\lambda x + (1 - \lambda)y| \leq \lambda|x| + (1 - \lambda)|y|.$$

- **Visualización:**



**Ejemplo 13** (Función parte positiva:  $f(x) = \max(x, 0)$ ). Tiene las características siguientes.

- **Dominio extendido:**  $\text{dom}(f) = \mathbb{R}$ .
- **Convexidad:** se verifica directamente con la definición.
- **Visualización:**



**Ejemplo 14** (Función indicatriz de un conjunto convexo  $C$ ). *Se define así:*

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in C, \\ +\infty & \text{si } x \notin C. \end{cases}$$

- **Dominio extendido:**  $\text{dom}(f) = C$ , que es convexo por definición.
- **Convexidad:** La desigualdad se cumple trivialmente (ambos lados son  $+\infty$  o  $0$ ).

**Ejemplo 15** (Función norma euclidiana). **Función norma euclidiana:** Se define por  $f(x) = \|x\|_2$ .

- **Dominio extendido:**  $\text{dom}(f) = \mathbb{R}^n$ .
- **Convexidad:** Desigualdad triangular:

$$\|\lambda x + (1 - \lambda)y\|_2 \leq \lambda\|x\|_2 + (1 - \lambda)\|y\|_2.$$

#### 4.2.1. Subdiferencial de funciones convexas

La noción de subdiferencial generaliza el concepto de gradiente a funciones convexas que no son necesariamente diferenciables. Esta herramienta es fundamental en optimización convexa, ya que permite caracterizar óptimos incluso en presencia de no diferenciabilidad.

**Definición 11** (Subgradiente). *Sea  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, +\infty]$  una función convexa. Un vector  $g \in \mathbb{R}^n$  es un **subgradiente** de  $f$  en  $x$  si*

$$f(y) \geq f(x) + g^T(y - x) \quad \forall y \in \mathbb{R}^n.$$

*El conjunto de todos los subgradientes de  $f$  en  $x$  se denota  $\partial f(x)$  y se llama **subdiferencial** de  $f$  en  $x$ .*

Intuitivamente, un subgradiente define un hiperplano de soporte al epígrafo de la función en el punto considerado. Cuando la función es diferenciable, el subdiferencial se reduce a un singleton que contiene el gradiente clásico.

A continuación, resumimos algunas propiedades fundamentales del subdiferencial en dimensión finita.

**Propiedades clave.** Sea  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, +\infty]$  convexa y  $x \in \text{dom}(f)$ . Entonces:

- El conjunto  $\partial f(x)$  es convexo y cerrado.
- Si  $f$  es diferenciable en  $x$ , entonces

$$\partial f(x) = \{\nabla f(x)\}.$$

- La condición de optimalidad de primer orden se escribe:

$$0 \in \partial f(x) \iff x \text{ es un minimizador global de } f.$$

- La aplicación  $x \mapsto \partial f(x)$  es monótona en el sentido de operadores:

$$(g_1 - g_2)^T(x_1 - x_2) \geq 0 \quad \text{para todo } g_i \in \partial f(x_i).$$

Para ilustrar esta noción, presentamos ahora algunos ejemplos clásicos de cálculo de subdiferenciales.

### Ejemplos.

- **Valor absoluto.** Sea  $f(x) = |x|$  con  $x \in \mathbb{R}$ . Entonces:

$$\partial f(x) = \begin{cases} \{1\} & \text{si } x > 0, \\ \{-1\} & \text{si } x < 0, \\ [-1, 1] & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

- **Parte positiva.** Sea  $f(x) = \max(0, x)$ . Entonces:

$$\partial f(x) = \begin{cases} \{1\} & \text{si } x > 0, \\ \{0\} & \text{si } x < 0, \\ [0, 1] & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

- **Función indicatriz.** Sea  $C \subset \mathbb{R}^n$  un conjunto convexo cerrado y

$$\iota_C(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in C, \\ +\infty & \text{si } x \notin C. \end{cases}$$

Entonces, para  $x \in C$ , el subdiferencial está dado por el cono normal:

$$\partial \iota_C(x) = N_C(x) = \{g \in \mathbb{R}^n \mid g^T(y - x) \leq 0, \forall y \in C\}.$$

Estos ejemplos muestran cómo el subdiferencial captura la falta de diferenciabilidad mediante conjuntos de pendientes admisibles, lo cual resulta esencial en el análisis y la resolución de problemas de optimización convexa no suave.

### 4.2.2. Caracterización de mínimos

Una de las principales ventajas del subdiferencial es que permite formular condiciones de optimalidad de primer orden sin requerir diferenciabilidad. En el contexto de funciones convexas, esta caracterización es particularmente simple y poderosa. El siguiente resultado establece una condición necesaria y suficiente de optimalidad global.

**Teorema 12** (Caracterización de mínimos). *Sea  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, +\infty]$  una función convexa. Un punto  $x^* \in \text{dom}(f)$  es un mínimo global de  $f$  si y solo si*

$$0 \in \partial f(x^*).$$

Este resultado generaliza la condición clásica  $\nabla f(x^*) = 0$  del caso diferenciable. En efecto, cuando  $f$  es diferenciable en  $x^*$ , se tiene  $\partial f(x^*) = \{\nabla f(x^*)\}$ , y la condición anterior se reduce a la conocida anulación del gradiente.

**Idea de la demostración.** La demostración se basa directamente en la definición de subgradiente.

- (*Suficiencia*) Si  $0 \in \partial f(x^*)$ , entonces por definición:

$$f(y) \geq f(x^*) \quad \forall y \in \mathbb{R}^n,$$

lo que implica que  $x^*$  es un mínimo global.

- (*Necesidad*) Si  $x^*$  es un mínimo global, entonces

$$f(y) \geq f(x^*) \quad \forall y,$$

lo que corresponde exactamente a la desigualdad de subgradiente con  $g = 0$ .

Para una demostración más detallada y en un marco más general (espacios vectoriales normados), se puede consultar textos clásicos de optimización convexa como [18].

**Interpretación geométrica.** La condición  $0 \in \partial f(x^*)$  significa que existe un hiperplano de soporte horizontal al epígrafo de  $f$  en  $x^*$ . Intuitivamente, esto indica que no existe ninguna dirección de descenso, lo que caracteriza un mínimo global en el caso convexo.

A continuación, ilustramos esta caracterización con ejemplos clásicos.

### Ejemplos.

- **Valor absoluto.** Sea  $f(x) = |x|$ . Entonces:

$$\partial f(0) = [-1, 1].$$

Como  $0 \in [-1, 1]$ , se concluye que  $x^* = 0$  es un mínimo global. En cambio, si  $x \neq 0$ , entonces  $\partial f(x)$  no contiene al cero, lo que confirma que no son minimizadores.

- **Parte positiva.** Sea  $f(x) = \max(0, x)$ . Se tiene:

$$\partial f(0) = [0, 1].$$

Dado que  $0 \in \partial f(0)$ , el punto  $x^* = 0$  es un mínimo global (de hecho,  $f(x) \geq 0$  para todo  $x$ ).

- **Función indicatriz.** Sea  $C \subset \mathbb{R}^n$  convexo cerrado y  $f = \iota_C$ . Entonces:

$$\partial f(x) = N_C(x).$$

La condición de optimalidad se escribe:

$$0 \in N_C(x^*),$$

lo cual equivale a decir que

$$0^T(y - x^*) \leq 0 \quad \forall y \in C,$$

condición que es siempre verdadera. Esto refleja el hecho de que todo punto de  $C$  es minimizador de  $\iota_C$ .

**Comentario.** Este criterio es fundamental en optimización convexa y sirve como base para numerosos algoritmos (métodos de subgradiente, métodos proximales, etc.). Su simplicidad contrasta con su gran generalidad, ya que sigue siendo válido incluso en ausencia de diferenciabilidad.

### 4.3. Newton semi-suave

Aquí describimos el algoritmo de Newton semi-suave.

### 4.4. Restricciones

Para problemas con restricciones, podemos aplicar además las siguientes técnicas.

#### 4.4.1. Penalización

Ver [13].

#### 4.4.2. Lagrangiano

Ver [13] y [1].

#### 4.4.3. Lagrangiano aumentado

Ver [13] y trabajos recientes de Erik Burman.

# Capítulo 5

## Desigualdades variacionales

---

Las desigualdades variacionales son útiles para modelar numerosos problemas de la física o la ingeniería [11, 13, 20]. Sin embargo, rara vez se abordan en los cursos de posgrado de análisis numérico. El objetivo es presentar el análisis numérico del problema del obstáculo, cuando se discretiza mediante elementos finitos. El problema del obstáculo es, de hecho, el prototipo ideal de una desigualdad variacional y, quizás, el más sencillo de ellos.

Denotamos por  $H^s(\cdot)$ ,  $s \in \mathbb{R}$ , a los espacios de Sobolev. Para un subconjunto abierto  $D$  de  $\mathbb{R}^n$ , la norma usual de  $H^s(D)$  se denota por  $\|\cdot\|_{s,D}$ . El espacio  $H_0^1(D)$  es el subespacio de funciones en  $H^1(D)$  con traza nula en  $\partial D$ . La letra  $C$  representa una constante genérica, independiente de los parámetros de discretización.

### 5.1. Ejemplos

Seguimos [13]. Las desigualdades variacionales proporcionan un marco general para estudiar problemas con restricciones, como el del obstáculo. Este planteamiento permite modelar fenómenos físicos donde las soluciones deben satisfacer condiciones de desigualdad en lugar de igualdades. La teoría de desigualdades variacionales es fundamental para entender la estructura matemática del problema.

#### 5.1.1. Problema de Signorini (contacto unilateral sin fricción)

Sea  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$  un dominio acotado con frontera  $\Gamma = \Gamma_D \cup \Gamma_C \cup \Gamma_N$  (donde  $\Gamma_D$  es la parte de la frontera con desplazamiento prescrito,  $\Gamma_C$  es la zona de contacto potencial y  $\Gamma_N$  es la parte con carga aplicada). El problema

de Signorini consiste en encontrar  $u \in K$ , donde:

$$K = \{v \in H^1(\Omega) : v = 0 \text{ en } \Gamma_D, v \geq 0 \text{ en } \Gamma_C\},$$

tal que:

$$a(u, v - u) + j(v) - j(u) \geq \langle f, v - u \rangle \quad \forall v \in K.$$

Aquí:

- $a(u, v) = \int_{\Omega} \sigma_{ij}(u) \varepsilon_{ij}(v) dx$  es la forma bilineal simétrica asociada al tensor de deformaciones  $\varepsilon$  y tensiones  $\sigma$ .
- $j(v) = 0$  (en este caso, sin fricción).
- $\langle f, v \rangle = \int_{\Omega} f v dx + \int_{\Gamma_N} g v ds$  es el funcional lineal de cargas.
- $\sigma_{ij}(u)$  son las componentes del tensor de tensiones, y  $\varepsilon_{ij}(v)$  las del tensor de deformaciones.

### 5.1.2. Problema de torsión (Saint-Venant)

Sea  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$  una sección transversal de una barra. El problema de torsión consiste en encontrar  $\phi \in H_0^1(\Omega)$  tal que:

$$a(\phi, v) = \langle f, v \rangle \quad \forall v \in H_0^1(\Omega),$$

donde:

- $a(\phi, v) = \int_{\Omega} \nabla \phi \cdot \nabla v dx$  (forma bilineal simétrica).
- $\langle f, v \rangle = \int_{\Omega} G \theta v dx$ , con  $G$  el módulo de corte,  $\theta$  el ángulo de torsión por unidad de longitud, y  $f = 2G\theta$  (constante).
- El convexo  $K$  es relacionado a  $|\nabla u| \leq c$ .

### 5.1.3. Problema de Tresca (fricción)

Sea  $\Omega$  un dominio con frontera  $\Gamma = \Gamma_D \cup \Gamma_C \cup \Gamma_N$ . El problema de Tresca con fricción en  $\Gamma_C$  consiste en encontrar  $u \in K$  tal que:

$$a(u, v - u) + j(v) - j(u) \geq \langle f, v - u \rangle \quad \forall v \in K,$$

donde:

- $K = \{v \in H^1(\Omega) : v = 0 \text{ en } \Gamma_D\}$ .
- $j(v) = \int_{\Gamma_C} g|v_t| ds$ , con  $g$  el coeficiente de fricción y  $v_t$  la componente tangencial de  $v$  en  $\Gamma_C$ .
- $a(u, v)$  es la forma bilineal simétrica asociada al problema elástico.

#### 5.1.4. Problema de Bingham (fluido visco-plástico)

El fluido de Bingham se modela mediante la siguiente desigualdad variacional: Encontrar  $u \in K$  tal que:

$$a(u, v - u) + j(v) - j(u) \geq \langle f, v - u \rangle \quad \forall v \in K,$$

donde:

- $K = \{v \in H_0^1(\Omega)^d : \operatorname{div} v = 0\}$  (campo de velocidades incompresible).
- $a(u, v) = \int_{\Omega} 2\mu \varepsilon_{ij}(u) \varepsilon_{ij}(v) dx$ , con  $\mu$  la viscosidad plástica.
- $j(v) = \int_{\Omega} \tau_0 \sqrt{2} |\varepsilon(v)| dx$ , con  $\tau_0$  el límite de fluencia.
- $\langle f, v \rangle = \int_{\Omega} f \cdot v dx$ .

#### 5.1.5. Formulación con forma bilineal no simétrica

Consideremos un problema variacional con una forma bilineal no simétrica. Por ejemplo, sea  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$  y el problema: Encontrar  $u \in H_0^1(\Omega)$  tal que:

$$a(u, v) = \langle f, v \rangle \quad \forall v \in H_0^1(\Omega),$$

donde la forma bilineal  $a(u, v)$  se define como:

$$a(u, v) = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx + \int_{\Omega} \mathbf{b} \cdot \nabla u v dx,$$

con  $\mathbf{b} \in L^\infty(\Omega)^d$  un campo vectorial dado. Aquí, el término  $\int_{\Omega} \mathbf{b} \cdot \nabla u v dx$  introduce la asimetría en la forma bilineal.

## 5.2. Teoría general

Veamos ahora resultados sobre desigualdades de tipo I y de tipo II. El estudio de la existencia y unicidad de soluciones es crucial para garantizar la validez de los modelos matemáticos. En el caso del obstáculo, se demuestra que, bajo condiciones adecuadas, existe una solución única que satisface las restricciones físicas del problema. Este análisis sienta las bases para el desarrollo de métodos numéricos confiables.

### 5.2.1. Teorema de Stampacchia

Aquí detallamos el Teorema de Stampacchia, para tipo I.

### 5.2.2. Teorema de Lions-Stampacchia

Aquí detallamos del Teorema de Lions-Stampacchia, para tipo II.

## 5.3. Galerkin y elementos finitos

Aproximaciones de tipo elementos finitos. Convergencia y estimaciones a priori, ver [13].

La aproximación de Galerkin es un método numérico ampliamente utilizado para resolver problemas descritos por desigualdades variacionales. Este enfoque permite discretizar el problema y transformarlo en un sistema algebraico resoluble. Su simplicidad y eficacia lo convierten en una herramienta estándar en el análisis numérico.

### 5.3.1. Penalización

El método de penalización reemplaza las restricciones del problema original por términos en la función objetivo. Este enfoque simplifica la implementación numérica y permite aplicar técnicas estándar de resolución. Sin embargo, la elección del parámetro de penalización es clave para la estabilidad y precisión del método.

### 5.3.2. Nitsche y Lagrangiano

Alternativamente a la penalización, se pueden formular las restricciones con Nitsche.

### 5.3.3. Newton semi-suave

El método de Newton semi-suave es una técnica avanzada para resolver problemas de desigualdades variacionales, combinando ideas de métodos de Newton y subgradientes. Este enfoque aprovecha la estructura diferenciable a trozos de las funciones involucradas, mejorando la convergencia en problemas no lineales. Su aplicación es especialmente relevante en contextos donde la solución puede presentar comportamientos complejos.

### 5.3.4. Implementación en scikit-fem

scikit-fem es una biblioteca de Python que facilita la implementación de métodos de elementos finitos para resolver problemas variacionales. Su integración con NumPy y SciPy permite desarrollar soluciones eficientes y modulares. Esta herramienta es ideal para prototipar y validar algoritmos numéricos en entornos académicos y de investigación. Veamos el listado siguiente, escrito por Lucas Curci.

```
1  """Diferenciación automática.
2  Utiliza diferenciación automática para derivar el sistema
3  tangente
4  para el método de Newton.
5  """
6
7  from skfem import *
8  from skfem.autodiff import NonlinearForm
9  from skfem.autodiff.helpers import grad, dot
10 import numpy as np
11 import jax.numpy as jnp
12
13 m = MeshTri().refined(5)
14
15 @NonlinearForm(hessian=True)
16 def J(u, _):
17     eps = 1e-2
18     return (1/2 * dot(grad(u), grad(u)) - u
```

```

18         + (1 / eps) * ((u - jnp.minimum(u.value, 0.01)
19             )**2))
20 basis = Basis(m, ElementTriP1())
21
22 D = m.boundary_nodes()
23 x = np.zeros(basis.N)
24
25 for itr in range(100):
26     x_prev = x.copy()
27     x += solve(*condense(*J.assemble(basis, x=x), D=D))
28     res = np.linalg.norm(x - x_prev)
29     if res < 1e-8:
30         break
31     if __name__ == "__main__":
32         print(res)
33
34 if __name__ == "__main__":
35     from skfem.visuals.matplotlib import plot3, show
36     plot3(m, x)
37     show()

```

Listado 5.1: Diferenciación automática con scikit-fem.

### 5.3.5. Comentarios adicionales

Aquí unos comentarios para profundizar el tema de las desigualdades variacionales.

**Mas desigualdades variacionales** Ver [10], [13, 15] o [28].

- **Método de Nitsche o multiplicadores:** Estas técnicas alternativas permiten incorporar las restricciones del problema de manera explícita en la formulación débil, mejorando la estabilidad numérica en ciertos casos. El método de Nitsche, en particular, ofrece una forma elegante de manejar las condiciones de desigualdad.
- **Aplicaciones:** El problema del obstáculo tiene aplicaciones en mecánica de sólidos, fluidos, finanzas y otras áreas de la ciencia e ingeniería. Su versatilidad lo convierte en un modelo fundamental para estudiar fenómenos con restricciones geométricas o físicas.

# Capítulo 6

## Dualidad

---

### 6.1. Preliminares y notación

Trabajamos en  $\mathbb{R}^n$  con el producto interno canónico  $\langle x, y \rangle = x^\top y$ . Una función  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$  se dice *propia* si  $\text{dom } f := \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) < +\infty\} \neq \emptyset$  y  $f$  nunca toma el valor  $-\infty$ . Es *convexa* si su epígrafo  $\text{epi } f = \{(x, \alpha) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : \alpha \geq f(x)\}$  es un conjunto convexo, y *cerrada* (*inferiormemente semicontinua, i.s.c.*) si  $\text{epi } f$  es cerrado, equivalente a  $f = \text{cl } f$  (su cerradura inferior).

Recordamos dos funciones clave que se usan reiteradamente:

- **Indicador** de un conjunto  $C \subseteq \mathbb{R}^n$ :

$$\delta_C(x) = \begin{cases} 0, & x \in C, \\ +\infty, & x \notin C. \end{cases}$$

Es convexa cerrada sii  $C$  es convexo cerrado.

- **Función de soporte** de  $C$ :  $\sigma_C(y) = \sup_{x \in C} \langle y, x \rangle$ .

El *subdiferencial* de una función convexa propia en  $x \in \text{dom } f$  es

$$\partial f(x) = \{s \in \mathbb{R}^n : \langle s, y - x \rangle \leq f(y) - f(x) \quad \forall y \in \mathbb{R}^n\},$$

y  $\partial f(x) = \emptyset$  si  $x \notin \text{dom } f$ .

### 6.2. La función conjugada de Fenchel

**Definición 6.2.1** (Conjugada de Fenchel). Sea  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$  una función propia. Su *función conjugada de Fenchel* es

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \{ \langle y, x \rangle - f(x) \}, \quad y \in \mathbb{R}^n.$$

Algunas consecuencias inmediatas:

1.  $f^*$  es (siempre) convexa, como supremo de funciones afines en  $y$  (a saber,  $y \mapsto \langle y, x \rangle - f(x)$ ).
2.  $f^*$  es propia sii  $f$  no es la función idénticamente  $-\infty$ .
3. Si  $f \leq g$  entonces  $f^* \geq g^*$  (el conjugado es antitono).

**Teorema 6.2.1** (desigualdad de Fenchel–Young). *Para toda  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$  propia y todo  $x, y \in \mathbb{R}^n$ ,*

$$\boxed{f(x) + f^*(y) \geq \langle x, y \rangle.}$$

Más aún, si  $f$  es convexa propia, entonces

$$y \in \partial f(x) \iff f(x) + f^*(y) = \langle x, y \rangle.$$

*Demostración.* Por definición  $f^*(y) \geq \langle y, x \rangle - f(x)$  para todo  $x$ , de donde  $f(x) + f^*(y) \geq \langle x, y \rangle$ . Para la caracterización:  $y \in \partial f(x)$  significa  $\langle y, z - x \rangle \leq f(z) - f(x)$  para todo  $z$ , es decir  $f^*(y) = \sup_z \{ \langle y, z \rangle - f(z) \} \leq \langle y, x \rangle - f(x)$ , lo que combinado con Fenchel–Young da la igualdad.  $\square$

## 6.3. Ejemplos en una dimensión

Ejemplo paradigmático de cálculo en  $\mathbb{R}$ .

**Ejemplo 6.3.1** (Cuadrática  $f(x) = \frac{1}{2}x^2$ ).

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left\{ yx - \frac{1}{2}x^2 \right\}.$$

El supremando es estrictamente cóncavo; anulando la derivada,  $y - x = 0$  da  $x = y$ . Por tanto

$$f^*(y) = \frac{1}{2}y^2.$$

La cuadrática euclídea es *autodual*:  $(\frac{1}{2}\|\cdot\|^2)^* = \frac{1}{2}\|\cdot\|^2$  (también en  $\mathbb{R}^n$ ).

**Ejemplo 6.3.2** (Valor absoluto  $f(x) = |x|$ ).

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}} \{ yx - |x| \}.$$

- Si  $|y| \leq 1$ , entonces  $yx \leq |y| |x| \leq |x|$ , de modo que  $yx - |x| \leq 0$  con igualdad en  $x = 0$ ; el supremo es 0.
- Si  $|y| > 1$ , tomando  $x \rightarrow +\infty$  (si  $y > 1$ ) o  $x \rightarrow -\infty$  (si  $y < -1$ ) el supremando crece sin cota.

Luego  $f^*(y) = \delta_{[-1,1]}(y)$ , el indicador del intervalo  $[-1, 1]$ . El conjugado de una función de valor finito puede ser un indicador, y recíprocamente: el conjugado del indicador  $\delta_{[-1,1]}$  es  $\sigma_{[-1,1]}(y) = |y|$ .

**Ejemplo 6.3.3** (Exponencial  $f(x) = e^x$ ).

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}} \{yx - e^x\}.$$

- Si  $y > 0$ , el supremando es cóncavo;  $y - e^x = 0$  da  $x = \ln y$  y  $f^*(y) = y \ln y - y$ .
- Si  $y = 0$ ,  $f^*(0) = \sup_x \{-e^x\} = 0$  (límite cuando  $x \rightarrow -\infty$ ).
- Si  $y < 0$ , al hacer  $x \rightarrow -\infty$  se tiene  $yx \rightarrow +\infty$  y  $e^x \rightarrow 0$ , luego el supremo es  $+\infty$ .

Por tanto

$$f^*(y) = \begin{cases} y \ln y - y, & y > 0, \\ 0, & y = 0, \\ +\infty, & y < 0. \end{cases}$$

Esta es la *entropía de Gibbs* (a menos de signo y constante). Obsérvese que  $f$  es convexa y cerrada pero su dominio  $\text{dom } f^* = [0, +\infty)$  no es abierto.

## 6.4. Propiedades principales

Concentramos las reglas de cálculo y los grandes teoremas.

**Proposición 6.4.1** (reglas de cálculo). *Sea  $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$  propias,  $A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  lineal,  $a \in \mathbb{R}^n$ ,  $b \in \mathbb{R}$   $\lambda > 0$ .*

- (a) **Conjugada de una función afín.** Si  $\ell(x) = \langle a, x \rangle + b$ , entonces  $\ell^*(y) = \delta_{\{a\}}(y) - b$ .

- (b) **Postcomposición lineal.**  $(f \circ A)^*(y) = f^*(y)$  si  $A$  es sobreyectiva, evaluada en la imagen; en general  $(f \circ A)^*(y) = \inf\{f^*(z) : A^\top z = y\}$ , con  $+\infty$  si el conjunto es vacío.
- (c) **Suma con término afín.**  $(f + \langle a, \cdot \rangle + b)^*(y) = f^*(y - a) - b$ .
- (d) **Reescalado positivo.**  $(\lambda f)^*(y) = \lambda f^*\left(\frac{y}{\lambda}\right)$ .
- (e) **Conjugado del indicador.**  $\delta_C^* = \sigma_C$ .
- (f) **Convolución infimal.**  $(f \square g)(x) := \inf_z \{f(z) + g(x - z)\}$  satisface  $(f \square g)^* = f^* + g^*$ .

El resultado central, que justifica llamar a  $f^*$  una *dualidad involutiva* en el mundo convexo cerrado:

**Teorema 6.4.1** (biconjugación de Fenchel–Moreau). *Sea  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$  propia. Entonces  $f^{**} = \text{cl conv } f$ , la cerradura de la envoltura convexa de  $f$ . En particular,*

$$f^{**} = f \iff f \text{ es convexa, propia y cerrada.}$$

Así, la operación  $f \mapsto f^*$  es una *involución* sobre el cono de las funciones convexas propias cerradas.

**Teorema 6.4.2** (caracterización del subdiferencial). *Para  $f$  convexa propia cerrada,*

$$\partial f(x) = \{y : f(x) + f^*(y) = \langle x, y \rangle\}.$$

*Además  $y \in \partial f(x) \iff x \in \partial f^*(y)$ : el subdiferencial de  $f$  y de  $f^*$  son inversos (gráficas inversas).*

## 6.5. La dualidad de Fenchel–Rockafellar

Consideremos dos funciones convexas propias y una aplicación lineal  $A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ . El *problema primal* es

$$(P) \quad p^* = \inf_{x \in \mathbb{R}^n} \{f(x) + g(Ax)\}.$$

Su *problema dual de Fenchel–Rockafellar* es

$$(D) \quad d^* = \sup_{y \in \mathbb{R}^m} \{-f^*(-A^\top y) - g^*(y)\}.$$

**Teorema 6.5.1** (dualidad débil). *Siempre  $p^* \geq d^*$ . Si  $p^* = -\infty$  entonces  $d^* = -\infty$ , y si  $d^* = +\infty$  entonces  $p^* = +\infty$  (el primal es infactible).*

**Teorema 6.5.2** (dualidad fuerte de Fenchel–Rockafellar). *Supongamos que se cumple una condición de calificación, por ejemplo*

$$0 \in \text{int}(\text{dom } g - A \text{ dom } f),$$

*donde int denota el interior relativo. Entonces*

$$\inf_x \{f(x) + g(Ax)\} = \sup_y \{-f^*(-A^\top y) - g^*(y)\},$$

*y el supremo dual se alcanza cuando es finito. Además, si  $y^*$  es un optimizador dual, cualquier  $x^*$  que verifique  $-A^\top y^* \in \partial f(x^*)$  y  $y^* \in \partial g(Ax^*)$  es óptimo del primal.*

La descomposición  $f + g \circ A$  es *universal*: cualquier problema convexo se escribe así tomando  $g = \delta_C$  (restricción  $Ax \in C$ ),  $g = \delta_{\{0\}}$  (restricción  $Ax = b$ ), etcétera. De ahí que la fórmula dual anterior cubra toda la programación convexa.

## 6.6. Del conjugado al Lagrangiano

Mostramos cómo el *Lagrangiano* ordinario emerge naturalmente de la conjugación a partir de una *función de perturbación*.

**Definición 6.6.1** (función de perturbación). Dada (P) con  $\inf_x \{f(x) + g(Ax)\}$ , definimos

$$F(x, u) = f(x) + g(Ax - u), \quad (x, u) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m,$$

de modo que  $F(x, 0) = f(x) + g(Ax)$  es el objetivo primal.

La idea de Rockafellar es tratar  $u$  como una *perturbación* de la restricción  $Ax - u = 0$  y *Lagrangianizar* esa perturbación.

**Definición 6.6.2** (Lagrangiano de Rockafellar). El *Lagrangiano* asociado a la perturbación  $F$  es

$$L(x, y) = \inf_{u \in \mathbb{R}^m} \{ F(x, u) + \langle y, u \rangle \}.$$

**Proposición 6.6.1** (expresión explícita del Lagrangiano). *Para  $F(x, u) = f(x) + g(Ax - u)$ ,*

$$L(x, y) = f(x) + \langle A^\top y, x \rangle - g^*(-y).$$

*Demostración.* Sustituyendo y haciendo el cambio  $z = Ax - u$  (i.e.  $u = Ax - z$ ):

$$\begin{aligned} L(x, y) &= f(x) + \inf_z \{g(z) + \langle y, Ax - z \rangle\} \\ &= f(x) + \langle A^\top y, x \rangle + \inf_z \{g(z) - \langle y, z \rangle\} \\ &= f(x) + \langle A^\top y, x \rangle - g^*(-y), \end{aligned}$$

pues  $\inf_z \{g(z) - \langle y, z \rangle\} = -\sup_z \{\langle y, z \rangle - g(z)\} = -g^*(-y)$ . □

*Observación 6.6.1* (caso de restricción explícita). Si  $g = \delta_C$ , entonces  $g^* = \sigma_C$  y

$$L(x, y) = f(x) + \langle A^\top y, x \rangle - \sigma_C(-y), \quad y \in \text{dualidad de } C.$$

En particular, con  $C = \{b\}$  (restricción  $Ax = b$ ) se tiene  $\sigma_{\{b\}}(-y) = -\langle y, b \rangle$  y se recupera el Lagrangiano clásico

$$L(x, y) = f(x) + \langle y, Ax - b \rangle.$$

**Proposición 6.6.2** (recuperación del dual de Fenchel–Rockafellar). *La función objetivo dual  $\varphi(y) = \inf_x L(x, y)$  verifica*

$$\varphi(y) = -f^*(-A^\top y) - g^*(-y),$$

*de modo que el problema dual  $\sup_y \varphi(y)$  es exactamente el problema (D) de la Sección 6.5 (con el cambio  $y \mapsto -y$ ). Así el Lagrangiano genera la dualidad de Fenchel–Rockafellar.*

*Demostración.*  $\inf_x L(x, y) = \inf_x \{f(x) + \langle A^\top y, x \rangle\} - g^*(-y) = -f^*(-A^\top y) - g^*(-y)$ , usando  $\inf_x \{f(x) + \langle A^\top y, x \rangle\} = -\sup_x \{\langle -A^\top y, x \rangle - f(x)\} = -f^*(-A^\top y)$ . □

El papel del conjugado es, pues, sustituir una *restricción* ( $Ax \in C$ ) por una *variable de precio*  $y$  y un *término de holgura*  $\langle y, Ax \rangle - \sigma_C(-y)$ : el Lagrangiano es la formulación suavizada (dual) del problema.

## 6.7. Lagrangiano aumentado

El Lagrangiano ordinario puede fallar en tener buenas propiedades de diferenciabilidad en el dual (el dual  $\varphi(y)$  es, en general, sólo cóncavo y no suave). La *augmentación* consiste en añadir a la perturbación un *término proximal cuadrático* en  $u$ .

**Definición 6.7.1** (Lagrangiano aumentado). Con parámetro de penalización  $\rho > 0$ , el *Lagrangiano aumentado* asociado a  $F$  es

$$L_\rho(x, y) = \inf_{u \in \mathbb{R}^m} \left\{ F(x, u) + \langle y, u \rangle + \frac{\rho}{2} \|u\|^2 \right\}.$$

Para  $\rho \rightarrow 0^+$  se recupera el Lagrangiano ordinario: la cuota  $\frac{\rho}{2} \|u\|^2$  sólo penaliza las grandes perturbaciones  $u \neq 0$ , pero al evaluar en  $u = 0$  (restricción satisfecha) no modifica el objetivo primal.

**Proposición 6.7.1** (caso de restricción de igualdad). Sea  $g = \delta_{\{0\}}$  (restricción  $Ax = 0$ , i.e.  $Ax = b$  tras trasladar). Entonces  $F(x, u) = f(x) + \delta_{\{0\}}(Ax - u)$  obliga a  $u = Ax$  y

$$L_\rho(x, y) = f(x) + \langle y, Ax - b \rangle + \frac{\rho}{2} \|Ax - b\|^2.$$

Éste es el Lagrangiano aumentado de Hestenes–Powell: un Lagrangiano ordinario más un término de penalización cuadrática sobre la violación de la restricción.

**Proposición 6.7.2** (caso de restricción de desigualdad). Sea  $g = \delta_C$  con  $C = \mathbb{R}_{\leq 0}^m$  (restricción  $Ax \leq 0$ ). Resolviendo el problema proyectado en  $u$  se obtiene

$$L_\rho(x, y) = f(x) + \sum_{i=1}^m \frac{1}{2\rho} \left[ (\max\{0, y_i + \rho(Ax)_i\})^2 - y_i^2 \right],$$

que es la forma de Hestenes–Powell–Rockafellar para desigualdades, basada en el operador  $\max\{0, \cdot\}$  (proyección sobre el ortante no positivo).

**Teorema 6.7.1** (dual aumentada y regularización de Moreau). *Sea  $p(u) = \inf_x F(x, u)$  la función valor primal perturbada. El objetivo dual aumentado es*

$$\varphi_\rho(y) = \inf_x L_\rho(x, y) = \inf_u \left\{ p(u) + \langle y, u \rangle + \frac{\rho}{2} \|u\|^2 \right\},$$

*de modo que, bajo las hipótesis habituales,*

$$\boxed{\varphi_\rho(y) = -\left(\frac{1}{\rho}\right) \text{Me}(p^*)(-y)}$$

*es esencialmente la envolvente de Moreau–Yosida del dual ordinario  $p^*$ . En consecuencia:*

1.  $\varphi_\rho$  es diferenciable incluso si el dual ordinario no lo es (la envolvente de Moreau suaviza);
2.  $\nabla \varphi_\rho(y) = u_\rho(y)$ , donde  $u_\rho(y)$  es el minimizador del inf, que satisface  $y + \rho u_\rho(y) \in \partial(-p)(u_\rho(y))$ ;
3. el método de los multiplicadores  $y_{k+1} = y_k + \rho h(x_{k+1})$  (con  $h(x) = Ax - b$  en el caso de igualdad) es exactamente un paso de gradiente sobre  $\varphi_\rho$ .

El esquema iterativo es el del *método de los multiplicadores* de Hestenes y Powell:

$$x_{k+1} \in \arg \min_x L_\rho(x, y_k), \quad y_{k+1} = y_k + \rho h(x_{k+1}),$$

que combina la *robustez* del método de penalización (la cuota  $\frac{\rho}{2} \|h\|^2$  evita la divergencia del parámetro de penalización) con la *precisión* del Lagrangiano (la actualización del multiplicador corrige la estimación del precio  $y$ ). Bajo la dualidad fuerte de la Sección 6.5 este esquema converge a un punto de silla de  $L_\rho$ .

## 6.8. Nota contextual e histórica

El concepto de *función conjugada* fue introducido por **W. Fenchel** en su trabajo sobre geometría convexa y teoría de la medida (Fenchel,

*On conjugate convex functions*, Canad. J. Math., 1949), buscando un análogo, en el mundo convexo, de la *transformada de Legendre* de la mecánica analítica (Hamilton, siglo XIX). La transformada de Legendre  $p \mapsto \sup_x \{px - H(p)\}$  describe el paso de un Hamiltoniano a su representación en los momentos conjugados; el conjugado de Fenchel es precisamente esa idea, generalizada a funciones no diferenciables mediante el supremo en lugar del cambio de variables  $y = \nabla f(x)$ .

La sistematización definitiva se debe a **R. T. Rockafellar**, quien en *Convex Analysis* (1970) reformuló toda la optimización convexa como una teoría de *funciones conjugadas* y *dualidad vía perturbaciones*. Allí establece que el Lagrangiano es un objeto derivado de la conjugación, no un artefacto del cálculo vectorial: dado un problema primal  $\inf_x F(x, 0)$  con perturbación  $F$  convexa, el Lagrangiano  $L(x, y) = \inf_u \{F(x, u) - \langle y, u \rangle\}$  produce automáticamente el dual  $\sup_y -F^*(0, y)$ , unificando los Lagrangianos de la programación lineal, no lineal y con restricciones de cono. Por ello la dualidad de este documento se denomina *de Fenchel–Rockafellar*: Fenchel aporta la transformada, Rockafellar la teoría perturbacional que la conecta con el Lagrangiano.

El *Lagrangiano aumentado* nació de forma independiente en **M. R. Hestenes** (1969) y **M. J. D. Powell** (1969) para problemas con restricciones de igualdad, y fue generalizado a todo problema convexo por **R. T. Rockafellar** en *The multiplier method of Hestenes and Powell applied to convex programming* (J. Opt. Theory Appl., 1973). La intuición geométrica es transparente desde el conjugado: la augmentación cuadrática es exactamente la *regularización de Moreau–Yosida* del problema dual, es decir, el reemplazo del conjugado  $p^*$  por su envolvente suavizada. Esto explica por qué el método de los multiplicadores converge sin enviar el parámetro de penalización  $\rho$  a infinito (como sí lo requiere el método de penalización puro de Courant): la suavización de Moreau *regulariza el dual* en lugar de *endurecer el primal*.

El marco de Fenchel–Rockafellar es hoy el lenguaje estándar de la optimización convexa moderna (cf. Bauschke & Combettes, *Convex Analysis and Monotone Operator Theory in Hilbert Spaces*, 2017; Rockafellar & Wets, *Variational Analysis*, 1998), y subyace a algoritmos tan diversos como ADMM (el cual es precisamente un *algoritmo de Douglas–Rachford sobre el dual aumentado*), los métodos de punto proximal y toda la teoría

de operadores monotonos.

# Capítulo 7

## Perspectivas

---

Para concluir nuestra breve introducción, damos unas sugerencias que permitirán al lector ir más allá en el tema y/o descubrir otros campos relacionados. Se puede referir también a [4].

### 7.1. Optimización matemática

El análisis convexo es fundamental en la teoría de la optimización, especialmente en problemas de programación matemática. Las funciones convexas y los conjuntos convexos permiten modelar y resolver problemas de minimización o maximización con restricciones, garantizando la existencia de soluciones globales óptimas. Por ejemplo, en **programación convexa**, se minimiza una función convexa sobre un conjunto convexo, lo que asegura convergencia a soluciones globales.

$$\begin{aligned} &\text{Minimizar } f(x) \\ &\text{Sujeto a } g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m \\ &\quad \quad h_j(x) = 0, \quad j = 1, \dots, p, \end{aligned}$$

donde  $f$  es convexa y  $g_i, h_j$  son funciones convexas.

### 7.2. Control y sistemas dinámicos

En teoría de control, el análisis convexo se aplica para estabilizar sistemas dinámicos y diseñar controladores robustos. Los **conos tangentes** y las **funciones de Lyapunov convexas** son herramientas clave para analizar la estabilidad asintótica y diseñar estrategias de control óptimo.

### 7.3. Aprendizaje automático

En aprendizaje automático, el análisis convexo es esencial en algoritmos como **Support Vector Machines (SVM)** y **regresión logística**. Las SVM, por ejemplo, buscan el hiperplano que maximice el margen entre clases, lo que se formula como un problema de optimización convexa. La convexidad garantiza que el algoritmo encuentre la solución globalmente óptima.

$$\min_{w,b} \frac{1}{2} \|w\|^2 \quad \text{sueto a} \quad y_i(w \cdot x_i + b) \geq 1 \quad \forall i.$$

### 7.4. Economía y finanzas

En economía, el análisis convexo se utiliza para modelar preferencias de agentes económicos, funciones de producción y problemas de equilibrio general. Por ejemplo, las **funciones de utilidad cuasi-convexas** permiten analizar decisiones bajo incertidumbre, mientras que la convexidad de las funciones de costo es clave en la teoría de la firma.

### 7.5. Teoría de juegos

En teoría de juegos, los conceptos de convexidad son centrales para analizar equilibrios de Nash en juegos no cooperativos. Las estrategias mixtas y las funciones de pago convexas permiten demostrar la existencia de equilibrios y estudiar su estabilidad.

### 7.6. Geometría y computación

En geometría computacional, el análisis convexo se aplica en algoritmos de **envueltas convexas** (como el algoritmo de Graham) y en problemas de localización de puntos. La convexidad permite diseñar algoritmos eficientes para encontrar soluciones aproximadas o exactas en conjuntos de datos de alta dimensionalidad.

## 7.7. Procesamiento de señales e imágenes

En procesamiento de imágenes, técnicas como la **reconstrucción convexa** y la **regularización total variación (TV)** se basan en la convexidad para minimizar artefactos y mejorar la calidad de la imagen. Estas técnicas son fundamentales en tomografía, resonancia magnética y reconstrucción 3D.

## 7.8. Teoría de la información

En teoría de la información, las funciones convexas como la **entropía relativa** (o divergencia de Kullback-Leibler) son herramientas esenciales para analizar la capacidad de canales de comunicación y diseñar códigos eficientes.

## 7.9. Mecánica e física no lineal y no suave

## 7.10. Optimización de forma



# Apéndice A

## Lema de Baire

---

### Enunciado

**Teorema A.0.1** (Lema de Baire). *Sea  $X$  un espacio métrico completo. Si  $\{F_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  es una familia numerable de subconjuntos cerrados de  $X$  tales que*

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n = X,$$

*entonces existe al menos un  $n \in \mathbb{N}$  para el cual  $\text{int}(F_n) \neq \emptyset$ .*

### Origen

El **Lema de Baire** fue demostrado por el matemático francés **René-Louis Baire** (1874–1932) en su tesis doctoral “*Sur les fonctions de variables réelles*” (1899). Baire estudió propiedades de funciones discontinuas en  $\mathbb{R}$  y, en ese contexto, demostró que un espacio métrico completo no puede expresarse como unión numerable de conjuntos cerrados sin puntos interiores (conjuntos *ninguna parte densa*).

- **Contexto histórico:** A finales del siglo XIX, el análisis matemático se centraba en entender la estructura de funciones y conjuntos en  $\mathbb{R}$ . El lema surgió como una herramienta clave para analizar conjuntos “grandes” en el sentido topológico.

### Aplicaciones

El Lema de Baire es una herramienta fundamental en topología, análisis funcional y teoría de conjuntos. Algunas de sus aplicaciones más importantes son:

## Teoría de la categoría de Baire

Un espacio métrico completo se dice de **segunda categoría** si no puede escribirse como unión numerable de conjuntos *ninguna parte densa* (cerrados sin interior). El Lema de Baire implica que **todo espacio métrico completo es de segunda categoría en sí mismo**.

## Demostración de existencia en análisis

Se utiliza para probar que ciertos conjuntos son no vacíos o densos. Por ejemplo:

- En el **Teorema de Banach-Steinhaus** (análisis funcional), se demuestra que si una familia de operadores lineales acotados en un espacio de Banach está puntualmente acotada, entonces está uniformemente acotada. El Lema de Baire es clave en la prueba.
- En el **Teorema de la aplicación abierta**, que afirma que toda aplicación lineal sobreyectiva entre espacios de Banach es abierta.

## Conjuntos densos y aproximación

Demuestra que ciertos conjuntos son densos en un espacio. Por ejemplo:

- El conjunto de los números irracionales es denso en  $\mathbb{R}$ .
- En espacios de funciones, el conjunto de las funciones continuas puede ser denso en ciertos espacios métricos.

## Topología y espacios de funciones

En el espacio  $C([0, 1])$  de las funciones continuas en  $[0, 1]$  con la métrica del supremo, el Lema de Baire ayuda a probar que ciertos subconjuntos (como el de las funciones diferenciables) son **magros** (unión numerable de conjuntos *ninguna parte densa*), lo que implica que son “pequeños” en el sentido topológico.

## Ejemplo concreto

**Ejemplo A.0.1.** Demostrar que  $\mathbb{R}$  no puede escribirse como unión numerable de conjuntos cerrados sin puntos interiores.

**Solución:** Supongamos que  $\mathbb{R} = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ , donde cada  $F_n$  es cerrado y  $\text{int}(F_n) = \emptyset$ . Dado que  $\mathbb{R}$  es un espacio métrico completo, por el Lema de Baire, algún  $F_n$  debe tener interior no vacío, lo que contradice la hipótesis. Por lo tanto,  $\mathbb{R}$  no puede expresarse como unión numerable de conjuntos cerrados sin puntos interiores.

## Intuición

El Lema de Baire captura la idea de que un espacio completo es “grande”: no puede cubrirse con una unión numerable de conjuntos “pequeños” (cerrados sin interior). Esto refleja que los espacios completos tienen una estructura topológica robusta, donde los conjuntos “delgados” no pueden acumularse para formar todo el espacio.



# Apéndice B

## Newton and Clarke

---

### B.1. Motivación y contexto

El método clásico de Newton–Raphson resuelve  $F(x) = 0$  con  $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  *suavemente diferenciable* mediante

$$x_{k+1} = x_k - [F'(x_k)]^{-1}F(x_k),$$

donde  $F'(x_k)$  es la Jacobiana. Bajo hipótesis de regularidad y de no singularidad, la convergencia es *cuadrática*:  $\|x_{k+1} - x^*\| = O(\|x_k - x^*\|^2)$ .

En optimización y análisis numérico, sin embargo, las ecuaciones que aparecen rara vez son suaves: funciones de valor, resoluciones de proyección, leyes de complementariedad, términos de penalización con valor absoluto o de **max/min**. Un Newton clásico no se aplica directamente, pues el objeto sustituto de la derivada (*subdiferencial generalizado*) es una *multifunción*  $J_F(x) \subseteq \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ . La pregunta es:

*¿Bajo qué condiciones un paso de Newton construido con un elemento cualquiera de  $J_F(x_k)$  conserva convergencia superlineal?*

El método de *Newton semi-suave* responde afirmativamente. La idea, debida a **Mifflin** (1977) y sistematizada por **Qi y Sun** (1993), es exigir que  $F$  no sea simplemente localmente Lipschitz, sino que su aproximación lineal por elementos del subdiferencial de Clarke tenga un resto *de orden superior al primer orden*, es decir, que el error de linealización sea  $o(\|h\|)$  uniformemente. Esta condición – la *semi-suavidad* – es notablemente más débil que la diferenciabilidad y, al mismo tiempo, suficiente para recuperar convergencia superlineal.

## B.2. Elementos de análisis no diferenciable

Sea  $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  *localmente Lipschitz*. Por el teorema de Rademacher,  $F$  es diferenciable en casi todo  $x$ . El *subdiferencial generalizado de Clarke* en  $x$  es

$$\partial_C F(x) = \text{co} \left\{ \lim_{i \rightarrow \infty} F'(x_i) : x_i \rightarrow x, F \text{ diferenciable en } x_i \right\},$$

donde  $\text{co}$  denota la envoltura convexa. Cada  $J \in \partial_C F(x)$  es una matriz  $m \times n$ , y la multifunción  $x \mapsto \partial_C F(x)$  es *semi-continua superior* con valores no vacíos, convexos y compactos.

Cuando  $F$  es continuamente diferenciable,  $\partial_C F(x) = \{F'(x)\}$  y se recupera el caso clásico. Para  $f(x) = |x|$ ,  $\partial_C f(x) = \{\text{sgn}(x)\}$  si  $x \neq 0$  y  $\partial_C f(0) = [-1, 1]$ .

**Definición B.2.1** (semi-suavidad, Qi-Sun 1993).  $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  localmente Lipschitz es *semi-suave* en  $x$  si para todo  $h \rightarrow 0$  y todo  $J \in \partial_C F(x+h)$  se cumple

$$F(x+h) - F(x) - Jh = o(\|h\|).$$

Es  $\alpha$ -*semi-suave* ( $0 < \alpha \leq 1$ ) si el resto es  $O(\|h\|^{1+\alpha})$ , y *fuertemente semi-suave* si el resto es  $O(\|h\|^2)$ .

*Observación B.2.1.* La semi-suavidad es *más fuerte* que la direccional diferenciable y *más débil* que la diferenciable continua. Las funciones convexas, cóncavas y las funciones *piecewise*  $C^1$  (como  $|\cdot|$ , máx, mín, proyecciones sobre politopos) son semi-suaves.

**Definición B.2.2** (función de BD-regularidad).  $F$  es *BD-regular* en  $x^*$  (de *B-diferenciabilidad*) si todo  $J \in \partial_C F(x^*)$  es no singular. Se denomina *constante de BD-regularidad* a

$$\sigma_{\min}^* := \inf_{J \in \partial_C F(x^*)} \sigma_{\min}(J) > 0.$$

## B.3. El algoritmo de Newton semi-suave

*Algoritmo B.3.1* (Newton semi-suave puro).

**Entrada**  $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  localmente Lipschitz, punto inicial  $x_0 \in \mathbb{R}^n$ , tolerancia  $\varepsilon > 0$ .

**Paso**  $k \geq 0$  Calcular  $r_k := F(x_k)$ .

1. Escoger  $J_k \in \partial_C F(x_k)$ .
2. Resolver  $J_k d_k = -r_k$  (sistema lineal).
3. Actualizar  $x_{k+1} = x_k + d_k$ .
4. Si  $\|F(x_{k+1})\| \leq \varepsilon$ , parar.

La diferencia con el Newton clásico es exclusivamente el paso **(a)**: en lugar de la Jacobiana, se usa *cualquier* elemento del subdiferencial de Clarke. En la práctica esto significa que se elige una *sección activa* adecuada (por ejemplo, el signo de  $x_k$  para  $|x_k|$ , los restricciones activas para la proyección sobre un politopo) y se deriva formalmente como si la función fuera afín por piezas.

**Teorema B.3.1** (convergencia local superlineal, Qi–Sun 1993). *Sea  $x^*$  solución de  $F(x) = 0$ . Supóngase:*

- (I)  $F$  es semi-suave en un entorno de  $x^*$ ;
- (II)  $F$  es BD-regular en  $x^*$  (todo  $J \in \partial_C F(x^*)$  es no singular).

*Entonces, si  $x_0$  es suficientemente cercano a  $x^*$ , la sucesión generada por el Algoritmo 1 está bien definida y converge superlinealmente a  $x^*$ :*

$$\boxed{\|x_{k+1} - x^*\| = o(\|x_k - x^*\|)}.$$

*Si además  $F$  es  $\alpha$ -semi-suave, la convergencia es de orden  $1 + \alpha$ ; si es fuertemente semi-suave, es cuadrática.*

*Esquema de demostración.* Por BD-regularidad,  $\|J_k^{-1}\| \leq M$  en un entorno. Usando  $F(x^*) = 0$  y la semi-suavidad en  $x_k - x^*$ :

$$\begin{aligned} x_{k+1} - x^* &= x_k - J_k^{-1} F(x_k) - x^* \\ &= J_k^{-1} (J_k(x_k - x^*) - F(x_k) + F(x^*)) \\ &= J_k^{-1} (F(x_k) - F(x^*) - J_k(x_k - x^*)) = J_k^{-1} o(\|x_k - x^*\|). \end{aligned}$$

Tomando normas,  $\|x_{k+1} - x^*\| \leq M o(\|x_k - x^*\|) = o(\|x_k - x^*\|)$ . El caso  $\alpha$ -semi-suave se obtiene reemplazando  $o(\|h\|)$  por  $O(\|h\|^{1+\alpha})$ .  $\square$

*Observación B.3.1* (variantes globales). Para garantizar convergencia *global* (desde  $x_0$  lejano) se añade una *búsqueda lineal* o una *función de mérito*: típicamente  $\Theta(x) = \frac{1}{2}\|F(x)\|^2$ , con criterio de Armijo  $\Theta(x_k + \tau d_k) \leq \Theta(x_k) + c\tau \nabla \Theta(x_k)^\top d_k$ . Esto produce el *Newton semi-suave globalizado*; la convergencia superlineal se conserva una vez que la iteración entra en la vecindad de  $x^*$ .

## B.4. Ejemplo en dimensión uno

**Ejemplo B.4.1** (resolución de  $|x| + 2x - 5 = 0$ ). Sea  $F(x) = |x| + 2x - 5$ . La función es semi-suave (es afín por piezas) y su raíz se obtiene a mano: para  $x \geq 0$ ,  $x + 2x - 5 = 0 \Rightarrow x^* = 5/3$ . Veamos cómo opera el método.

**Subdiferencial de Clarke.**

$$\partial_C F(x) = \begin{cases} \{3\}, & x > 0, \\ \{-1\}, & x < 0, \\ [1, 3], & x = 0. \end{cases}$$

En  $x^* = 5/3 > 0$ , el único elemento es  $J = 3$  (no singular);  $F$  es BD-regular y de hecho *fuertemente semi-suave* en un entorno de  $x^*$  (es afín allí), luego la convergencia es *cuadrática*.

**Iteración.** Tomamos  $x_0 = 2$ .

$$\begin{aligned} k = 0 : \quad J_0 = 3, \quad d_0 = -\frac{F(2)}{3} = -\frac{1}{3}, \quad x_1 = 2 - \frac{1}{3} = \frac{5}{3}. \\ k = 1 : \quad F\left(\frac{5}{3}\right) = 0, \quad \text{fin.} \end{aligned}$$

Converge en *un solo paso* desde cualquier  $x_0 > 0$ , porque  $F$  es exactamente afín en ese semieje. Si  $x_0 < 0$ , un paso envía

$$x_1 = x_0 - \frac{|x_0| + 2x_0 - 5}{-1} = x_0 - (-x_0 + 2x_0 - 5) = 5 - 2x_0,$$

que para  $x_0 < 0$  es  $5 - 2x_0 > 0$ , y la segunda iteración aterriza exactamente en  $x^*$ . La semi-suavidad garantiza que el número de pasos es *finito* para funciones afín por piezas.

**Ejemplo B.4.2** (raíz no trivial de  $F(x) = \max\{0, x\} + \frac{1}{2}x - 1$ ). Equivalentemente  $F(x) = \max\{0, x\} + \frac{1}{2}x - 1$ . Para  $x \geq 0$ :  $x + \frac{1}{2}x - 1 = 0 \Rightarrow x^* = 2/3$ . Aquí

$$\partial_C F(x) = \begin{cases} \{3/2\}, & x > 0, \\ \{1/2\}, & x < 0, \\ [1/2, 3/2], & x = 0. \end{cases}$$

Tomando  $x_0 = 1$ :  $J_0 = 3/2$ ,  $F(1) = 1 + \frac{1}{2} - 1 = \frac{1}{2}$ ,  $d_0 = -\frac{1}{3}$ ,  $x_1 = 2/3 = x^*$ : un solo paso. Tomando  $x_0 = -2$ :  $J_0 = 1/2$ ,  $F(-2) = 0 - 1 - 1 = -2$ ,  $d_0 = 4$ ,  $x_1 = 2 > 0$ ; en el paso siguiente se alcanza  $x^*$ . De nuevo, convergencia finita.

## B.5. Desigualdades variacionales penalizadas

### B.5.1. Formulación general

Dado un espacio de Hilbert  $V$  (real, separable), un operador  $A : V \rightarrow V^*$  y un conjunto cerrado convexo  $K \subseteq V$ , la *desigualdad variacional* (DV) consiste en hallar  $u \in K$  tal que

$$(DV) \quad \langle Au - f, v - u \rangle \geq 0 \quad \forall v \in K.$$

Cuando  $K$  se describe por restricciones (por ejemplo,  $K = \{v : \Psi(v) \leq 0\}$ ), una estrategia de penalización reemplaza la restricción por un *operador de penalización*  $P_\rho : V \rightarrow V$  de Nemytskii del tipo *proyección suave*, por ejemplo

$$P_\rho(u) = \frac{1}{\rho} \Pi_C(\rho \Psi(u)),$$

con  $\Pi_C$  la proyección (de Moreau) sobre un cono  $C$  apropiado. El *problema penalizado* es entonces la ecuación

$$(DV_\rho) \quad F_\rho(u) := Au - f + P_\rho(u) = 0 \quad \text{en } V^*.$$

Resolver  $F_\rho(u) = 0$  es un problema *no diferenciable*, pero *semi-suave* bajo hipótesis razonables: el operador  $P_\rho$  es composición de un operador de proyección (semi-suave) con  $\Psi$  (suave), y por tanto hereda la semi-suavidad. El método de Newton semi-suave es el caballo de batalla natural.

### B.5.2. Ejemplo en dimensión finita

**Ejemplo B.5.1** (complementariedad lineal penalizada). Consideremos el problema de complementariedad lineal  $w = Mx + q \geq 0$ ,  $x \geq 0$ ,  $x^\top w = 0$ , con  $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ,  $q \in \mathbb{R}^n$ . Equivale a la DV sobre  $K = \mathbb{R}_+^n$  con  $A(x) = Mx + q$ . Una penalización estándar (de tipo *función de Fischer–Burmeister penalizada*) es

$$F_\rho(x) = Mx + q + \rho \phi(x), \quad \phi_i(x) = \sqrt{x_i^2 + w_i(x)^2} - x_i - w_i(x),$$

con  $w(x) = Mx + q$ . Cada  $\phi_i$  es semi-suave (composición de funciones semi-suaves: raíz, norma, suma); el subdiferencial de Clarke se calcula por reglas de la cadena no diferenciable.

**Subdiferencial.** En el caso regular ( $x_i + w_i \neq 0$ ),

$$\frac{\partial \phi_i}{\partial x_j} = \left( \frac{x_i}{\sqrt{x_i^2 + w_i^2}} - 1 \right) \delta_{ij} + \left( \frac{w_i}{\sqrt{x_i^2 + w_i^2}} - 1 \right) M_{ij}.$$

En el caso degenerado  $x_i = w_i = 0$ , el subdiferencial de Clarke es un conjunto convexo de matrices que se obtiene por límites de las fórmulas anteriores. El paso de Newton semi-suave resuelve

$$J_k d_k = -(Mx_k + q + \rho \phi(x_k)), \quad x_{k+1} = x_k + d_k,$$

con  $J_k \in \partial_C F_\rho(x_k)$ . Bajo la hipótesis de  $P$ -matriz ( $M$  tiene todos los menores principales positivos),  $F_\rho$  es BD-regular y el método es localmente superlineal.

### B.5.3. Ejemplo en dimensión infinita

**Ejemplo B.5.2** (obstáculo elíptico penalizado). Sea  $\Omega \subset \mathbb{R}^d$  abierto acotado con frontera Lipschitz,  $V = H_0^1(\Omega)$ ,  $f \in L^2(\Omega)$  y  $\psi \in H^1(\Omega)$  un obstáculo. La DV del obstáculo es: hallar  $u \in K$  tal que

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla (v - u) dx \geq \int_{\Omega} f (v - u) dx \quad \forall v \in K,$$

con  $K = \{v \in H_0^1(\Omega) : v \geq \psi\}$ . Equivalentemente, con  $A = -\Delta$  (en forma débil), se busca  $u \in K$  con  $\langle Au - f, v - u \rangle \geq 0$ .

**Penalización de Moreau–Yosida.** Se reemplaza la restricción  $u \geq \psi$  por un término de penalización sobre la *parte negativa*  $[u - \psi]^- = \min\{0, u - \psi\}$ :

$$(P_\rho) \quad -\Delta u_\rho - f - \frac{1}{\rho} [u_\rho - \psi]^- = 0 \quad \text{en } \Omega, \quad u_\rho|_{\partial\Omega} = 0.$$

La función  $F_\rho(u) = -\Delta u - f - \frac{1}{\rho} [u - \psi]^-$  actúa de  $H_0^1(\Omega)$  en  $H^{-1}(\Omega)$ . El operador de Nemytskii  $u \mapsto [u - \psi]^- = \min\{0, u - \psi\}$  es *semi-suave* de  $L^2(\Omega)$  en  $L^2(\Omega)$  (composición del mín semi-suave con  $u - \psi$  suave), y de  $H_0^1(\Omega) \hookrightarrow L^{2^*}(\Omega)$  en  $L^2(\Omega)$  bajo las inclusiones de Sobolev pertinentes.

**Subdiferencial de Clarke del operador de penalización.** En casi todo  $x \in \Omega$ ,

$$J_\rho(x) = \begin{cases} -\frac{1}{\rho}, & u(x) < \psi(x), \\ 0, & u(x) > \psi(x), \\ \in [-\frac{1}{\rho}, 0], & u(x) = \psi(x). \end{cases}$$

El subdiferencial de Clarke del operador de Nemytskii es el operador de multiplicación por una función  $\beta_\rho \in L^\infty(\Omega)$  con  $\beta_\rho(x) \in [-1/\rho, 0]$  casi en todo  $x$ . El paso de Newton semi-suave resuelve, en cada iteración, la PDE lineal

$$-\Delta d_k + \beta_{\rho,k} d_k = -(-\Delta u_k - f - \frac{1}{\rho} [u_k - \psi]^-), \quad d_k|_{\partial\Omega} = 0,$$

con  $\beta_{\rho,k} \in \partial_C P_\rho(u_k)$ , y actualiza  $u_{k+1} = u_k + d_k$ . La PDE lineal es una *ecuación de reacción-difusión* con coeficiente variable; su resolución es un problema elíptico standard.

**Convergencia.** Bajo las hipótesis:

- (I)  $u_\rho^*$  solución de  $(P_\rho)$  tal que la *medida del conjunto de contacto*  $\mathcal{C} = \{x : u_\rho^*(x) = \psi(x)\}$  es positiva pero el operador de Newton es no singular en  $u_\rho^*$  (*condición de regularidad del contacto*);
- (II) el operador de penalización es *fuertemente semi-suave* en  $u_\rho^*$  (satisfecho para  $[\cdot]^-$ );

el método de Newton semi-suave es *localmente superlineal* en  $H_0^1(\Omega)$ . Además, cuando  $\rho \downarrow 0$ ,  $u_\rho^* \rightarrow u^*$  en  $H_0^1(\Omega)$  con

$$\|u_\rho^* - u^*\|_{H^1} \leq C\sqrt{\rho}$$

(estimación clásica de penalización de Moreau–Yosida), de modo que una estrategia habitual es aplicar Newton semi-suave para varios  $\rho_k \downarrow 0$ , usando la solución previa como inicialización del siguiente.

*Observación B.5.1* (estrategia de continuación en  $\rho$ ). En la práctica se resuelve  $(P_{\rho_k})$  con Newton semi-suave para  $\rho_0 \gg \rho_1 \gg \dots \rightarrow 0$ , tomando  $u^{(k-1)}$  como  $u_0^{(k)}$ . Cada subproblema converge superlinealmente (o cuadráticamente), y el costo por paso es el de una resolución elíptica lineal, lo que hace al esquema competitivo con los métodos multigrid de frontera libre.

## B.6. Origen histórico

El método de Newton semi-suave tiene tres raíces históricas:

1. **Análisis no diferenciable (Clarke, 1975–1983).** F. H. Clarke introduce el subdiferencial generalizado para funciones localmente Lipschitz en *Optimization and Nonsmooth Analysis* (1983), dando el lenguaje adecuado para hablar de “derivadas” de funciones no suaves. Sin esta herramienta no podría formularse el método.
2. **Semi-suavidad (Mifflin, 1977).** R. Mifflin, en *Semismooth and semiconvex functions in constrained optimization* (SIAM J. Control Optim., 1977), define por primera vez la noción de *función semi-suave* como una condición intermedia entre diferenciabilidad y continuidad Lipschitz. Su motivación eran algoritmos de optimización no diferenciable con búsqueda lineal; la convergencia superlineal no estaba aún demostrada.
3. **Método de Newton semi-suave (Qi y Sun, 1993).** L. Qi y J. Sun, en *A nonsmooth version of Newton’s method* (Math. Programming, 1993), unifican los trabajos anteriores y demuestran el teorema de convergencia local superlineal del Algoritmo 1. Este artículo es el punto

de partida de toda la literatura moderna sobre Newton semi-suave y constituye la extensión canónica del método de Newton al mundo no diferenciable.

Las extensiones posteriores son inmediatas:

- **Newton semi-suave globalizado** con función de mérito y búsqueda lineal (De Luca, Facchinei y Pang, 1996), fundamental para la convergencia desde cualquier inicialización.
- **Métodos inexactos** con resolución aproximada del sistema lineal (error  $\|J_k d_k + F(x_k)\| \leq \eta_k$ ,  $\eta_k \rightarrow 0$ ): conservan convergencia superlineal si  $\eta_k = o(\|F(x_k)\|)$ .
- **Generalización a espacios de Hilbert** (Hintermüller, Ito, Kunisch, 2002; Ulbrich, 2011), clave para problemas en dimensión infinita como el del obstáculo penalizado.
- **Newton semi-suave para DV de segunda leyenda** (facchinei y Pang, *Finite-Dimensional Variational Inequalities and Complementarity Problems*, 2003), que recubre complementariedad, juegos de Nash, equilibrios de mercado, etc.

## B.7. Convergencia: cuadro resumen

Reunimos las hipótesis y los órdenes de convergencia en un cuadro.

| Hipótesis sobre $F$ en $x^*$            | Tipo de Newton                | Orden de convergencia |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| $C^1$ , $F'$ no singular                | Newton clásico                | cuadrático            |
| semi-suave + BD-regular                 | Newton semi-suave             | superlineal           |
| $\alpha$ -semi-suave + BD-regular       | Newton semi-suave             | de orden $\alpha$     |
| fuertemente semi-suave + BD-regular     | Newton semi-suave             | cuadrático            |
| semi-suave + BD-regular + paso inexacto | Newton semi-suave inexacto    | superlineal           |
| semi-suave + BD-regular + globalización | Newton semi-suave globalizado | global                |

**Proposición B.7.1** (estimación de error residual). *Bajo las hipótesis del Teorema de Qi–Sun, existe  $C > 0$  tal que*

$$\|F(x_{k+1})\| \leq C \|F(x_k)\|^{1+\alpha}$$

*si  $F$  es  $\alpha$ -semi-suave, y  $\|F(x_{k+1})\| \leq C \|F(x_k)\|^2$  si es fuertemente semi-suave. Esto da un criterio práctico de parada basado en el residuo en lugar de la distancia (desconocida) a  $x^*$ .*

*Observación B.7.1* (comparación con métodos del gradiente). Un método de punto fijo  $x_{k+1} = G(x_k)$  con  $G$  contractiva tiene convergencia *lineal* ( $\|e_{k+1}\| \leq q \|e_k\|$  con  $q < 1$ ). El Newton semi-suave, al precio de resolver un sistema lineal por paso, obtiene *superlinealidad*:  $q_k \rightarrow 0$ . El equilibrio costo/paso vs. número de pasos es favorable cuando la factorización del Jacobiano es accesible (dimensión finita moderada, o mallas finitas en dimensión infinita).

## B.8. Nota final: por qué importa

El método de Newton semi-suave es, en la práctica, el *resolver por excelencia* de las DV penalizadas y de los problemas de complementariedad. Su atractivo reside en tres puntos:

1. **Universalidad de la semi-suavidad.** Los operadores de proyección, las funciones de complementariedad (Fischer–Burmeister, min/max), las penalizaciones de Moreau–Yosida y muchos operadores de Nemytskii en EDP son semi-suaves. El mismo algoritmo cubre todos estos casos.
2. **Convergencia superlineal demostrada.** A diferencia de los métodos del gradiente proyectado o de Uzawa, la convergencia es del mismo orden que la del Newton clásico, con hipótesis razonables.
3. **Implementación práctica.** En dimensión finita el paso se reduce a resolver un sistema lineal con una matriz construida eligiendo el subgradiente adecuado (reglas de activación); en dimensión infinita, a una *EDP lineal* por paso, integrable con cualquier solver elíptico estándar.

---

El marco está hoy consolidado en los libros de referencia de Facchinei y Pang (2003, dimensión finita) y de Ulbrich (*Semismooth Newton Methods for Variational Inequalities and Constrained Optimization Problems*, 2011, dimensión infinita), y es la base de los solvers modernos de complementariedad y de frontera libre (cf. Hintermüller, Ito, Kunisch, 2002, para el obstáculo; Biegler et al., 2009, para optimización con restricciones de complementariedad).



# Apéndice C

## Newton convexo

---

### C.1. ¿Por qué la subdiferencial de Clarke y no la clásica?

La pregunta es legítima: si las funciones que aparecen en optimización son, con frecuencia, convexas, ¿no bastaría con la subdiferencial clásica de Rockafellar? La respuesta es matizada: *en el caso estrictamente convexo las dos subdiferenciales coinciden*, pero el Newton semi-suave se diseñó para tratar operadores *no convexos* que aparecen de forma natural en complementariedad, en DV penalizadas y en EDP no lineales. Examinemos los tres puntos clave.

#### C.1.1. La subdiferencial clásica exige convexidad

**Definición C.1.1** (subdiferencial clásica de Rockafellar). Sea  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$  convexa propia. La *subdiferencial clásica* en  $x \in \text{dom } f$  es

$$\partial f(x) = \{ s \in \mathbb{R}^n : \langle s, y - x \rangle \leq f(y) - f(x) \ \forall y \in \mathbb{R}^n \}.$$

*Observación C.1.1.* Esta definición se basa en la *desigualdad de subgradiente*, que es equivalente a decir que el hiperplano afín  $h(y) = f(x) + \langle s, y - x \rangle$  es un *soporte global* de  $f$  desde abajo. Tal soporte global existe precisamente porque  $f$  es convexa. Si  $f$  no es convexa, el conjunto puede ser vacío o no contener la *información direccional* necesaria para linealizar.

#### C.1.2. En el caso convexo, Clarke y Rockafellar coinciden

**Teorema C.1.1** (coincidencia para funciones convexas). Si  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$  es convexa propia y localmente Lipschitz en un entorno de

$x \in \text{int}(\text{dom } f)$ , entonces

$$\partial_C f(x) = \partial f(x).$$

*Idea.* Para  $f$  convexa localmente Lipschitz, el subdiferencial de Clarke se construye como la envoltura convexa de los límites de gradientes  $\nabla f(x_i)$  con  $x_i \rightarrow x$ . Por el teorema de Aleksandrov,  $f$  es dos veces diferenciable en casi todo punto, y los límites de gradientes coinciden con los subgradiientes de Rockafellar. Recíprocamente, todo  $s \in \partial f(x)$  es límite de gradientes en puntos de diferenciabilidad (por densidad), luego  $s \in \partial_C f(x)$ .  $\square$

**Observación C.1.2. Consecuencia práctica.** En el caso convexo *no hay diferencia* entre usar Clarke y Rockafellar: la teoría de Qi–Sun se aplica con la subdiferencial clásica sin modificación. La distinción sólo es relevante cuando aparecen funciones *no convexas*.

### C.1.3. El problema aparece con funciones no convexas

El campo de aplicación principal del Newton semi-suave incluye funciones que *no son convexas*, por ejemplo:

**Ejemplo C.1.1** (función de Fischer–Burmeister).

$$\phi(a, b) = \sqrt{a^2 + b^2} - a - b, \quad \phi(a, b) = 0 \iff a \geq 0, b \geq 0, ab = 0.$$

La función  $\phi$  *no es convexa*: su Hessiano (donde existe) tiene autovalores de signos opuestos. La subdiferencial clásica *no está definida* para ella. La de Clarke sí:

$$\partial_C \phi(a, b) = \text{co} \left\{ \lim_i \nabla \phi(a_i, b_i) : (a_i, b_i) \rightarrow (a, b), (a_i, b_i) \neq (0, 0) \right\}.$$

Otros ejemplos: operadores de Nemytskii de EDP no lineales, composiciones anidadas de máx / mín no convexas, funciones de complementariedad no lineal, residuos de KKT con restricciones de desigualdad activas, etc. En todos estos casos, la subdiferencial clásica *no existe como herramienta*.

### C.1.4. Comparación de las tres subdiferenciales

|                              | Rockafellar $\partial$ | Clarke $\partial_C$         | Morduk       |
|------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|
| Definida para                | sólo convexas          | toda Lipschitz local        | toda Lips    |
| Valores                      | convexos compactos     | convexos compactos          | <i>no co</i> |
| Reglas de la cadena          | sólo mundo convexo     | sí, robustas                | sí, má       |
| ¿Coincide si $f$ es convexa? | —                      | sí, $\partial_C = \partial$ | s            |
| ¿Apta para Newton s.s.?      | sólo si todo convexo   | <b>sí, estándar</b>         | posible, m   |

*Observación C.1.3* (por qué no Mordukhovich). La subdiferencial *limitante* de Mordukhovich  $\partial_L$  es más fina (más pequeña) que la de Clarke y está definida también para funciones no convexas. Pero sus valores *no son convexos*, lo que complica la selección de un elemento para el paso de Newton y la formulación de la BD-regularidad. Por eso el marco estándar de Qi–Sun usa Clarke: es el compromiso natural entre *precisión* y *tratabilidad* (valores convexos compactos + buen cálculo).

### C.1.5. Síntesis

**En una frase:** si te restringieras exclusivamente a problemas convexos, podrías usar la subdiferencial clásica (y de hecho coincide con la de Clarke). Pero el Newton semi-suave se inventó precisamente para tratar operadores *no convexos* —Fischer–Burmeister, complementariedad, Nemytskii de EDP—, y para esos la clásica simplemente no existe. Clarke es el mínimo marco que cubre todos los casos a la vez.

## C.2. Adaptación del Newton semi-suave al caso convexo

Cuando *todo* el problema es convexo, la estructura se simplifica considerablemente. Mostramos la adaptación paso a paso.

### C.2.1. Marco de trabajo

A lo largo de esta sección,  $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  (o  $F : V \rightarrow V^*$  con  $V$  espacio de Hilbert real) satisface:

- (I)  $F$  es *maximal monótona*, i.e.  $F = \partial\Phi$  para alguna  $\Phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$  convexa propia cerrada (caso de potencial), o más generalmente  $F$  es maximal monótona;
- (II)  $F$  es localmente Lipschitz (de modo que  $\partial_C F$  está bien definida);
- (III)  $F$  es semi-suave en un entorno de la solución  $x^*$  (definición de Qi-Sun con  $\partial_C$ ).

Por el Teorema de la Sección 1.2,  $\partial_C F(x) = \partial F(x)$  cuando  $F$  es de potencial convexo, de modo que el Newton semi-suave se formula con la subdiferencial clásica sin pérdida.

*Observación C.2.1.* La monotonía maximal aporta una propiedad crucial: *si  $x^*$  existe, es único* (pues  $\langle F(x) - F(x^*), x - x^* \rangle \geq 0$  con igualdad sii  $x = x^*$  cuando  $F^{-1}(0) \neq \emptyset$ ). En el caso general no convexo, la unicidad no está garantizada y la convergencia es local a una solución *particular*.

### C.2.2. El algoritmo en el caso convexo

*Algoritmo C.2.1* (Newton semi-suave convexo).

**Entrada**  $F = \partial\Phi$  maximal monótona y semi-suave,  $x_0 \in \mathbb{R}^n$ , tolerancia  $\varepsilon > 0$ .

**Paso**  $k \geq 0$  1. Calcular  $r_k := F(x_k)$ .

- 2. Escoger  $J_k \in \partial F(x_k)$  (*subdiferencial clásica*).
- 3. Resolver  $J_k d_k = -r_k$ .
- 4. Actualizar  $x_{k+1} = x_k + d_k$ .
- 5. Si  $\|F(x_{k+1})\| \leq \varepsilon$ , parar.

*Observación C.2.2.* La única diferencia con el algoritmo general de Qi-Sun es el paso **(b)**: se reemplaza  $\partial_C$  por  $\partial$ . Por la coincidencia del Teorema de la Sección 1.2, esto es legítimo *sólo en el caso convexo*. La ventaja práctica: la subdiferencial clásica es a menudo más fácil de calcular porque aprovecha la estructura de potencial.

### C.2.3. Convergencia en el caso convexo

**Teorema C.2.1** (convergencia superlineal, caso convexo). *Bajo las Hipótesis de la Sección 2.1, y si además:*

- (I)  *$F$  es BD-regular en  $x^*$  (todo  $J \in \partial F(x^*) = \partial_C F(x^*)$  es no singular);*
- (II)  *$F$  es semi-suave en  $x^*$ ,*

*entonces, para  $x_0$  suficientemente cercano a  $x^*$ , la sucesión del Algoritmo 2 converge superlinealmente y la solución  $x^*$  es única:*

$$\|x_{k+1} - x^*\| = o(\|x_k - x^*\|), \quad x^* \text{ único.}$$

*Demostración.* La demostración es idéntica a la del caso general (Teorema de Qi–Sun, Sección 2 de la nota anterior): se usa  $\partial_C F = \partial F$  y la semi-suavidad para obtener

$$x_{k+1} - x^* = J_k^{-1}(F(x_k) - F(x^*) - J_k(x_k - x^*)) = J_k^{-1} o(\|x_k - x^*\|),$$

y la BD-regularidad da  $\|J_k^{-1}\| \leq M$ . La *unicidad* de  $x^*$  es la única novedad: proviene de la monotonía estricta de  $F = \partial\Phi$ , que implica  $\langle F(x) - F(x^*), x - x^* \rangle \geq 0$  con igualdad sii  $F(x) = F(x^*) = 0$  y entonces  $x = x^*$ .  $\square$

### C.2.4. Ventajas estructurales del caso convexo

Más allá de la coincidencia  $\partial_C = \partial$ , el caso convexo ofrece varias simplificaciones:

1. **Cálculo simplificado.** Para un potencial  $\Phi$ ,  $F = \partial\Phi$  y el Jacobiano generalizado  $J_k$  es un elemento del subdiferencial del gradiente, que se obtiene por las reglas clásicas del análisis convexo (sin necesidad del cálculo no diferenciable de Clarke). En particular, las reglas de la cadena *son igualdades* (no inclusiones) bajo regularidad.
2. **Monotonía y estabilidad.** Cada  $J_k$  es *monótono positivo semidefinido* (pues  $J_k \in \partial F(x_k)$  y  $F$  monótona implica  $\langle J_k h, h \rangle \geq 0$ ). Esto da estabilidad numérica al sistema lineal  $J_k d_k = -r_k$ : se puede usar Cholesky o CG.

3. **Unicidad de la solución.** En el caso convexo,  $x^*$  es único (monotonía estricta de  $\partial\Phi$ ), de modo que no hay riesgo de converger a un mínimo local no deseado.
4. **Función de mérito natural.** El residual  $\Theta(x) = \frac{1}{2}\|F(x)\|^2$  es *convexo* (pues  $F$  es monótona y  $\|\cdot\|^2$  convexa no decreciente), lo que simplifica la globalización con búsqueda lineal: cualquier punto de mínimo de  $\Theta$  es un cero de  $F$ .
5. **Conexión con el método del punto proximal.** En el caso convexo, el Newton semi-suave se interpreta como una *linealización del operador proximal*  $\text{prox}_{\tau\Phi}(x) = (\text{Id} + \tau\partial\Phi)^{-1}(x)$ , que es contractivo; esto da una demostración alternativa de la convergencia y un puente con los métodos de operador monótono de Rockafellar.

### C.2.5. Ejemplo: problema del obstáculo como caso convexo

**Ejemplo C.2.1** (obstáculo elíptico, caso convexo). Retomamos el problema del obstáculo de la nota anterior: hallar  $u \in K = \{v \in H_0^1(\Omega) : v \geq \psi\}$  tal que

$$\langle -\Delta u - f, v - u \rangle \geq 0 \quad \forall v \in K.$$

Este problema es la condición de optimalidad del funcional convexo

$$\Phi(v) = \frac{1}{2}\|\nabla v\|_{L^2}^2 - \langle f, v \rangle + \delta_K(v),$$

donde  $\delta_K$  es el indicador convexo. El operador  $F(u) = -\Delta u - f + \partial\delta_K(u)$  es maximal monótono (suma de operador lineal monótono y subdiferencial de función convexa propia cerrada).

Tras la penalización de Moreau–Yosida con  $P_\rho(u) = -\frac{1}{\rho}[u - \psi]^-$ , el operador

$$F_\rho(u) = -\Delta u - f - \frac{1}{\rho}[u - \psi]^-$$

sigue siendo *maximal monótono* (composición de operadores monótonos). El subdiferencial clásico del operador de penalización coincide con el de Clarke, y los  $J_k$  son operadores de multiplicación por funciones  $\beta_{\rho,k} \in [-1/\rho, 0]$ , que son *negativos semidefinidos*; al sumar  $-\Delta$  (definido

positivo) el operador  $J_k = -\Delta + \beta_{\rho,k}\text{Id}$  es *definido positivo* y por tanto *automáticamente no singular*. La BD-regularidad es *gratuita* en este caso convexo.

Por tanto, el Newton semi-suave converge superlinealmente a  $u_\rho^*$  *único* desde cualquier inicialización suficientemente cercana, sin necesidad de verificar la BD-regularidad a mano. La globalización es, además, robusta:  $\Theta(u) = \frac{1}{2}\|F_\rho(u)\|_{H^{-1}}^2$  es convexa.

### C.3. Referencia canónica para el caso convexo

La referencia de cabecera para el Newton semi-suave en el caso convexo (optimización convexa en dimensión finita e infinita, con estructura de operador monótono y subdiferencial clásica) es:

**K. Ito y K. Kunisch,**

*Lagrange Multiplier Approach to the Variational Problems of PDEs*, Birkhäuser (Springer), Series: Progress in Nonlinear Differential Equations and Their Applications, vol. 15, 2008.

**Capítulos clave:** Cap. 8 (Semismooth Newton Methods) y Cap. 9 (Applications to Variational Inequalities).

**Por qué es la referencia canónica:**

- Está dedicada específicamente al caso *convexo* (variational inequalities, optimal control con restricciones convexas, EDP elípticas y parabólicas), donde el operador es maximal monótono y la subdiferencial es la de Rockafellar.
- Desarrolla la teoría en *dimensión infinita* (espacios de Hilbert), que es el marco natural para EDP.
- Presenta el Newton semi-suave como linealización del operador de complementariedad / activación, con demostraciones completas de convergencia superlineal.

- Incluye aplicaciones detalladas: obstáculo, control óptimo con restricciones puntuales, contacto en elasticidad, flows incompresibles.

### Referencias complementarias:

1. **M. Hintermüller, K. Ito, K. Kunisch**, “The primal-dual active set strategy as a semismooth Newton method”, *SIAM J. Optim.*, 13(3), 865–888, 2002.  
Artículo fundamental donde se reformula el problema del obstáculo convexo como Newton semi-suave y se demuestra la convergencia superlineal usando la estructura monótona.
2. **R. T. Rockafellar**, “Monotone operators and the proximal point algorithm”, *SIAM J. Control Optim.*, 14(5), 877–898, 1976.  
Marco teórico de los operadores monótonos maximales en optimización convexa; la base estructural que aprovecha el Newton semi-suave convexo.
3. **R. T. Rockafellar, R. J.-B. Wets**, *Variational Analysis*, Springer, 1998, Cap. 13 (subdiferenciales) y Cap. 12 (monotonía).  
Referencia general para la subdiferencial clásica y su cálculo en el caso convexo.
4. **L. Qi, J. Sun**, “A nonsmooth version of Newton’s method”, *Math. Programming*, 58, 353–367, 1993.  
Artículo original del método (caso general, no necesariamente convexo); incluye el caso convexo como caso particular.

### C.3.1. Lectura recomendada

Para un lector interesado en el caso convexo, el itinerario natural es:

1. **Rockafellar (1976)** para el marco de operadores monótonos y el método del punto proximal;
2. **Qi–Sun (1993)** para la definición de semi-suavidad y el teorema de convergencia general;
3. **Hintermüller–Ito–Kunisch (2002)** para el caso prototípico del obstáculo convexo en dimensión infinita;

4. **Ito–Kunisch (2008)** como referencia exhaustiva (libro) para el caso convexo con aplicaciones a EDP.

## C.4. Resumen ejecutivo

| Caso general (Qi–Sun)                                     | Caso convexo (Ito–Kunisch)                                        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| $\partial_C$ de Clarke                                    | $\partial$ de Rockafellar (= $\partial_C$ por coincidencia)       |
| $F$ localmente Lipschitz, semi-suave                      | $F = \partial\Phi$ maximal monótona, semi-suave                   |
| BD-regularidad a verificar                                | BD-regularidad a menudo <i>gratuita</i> (monotonía + coercividad) |
| Solución posiblemente no única                            | Solución <i>única</i> (monotonía estricta)                        |
| $J_k$ no necesariamente definido                          | $J_k$ <i>positivo semidefinido</i> (estabilidad numérica)         |
| $\Theta(x) = \frac{1}{2}\ F(x)\ ^2$ no convexa en general | $\Theta(x)$ <i>convexa</i> (globalización más simple)             |
| Referencia: Qi–Sun (1993), Facchinei–Pang (2003)          | Referencia: Ito–Kunisch (2008), Hintermüller et al. (2002)        |

**Conclusión práctica.** Si tu problema es convexo (DV de obstáculo, complementariedad lineal con  $P$ -matriz, control óptimo con restricciones convexas), puedes usar la subdiferencial clásica de Rockafellar, aprovechar la monotonía para simplificar el cálculo y la estabilidad, y remitirte a Ito–Kunisch (2008) como referencia. Si tu problema contiene funciones no convexas (Fischer–Burmeister, Nemytskii no lineal, KKT mixto), necesitas Clarke y la teoría general de Qi–Sun (1993).



# Apéndice D

## Más sobre conjuntos convexos

---

Los conjuntos convexos son fundamentales en geometría computacional, optimización y aprendizaje automático. Su estudio permite resolver problemas complejos mediante estructuras bien definidas y propiedades robustas. La importancia de estos conjuntos radica en su capacidad para modelar fenómenos reales de manera eficiente, desde la planificación de rutas hasta la clasificación de datos. Además, su definición intuitiva —un conjunto donde el segmento entre dos puntos cualesquiera siempre está contenido— facilita su aplicación en algoritmos y teoremas. En la práctica, los conjuntos convexos aparecen en problemas de minimización, donde garantizan la existencia de soluciones óptimas. Su utilidad se extiende también a la robótica, el procesamiento de imágenes y la inteligencia artificial, donde sirven como herramientas clave para el análisis y la toma de decisiones.

La cáscara convexa, (*convex hull*), es una de las aplicaciones más relevantes de estos conjuntos. Se trata del conjunto convexo más pequeño que contiene a un grupo dado de puntos, actuando como un envoltorio geométrico que preserva la estructura esencial del conjunto original. Este concepto es crucial en geometría computacional, donde permite resolver problemas como la detección de colisiones o la reconstrucción de superficies en tres dimensiones. En el aprendizaje automático, la cáscara convexa se utiliza para definir regiones de decisión en algoritmos de clasificación, como las máquinas de vectores de soporte. Su cálculo eficiente es posible gracias a algoritmos como el de Graham o QuickHull, que optimizan el proceso reduciendo la complejidad computacional. Además, su visualización intuitiva ayuda a comprender mejor la distribución de datos en espacios multidimensionales. Este capítulo explora tanto la teoría como las aplicaciones prácticas de los conjuntos convexos y la cáscara convexa. A través de ejemplos concretos y algoritmos, se busca proporcionar al lector una buena comprensión de estos conceptos.

## D.1. Definición y propiedades

Los conjuntos convexos son uno de los conceptos más poderosos en matemáticas, con aplicaciones que abarcan desde la optimización hasta el aprendizaje automático. Un conjunto es convexo si, intuitivamente, no presenta huecos ni entrantes: cualquier segmento de recta que una dos puntos del conjunto permanece completamente dentro de él. Esta propiedad, aparentemente simple, tiene implicaciones profundas en teoría y práctica, permitiendo resolver problemas de minimización, clasificación y modelado con garantías de eficiencia y robustez.

### D.1.1. Para empezar

En el marco de la geometría y el análisis funcional, los conjuntos convexos emergen como objetos fundamentales, definidos por la propiedad intrínseca de contener, junto con cualquier par de sus puntos, el segmento de recta que los une.

**Definición 12** (Conjunto convexo). *Un conjunto  $C \subseteq \mathbb{R}^n$  es **convexo** si, para todo  $x, y \in C$  y todo  $\lambda \in [0, 1]$ , se cumple que:*

$$\lambda x + (1 - \lambda)y \in C.$$

*En otras palabras, el conjunto contiene todos los puntos del segmento de recta que une  $x$  e  $y$ .*

**Ejemplo 16. Ejemplos clásicos de conjuntos convexos:**

- Un **segmento de recta** en  $\mathbb{R}^n$ :  $[a, b] = \{\lambda a + (1 - \lambda)b \mid \lambda \in [0, 1]\}$ .
- Un **disco** (o bola cerrada) en  $\mathbb{R}^2$ :  $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq r^2\}$ .
- Un **hiperplano** en  $\mathbb{R}^n$ :  $\{x \mid a^T x = b\}$ , donde  $a \in \mathbb{R}^n$  y  $b \in \mathbb{R}$ .
- El **espacio vectorial**  $\mathbb{R}^n$  en sí mismo.

**Teorema 13** (Intersección de conjuntos convexos). *Sea  $\{C_i\}_{i \in I}$  una familia de conjuntos convexos en  $\mathbb{R}^n$ . Entonces, su intersección  $\bigcap_{i \in I} C_i$  también es un conjunto convexo.*

*Demostración.* Sea  $x, y \in \bigcap_{i \in I} C_i$  y  $\lambda \in [0, 1]$ . Por definición de intersección,  $x, y \in C_i$  para todo  $i \in I$ . Como cada  $C_i$  es convexo,

$$\lambda x + (1 - \lambda)y \in C_i$$

para todo  $i \in I$ . Por lo tanto,  $\lambda x + (1 - \lambda)y \in \bigcap_{i \in I} C_i$ , lo que prueba que la intersección es convexa.  $\square$

**Definición 13** (Combinación convexa). Una **combinación convexa** de puntos  $x_1, x_2, \dots, x_k \in \mathbb{R}^n$  es una expresión de la forma:

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i x_i, \quad \text{donde } \lambda_i \geq 0 \quad y \quad \sum_{i=1}^k \lambda_i = 1.$$

### D.1.2. Interior y clausura de un conjunto convexo

Ahora exploramos propiedades esenciales de los conjuntos convexos: primero, su comportamiento respecto al interior y la clausura.

**Proposición 6.** Sea  $C \subseteq \mathbb{R}^n$  un conjunto convexo. Entonces, su interior  $\overset{\circ}{C}$  y su clausura  $\overline{C}$  son también conjuntos convexos.

*Demostración.* Veamos ambos casos.

Sean  $C \subseteq \mathbb{R}^n$  un conjunto convexo y  $\overset{\circ}{C}$  su interior. Queremos demostrar que  $\overset{\circ}{C}$  es convexo, es decir, que para todo  $x, y \in \overset{\circ}{C}$  y todo  $\lambda \in [0, 1]$ , el punto  $z = \lambda x + (1 - \lambda)y$  pertenece a  $\overset{\circ}{C}$ .

1. **Premisas:** Sean  $x, y \in \overset{\circ}{C}$ . Por definición de punto interior, existen bolas abiertas  $B(x, r_x) \subseteq C$  y  $B(y, r_y) \subseteq C$ , donde  $r_x, r_y > 0$ . Sea  $\lambda \in [0, 1]$ . Definimos  $z = \lambda x + (1 - \lambda)y$ .
2. **Construcción de la bola centrada en  $z$ :** Sea  $r = \min(r_x, r_y) > 0$ . Consideremos la bola abierta  $B(z, r)$ . Para todo  $w \in B(z, r)$ , escribimos  $w = z + v$ , donde  $\|v\| < r$ .
3. **Expresión de  $w$  como combinación convexa:** Observamos que:

$$w = z + v = \lambda x + (1 - \lambda)y + v.$$

Podemos descomponer  $v$  como:

$$v = \lambda v + (1 - \lambda)v,$$

donde  $\|v\| < r \leq r_x$  y  $\|v\| < r \leq r_y$ . Esto es posible porque  $r = \min(r_x, r_y)$ .

4. **Verificación de que  $w \in C$ :** Como  $B(x, r_x) \subseteq C$  y  $B(y, r_y) \subseteq C$ , entonces:

$$x + v \in B(x, r_x) \subseteq C \quad \text{y} \quad y + v \in B(y, r_y) \subseteq C.$$

Por convexidad de  $C$ , la combinación convexa:

$$\lambda(x + v) + (1 - \lambda)(y + v) = z + v = w$$

también está en  $C$ .

Dado que para todo  $w \in B(z, r)$  se tiene  $w \in C$ , entonces  $B(z, r) \subseteq C$ . Esto implica que  $z \in \overset{\circ}{C}$ . Como  $z$  es un punto arbitrario en el segmento  $[x, y]$ , se concluye que  $[x, y] \subseteq \overset{\circ}{C}$ .

Por lo tanto,  $\overset{\circ}{C}$  es un conjunto convexo.

**Caso de la clausura  $\overline{C}$ :** Sean  $x, y \in \overline{C}$  y  $\lambda \in [0, 1]$ . Existen sucesiones  $\{x_k\}$  e  $\{y_k\}$  en  $C$  tales que  $x_k \rightarrow x$  y  $y_k \rightarrow y$ . Definimos  $z_k = \lambda x_k + (1 - \lambda)y_k$ . Como  $C$  es convexo,  $z_k \in C$  para todo  $k$ . Además,  $z_k \rightarrow \lambda x + (1 - \lambda)y = z$ , por lo que  $z \in \overline{C}$ .  $\square$

## D.2. Conos convexos

### D.2.1. Definición

Un **cono** en un espacio vectorial real  $V$  es un subconjunto  $K \subseteq V$  que satisface:

- Si  $x \in K$  y  $\lambda \geq 0$ , entonces  $\lambda x \in K$ .
- Si  $x, y \in K$ , entonces  $x + y \in K$ .

Un cono  $K$  es **convexo** si es convexo como conjunto, es decir, si para todo  $x, y \in K$  y  $\lambda \in [0, 1]$ , se cumple:

$$\lambda x + (1 - \lambda)y \in K.$$

En particular, todo cono convexo es cerrado bajo combinaciones lineales no negativas de sus elementos.

Sea  $V$  un espacio vectorial real. Un subconjunto  $K \subseteq V$  es un **cono convexo** si:

1.  $K$  es un cono:  $\lambda x \in K$  para todo  $x \in K$  y  $\lambda \geq 0$ .
2.  $K$  es convexo:  $\lambda x + (1 - \lambda)y \in K$  para todo  $x, y \in K$  y  $\lambda \in [0, 1]$ .

### D.2.2. Ejemplos

1. **Cono positivo en  $\mathbb{R}^n$ :**

$$\mathbb{R}_+^n = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x_i \geq 0 \text{ para todo } i = 1, \dots, n\}.$$

Es un cono convexo, ya que la suma de vectores no negativos es no negativo y el producto por escalares no negativos preserva la no negatividad.

2. **Cono de Lorentz** (o cono de segundo orden):

$$L^n = \{(x_0, x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x_0 \geq \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}\}.$$

Este cono es convexo y juega un papel importante en optimización convexa.

3. **Cono de matrices semidefinidas positivas:**

$$\mathbb{S}_+^n = \{X \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid X = X^\top \text{ y } x^\top X x \geq 0 \text{ para todo } x \in \mathbb{R}^n\}.$$

Es un cono convexo en el espacio de matrices simétricas.

### D.2.3. Propiedades principales

Sea  $K \subseteq V$  un cono convexo. Entonces:

1.  $K$  es cerrado bajo combinaciones lineales no negativas:

$$\sum_{i=1}^m \lambda_i x_i \in K \quad \text{para todo } x_i \in K, \lambda_i \geq 0, m \in \mathbb{N}.$$

2. El **dual** de  $K$ , definido como

$$K^* = \{y \in V^* \mid \langle y, x \rangle \geq 0 \text{ para todo } x \in K\},$$

también es un cono convexo.

3. Si  $K$  es cerrado (en la topología apropiada), entonces  $(K^*)^* = K$ .
  - La propiedad de ser cerrado bajo combinaciones lineales no negativas es equivalente a la convexidad del cono.
  - El dual  $K^*$  permite caracterizar desigualdades lineales y es fundamental en programación convexa.

## D.3. Envoltura convexa

La **envoltura convexa** de un conjunto  $S \subseteq \mathbb{R}^n$  es un concepto fundamental en análisis convexo y optimización. Permite caracterizar los conjuntos convexos minimales que contienen a  $S$ , y entender sus propiedades geométricas y analíticas.

### D.3.1. Caracterización

Una definición posible de la envoltura (o cáscara) convexa es la siguiente.

**Definición 14** (Caracterización de la envoltura convexa). *Sea  $S \subseteq \mathbb{R}^n$ . Entonces,*

$$\text{conv}(S) = \left\{ \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i \mid x_i \in S, \lambda_i \geq 0, \sum_{i=1}^k \lambda_i = 1, k \in \mathbb{N} \right\},$$

es un conjunto convexo que contiene a  $S$ , y es el más pequeño en el sentido de la inclusión.

El teorema siguiente ilustra que existen dos caracterizaciones equivalentes de  $\text{conv}(S)$ : una por combinación convexa, y otra por intersección de conjuntos convexos que contienen a  $S$  (véase [5], [18], [25] por la demostración).

**Teorema 14** (Equivalencia por intersección). *Además, la envoltura convexa de  $S$  satisface la siguiente caracterización:*

$$\text{conv}(S) = \bigcap \{C \subseteq \mathbb{R}^n \mid \text{conv}(C) = C \text{ y } S \subseteq C\}.$$


El resultado siguiente, conocido como la *propiedad de los vértices*, también es un teorema (véase [16]).

**Teorema 15** (Propiedad de los vértices en dimensión 2). *En dimensión 2, si  $S$  es un conjunto finito de puntos en  $\mathbb{R}^2$ , entonces  $\text{conv}(S)$  es un polígono convexo cuyos vértices son un subconjunto de  $S$ .*

La figura D.1 ilustra la envoltura convexa de un conjunto de puntos en  $\mathbb{R}^2$ . En ella, los vértices del pentágono convexo están marcados con cuadrados negros, los puntos interiores con rombos rojos, y los puntos originales del conjunto  $S$  con círculos negros.

### D.3.2. Técnicas para calcular la envoltura convexa

A lo largo de los años, se han desarrollado numerosos métodos para calcular la envoltura convexa de un conjunto de puntos en el plano o en espacios de mayor dimensión. Las técnicas más antiguas, como el **método de fuerza bruta**, consisten en comparar todos los subconjuntos posibles de puntos, lo que resulta en una complejidad computacional extremadamente alta, del orden de  $O(n^4)$  en dos dimensiones. Una mejora significativa llegó con el algoritmo de **envuelto de regalo (Jarvis March, 1973)** que construye la envoltura convexa recorriendo los puntos en orden angular, alcanzando una complejidad de  $O(nh)$ , donde  $n$  es el número total de puntos y  $h$  el número de puntos en la envoltura. Con el avance de la computación y la necesidad de mayor eficiencia, surgieron



**Figura D.1:** Visualización de la envoltura convexa de un conjunto de puntos en  $\mathbb{R}^2$ .

algoritmos más sofisticados, como el **scan de Graham (1972)**, que ordena los puntos por ángulo polar y construye la envoltura en  $O(n \log n)$ , y el **QuickHull**, que emplea una estrategia de "divide y vencerás" con una complejidad promedio similar. Entre las técnicas modernas destacan algoritmos híbridos como el de **Chan** que combina ideas de Graham y QuickHull para lograr una complejidad de  $O(n \log h)$ , o el **Andrew's monotone chain** una variante optimizada del scan de Graham para conjuntos de puntos ordenados. Además, en contextos específicos o dimensiones superiores, se recurre a métodos basados en programación lineal o técnicas estocásticas.

### D.3.3. Algoritmo de Graham Scan

El **algoritmo de Graham Scan** es un método eficiente para calcular la **envoltura convexa** de un conjunto finito de puntos en el plano. Su complejidad es de  $O(n \log n)$ , donde  $n$  es el número de puntos en el conjunto  $S$ .

#### Idea general

El objetivo es encontrar el polígono convexo más pequeño que contiene todos los puntos de  $S \subseteq \mathbb{R}^2$ . La idea central es:

- **Ordenar los puntos** por su ángulo polar respecto a un **punto base** (generalmente el de menor coordenada  $y$ ).
- **Construir la envoltura** recorriendo los puntos ordenados y eliminando aquellos que no contribuyen a la convexidad.

## Etapas del algoritmo

### 1. Selección del punto base $p_0$ :

- Elegir el punto con la **coordenada  $y$  mínima** (y  $x$  mínima en caso de empate).
- Este punto **siempre pertenece** a la envoltura convexa.

### 2. Ordenamiento por ángulo polar:

- Calcular el ángulo que forma cada punto  $p_i$  con el punto base  $p_0$  usando la función `atan2`.
- Ordenar los puntos en **orden creciente de ángulo polar** respecto a  $p_0$ .
- Si dos puntos tienen el mismo ángulo, conservar el más lejano.

### 3. Construcción de la envoltura con una pila:

- Inicializar una pila con los primeros tres puntos ordenados ( $p_0, p_1, p_2$ ).
- Para cada punto  $p_i$  (desde  $p_3$  hasta  $p_{n-1}$ ):
  - a) Mientras el ángulo formado por los últimos tres puntos en la pila sea **mayor a  $180^\circ$**  (es decir, hay un "doblez hacia adentro"), eliminar el punto del medio de la pila.
  - b) Empujar  $p_i$  en la pila.
- Para verificar la convexidad entre tres puntos consecutivos  $A, B, C$  en la pila, calcular el **producto cruzado**:

$$\text{Producto cruzado} = (B_x - A_x)(C_y - B_y) - (B_y - A_y)(C_x - B_x)$$

- Si el producto cruzado es **negativo**, el ángulo en  $B$  es mayor a  $180^\circ$  (no convexo).

- Si es **cero**, los puntos son colineales.
- Si es **positivo**, el ángulo es menor a  $180^\circ$  (convexo).

### ¿Qué representa $n$ en la complejidad?

- $n$  es el **número total de puntos** en el conjunto  $S$ .
- La complejidad del algoritmo es  $O(n \log n)$ , debido principalmente al **ordenamiento por ángulo polar**.
- La construcción de la pila es  $O(n)$ , ya que cada punto se empuja y se saca como máximo una vez.

### Ejemplo paso a paso

Consideremos el conjunto de puntos

$$S = \{(0, 0), (1, 1), (2, 0), (1, -1), (0, 5, 0, 5)\}.$$

1. Punto base:  $p_0 = (0, 0)$ .
2. Ordenar por ángulo polar:  $(2, 0), (1, -1), (0, 5, 0, 5), (1, 1)$ .
3. Construcción de la pila:
  - Empujar  $(0, 0), (2, 0), (1, -1)$ .
  - Para  $(0, 5, 0, 5)$ : Verificar convexidad entre  $(0, 0), (2, 0), (1, -1)$ . Eliminar  $(2, 0)$ .
  - Empujar  $(0, 5, 0, 5)$ .
  - Para  $(1, 1)$ : Verificar convexidad entre  $(0, 0), (0, 5, 0, 5), (1, -1)$ . Empujar  $(1, 1)$ .
4. Envoltura convexa final:  $[(0, 0), (0, 5, 0, 5), (1, 1), (1, -1)]$ .

### D.3.4. Algoritmo QuickHull

El **algoritmo QuickHull** es un método eficiente para calcular la envoltura convexa de un conjunto de puntos en el plano, basado en una estrategia de **divide y vencerás**. Su nombre proviene de su similitud con el algoritmo de ordenamiento **Quicksort**, ya que también utiliza una partición recursiva del conjunto de puntos para construir la envoltura convexa.

#### Idea general

La idea central del QuickHull es:

- Identificar los puntos que forman los vértices de la envoltura convexa mediante la búsqueda de los puntos más alejados de los segmentos que unen pares de puntos.
- Dividir recursivamente el conjunto de puntos en subconjuntos más pequeños, cada uno asociado a un segmento de la envoltura parcial, y repetir el proceso hasta que no queden puntos externos.

#### Etapas del algoritmo

##### 1. Inicialización:

- Encontrar los puntos con las **coordenadas  $x$  mínima y máxima** en el conjunto  $S$ . Estos puntos **siempre pertenecen** a la envoltura convexa.
- Estos dos puntos definen el **segmento inicial** de la envoltura convexa.

##### 2. División recursiva:

- Para cada segmento de la envoltura parcial (inicialmente, el segmento entre los puntos  $x_{\min}$  y  $x_{\max}$ ), encontrar el punto  $p$  más alejado del segmento.
- Este punto  $p$  es un nuevo vértice de la envoltura convexa.
- Dividir el conjunto de puntos en dos subconjuntos:

- Los puntos que están a la **izquierda** del triángulo formado por el segmento y  $p$ .
- Los puntos que están a la **derecha** del mismo triángulo.
- Repetir el proceso recursivamente para cada subconjunto.

### 3. Construcción final:

- Combinar los resultados de las divisiones recursivas para formar la envoltura convexa completa.

## Complejidad

- En el **caso promedio**, la complejidad del QuickHull es  $O(n \log n)$ , similar al scan de Graham.
- En el **peor caso** (por ejemplo, cuando los puntos están en un círculo), la complejidad puede degradarse a  $O(n^2)$ .
- Sin embargo, en la práctica, suele ser más rápido que otros algoritmos debido a su naturaleza recursiva y su capacidad para descartar grandes conjuntos de puntos en cada iteración.

## Ejemplo

Consideremos el conjunto de puntos

$$S = \{(0, 0), (1, 1), (2, 0), (1, -1), (0,5, 0,5)\}.$$

1. Puntos iniciales:  $x_{\min} = (0, 0)$  y  $x_{\max} = (2, 0)$ .
2. El punto más alejado del segmento  $(0, 0) - (2, 0)$  es  $(1, 1)$ .
3. Dividir  $S$  en dos subconjuntos:
  - Izquierda:  $\{(0, 0), (0,5, 0,5), (1, 1)\}$ .
  - Derecha:  $\{(2, 0), (1, -1), (0,5, 0,5)\}$ .
4. Repetir el proceso para cada subconjunto hasta obtener la envoltura convexa final:

$$[(0, 0), (1, 1), (2, 0), (1, -1)].$$

## Ventajas y limitaciones

- **Ventajas:** Rápido en la práctica, fácil de implementar, y eficiente para conjuntos de puntos dispersos.
- **Limitaciones:** En el peor caso, puede ser lento ( $O(n^2)$ ), y su rendimiento depende de la distribución de los puntos.

### D.3.5. Aplicaciones

La **envoltura convexa** (o cáscara convexa) es esencial en:

- **Geometría computacional:** Para problemas de colisión, localización de puntos y clustering.
- **Visión por computadora:** En reconstrucción 3D y reconocimiento de formas.
- **Robótica:** Para planificación de caminos y evitación de obstáculos.
- **Aprendizaje automático:** En clustering (por ejemplo, el algoritmo DBSCAN).

## D.4. Separación de convexos

En el contexto de la separación de conjuntos convexos, el resultado fundamental establece que, si dos conjuntos convexos son disjuntos, siempre existe un hiperplano que los separa. Este hiperplano actúa como una barrera en el espacio que permite distinguir claramente entre los elementos de un conjunto y los del otro, sin solapamientos.

## D.5. Para profundizar

Recomendamos al lector interesado en profundizar en el tema consultar las siguientes obras: [5], [16], [18], [25].



# Apéndice E

## Funciones convexas en dimensión finita

---

Este capítulo aborda el análisis de funciones convexas en dimensión finita, un concepto central en optimización, economía matemática y aprendizaje automático. Se estudian dos contextos principales: el caso general (no necesariamente continuo) y el caso continuo. Para cada contexto, se presentan definiciones, propiedades fundamentales, caracterizaciones de mínimos locales y globales, y herramientas como el subgradiente y la Hessiana.

### E.1. Caso general

Antes de abordar las propiedades específicas de las funciones convexas continuas, comenzaremos analizando el caso más general: funciones convexas que, aunque definidas sobre conjuntos convexas, no necesariamente cumplen con la propiedad de continuidad.

#### E.1.1. Definición, ejemplos y propiedades

“La convexidad es el lenguaje natural de la optimización y el análisis de funciones en espacios vectoriales.”

---

Adaptado de *Convex Analysis*  
(Rockafellar, 1970)

Las funciones convexas son un pilar fundamental en el análisis matemático, la optimización y la inteligencia artificial. Su definición, aunque

aparentemente simple, encierra profundas implicaciones geométricas y algebraicas, especialmente en espacios de dimensión finita. A continuación, exploramos esta noción desde sus bases hasta ejemplos concretos, destacando el papel del dominio extendido y su relación con la convexidad de conjuntos.

**Definición 15** (Función convexa en dimensión finita). *Una función*

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, +\infty]$$

es **convexa** si su **dominio extendido**  $\text{dom}(f) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) < +\infty\}$  es un conjunto convexo y, para todo  $x, y \in \text{dom}(f)$  y todo  $\lambda \in [0, 1]$ , se cumple:

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y).$$

El **dominio extendido**  $\text{dom}(f)$  incluye todos los puntos donde  $f$  no toma el valor  $+\infty$ . Este concepto es crucial porque:

- Permite manejar funciones definidas solo en subconjuntos específicos de  $\mathbb{R}^n$  (por ejemplo, restricciones en optimización).
- Garantiza que la desigualdad de convexidad se aplique **solo** a pares de puntos donde  $f$  está bien definida.


## Ejemplos ilustrativos

**Ejemplo 17** (Función valor absoluto:  $f(x) = |x|$ ). *Tiene las características siguientes.*

- **Dominio extendido:**  $\text{dom}(f) = \mathbb{R}$ .
- **Convexidad:** Cumple la desigualdad de convexidad (por desigualdad triangular):


$$|\lambda x + (1 - \lambda)y| \leq \lambda|x| + (1 - \lambda)|y|.$$

- **Visualización:**



**Ejemplo 18** (Función parte positiva:  $f(x) = \max(x, 0)$ ). Tiene las características siguientes.

- **Dominio extendido:**  $\text{dom}(f) = \mathbb{R}$ .
- **Convexidad:** se verifica directamente con la definición.
- **Visualización:**



**Ejemplo 19** (Función indicatriz de un conjunto convexo  $C$ ). Se define así:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in C, \\ +\infty & \text{si } x \notin C. \end{cases}$$

- **Dominio extendido:**  $\text{dom}(f) = C$ , que es convexo por definición.
- **Convexidad:** La desigualdad se cumple trivialmente (ambos lados son  $+\infty$  o  $0$ ).

**Ejemplo 20** (Función norma euclidiana). **Función norma euclidiana:** Se define por  $f(x) = \|x\|_2$ .

■ **Dominio extendido:**  $\text{dom}(f) = \mathbb{R}^n$ .

■ **Convexidad:** Desigualdad triangular:

$$\|\lambda x + (1 - \lambda)y\|_2 \leq \lambda\|x\|_2 + (1 - \lambda)\|y\|_2.$$

Las funciones convexas propias son un caso especialmente importante en optimización y análisis convexo, ya que combinan la convexidad con condiciones naturales sobre su dominio y valores. A continuación, presentamos su definición formal.

**Definición 16** (Función convexa propia). *Una función  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, +\infty]$  se denomina **convexa propia** si cumple las siguientes condiciones:*

1. **Convexidad:**  $f$  es convexa en el sentido usual:

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n, \forall \lambda \in [0, 1].$$

2. **Condición de no trivialidad:**  $f(x) < +\infty$  para al menos un  $x \in \mathbb{R}^n$  (es decir,  $\text{dom}(f) \neq \emptyset$ ).

El epígrafe de una función es, en términos sencillos, el 'volumen' o la región en el espacio que se forma por todos los puntos que están por encima de la gráfica de la función.

**Definición 17** (Epígrafe de una función). *El **epígrafe** de  $f$  se define como:*

$$\text{epi}(f) = \{(x, \alpha) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \mid f(x) \leq \alpha\}.$$

### Propiedades clave de funciones convexas

- **Cierre bajo sumas ponderadas:** Si  $f$  y  $g$  son convexas, entonces  $\alpha f + \beta g$  también lo es para  $\alpha, \beta \geq 0$ .
- **Subniveles convexas:** El conjunto  $\{x \mid f(x) \leq \alpha\}$  es convexo para todo  $\alpha \in \mathbb{R}$ .
- **Relación con la convexidad de conjuntos:** Una función es convexa si y solo si su **epígrafe** (conjunto de puntos por encima de su gráfica) es un conjunto convexo en  $\mathbb{R}^{n+1}$ .

## Transición a propiedades avanzadas

La convexidad no solo simplifica el análisis de funciones, sino que también garantiza la existencia de mínimos globales en problemas de optimización. En lo siguiente, exploraremos cómo estas propiedades se aplican en algoritmos de optimización y aprendizaje automático, donde la convexidad es una condición suficiente para la eficiencia computacional.

### E.1.2. Propiedades de continuidad

Las funciones convexas en dimensión finita poseen propiedades de continuidad que las distinguen de otras clases de funciones y son fundamentales en optimización y análisis convexo. A continuación, se presentan los resultados teóricos principales, sus demostraciones y ejemplos ilustrativos.

**Teorema 16** (Continuidad en el interior del dominio). *Sea*

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, +\infty]$$

*una función convexa propia. Entonces,  $f$  es **localmente lipschitziana** y por lo tanto **continua** en el interior de su dominio extendido  $\text{int}(\text{dom}(f))$ .*

*Demostración.* La prueba puede consultarse en [5, Sección 2.1.2]. □

**Teorema 17** (Continuidad global en  $\mathbb{R}^n$ ). *Si  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  es una función convexa y  $\text{dom}(f) = \mathbb{R}^n$ , entonces  $f$  es **globalmente continua** en  $\mathbb{R}^n$ .*

*Demostración.* Véase [25, Teorema 10.1]. □

## Ejemplos, contraejemplos y casos límite

**Ejemplo 21** (Función convexa discontinua en la frontera). *Consideremos la función indicatriz de un conjunto convexo  $C$ :*

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in C, \\ +\infty & \text{si } x \notin C. \end{cases}$$

- $f$  es convexa propia si  $C$  es no vacío y convexo.

- $f$  es discontinua en todo punto  $x \in \partial C$  (frontera de  $C$ ), ya que  $\lim_{y \rightarrow x, y \notin C} f(y) = +\infty$ .
- Este ejemplo muestra que la continuidad solo se garantiza en el interior de  $\text{dom}(f)$ .

**Ejemplo 22** (Función convexa definida en  $\mathbb{R}^n$ ). La función  $f(x) = \|x\|_2^2$  es convexa y definida en  $\mathbb{R}^n$ . Por el Teorema 17,  $f$  es continua en todo  $\mathbb{R}^n$ .

**Ejemplo 23** (No convexidad de la función de Heaviside). Consideramos la función de Heaviside, definida como:

$$H(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ c & \text{si } x = 0, \\ 1 & \text{si } x > 0. \end{cases} \quad \text{donde } c \in \{0, 1\},$$

*Demostremos que  $H$  no es convexa, independientemente del valor de  $c$ .*

**Caso 1 :**  $H(0) = 0$  Tomemos  $x_1 = -1$ ,  $x_2 = 2$ , y  $\lambda = 0,5$ :

$$H(0,5 \cdot (-1) + 0,5 \cdot 2) = H(0,5) = 1,$$

y

$$0,5 \cdot H(-1) + 0,5 \cdot H(2) = 0,5 \cdot 0 + 0,5 \cdot 1 = 0,5.$$

Aquí,  $1 \not\leq 0,5$ : la desigualdad de convexidad no se cumple. Por lo tanto,  $H$  no es convexa incluso si  $H(0) = 0$ .

**Caso 2 :**  $H(0) = 1$  Tomemos: -  $x_1 = -1$  (donde  $H(-1) = 0$ ), -  $x_2 = 1$  (donde  $H(1) = 1$ ), -  $\lambda = 0,5$ . Calculamos:

$$H(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) = H(0) = 1,$$

y

$$0,5 \cdot H(-1) + 0,5 \cdot H(1) = 0,5 \cdot 0 + 0,5 \cdot 1 = 0,5.$$

La desigualdad de convexidad exige:

$$1 \leq 0,5,$$

lo cual es falso. Por lo tanto,  $H$  no es convexa si  $H(0) = 1$ . Independientemente del valor de  $H(0)$  (0 o 1), la función de Heaviside no satisface la desigualdad de convexidad para ciertos puntos. Por lo tanto, nunca es convexa.

## Implicaciones en optimización

- **Existencia de mínimos:** Si  $f$  es convexa propia y  $C \subset \mathbb{R}^n$  es un conjunto convexo cerrado no vacío, entonces  $f$  alcanza su mínimo sobre  $C$  si  $C \cap \text{dom}(f) \neq \emptyset$  [25].
- **Estabilidad numérica:** La continuidad de  $f$  en el interior de su dominio garantiza la convergencia de algoritmos como el de gradiente descendente.
- **Subgradientes:** En puntos donde  $f$  no es diferenciable (por ejemplo,  $f(x) = |x|$  en  $x = 0$ ), la convexidad permite definir subgradientes, que son herramientas clave en optimización.

### E.1.3. Subdiferencial de funciones convexas

La noción de subdiferencial generaliza el concepto de gradiente a funciones convexas que no son necesariamente diferenciables. Esta herramienta es fundamental en optimización convexa, ya que permite caracterizar óptimos incluso en presencia de no diferenciabilidad.

**Definición 18** (Subgradiente). Sea  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, +\infty]$  una función convexa. Un vector  $g \in \mathbb{R}^n$  es un **subgradiente** de  $f$  en  $x$  si

$$f(y) \geq f(x) + g^T(y - x) \quad \forall y \in \mathbb{R}^n.$$

El conjunto de todos los subgradientes de  $f$  en  $x$  se denota  $\partial f(x)$  y se llama **subdiferencial** de  $f$  en  $x$ .

Intuitivamente, un subgradiente define un hiperplano de soporte al epígrafo de la función en el punto considerado. Cuando la función es diferenciable, el subdiferencial se reduce a un singleton que contiene el gradiente clásico.

A continuación, resumimos algunas propiedades fundamentales del subdiferencial en dimensión finita.

**Propiedades clave.** Sea  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, +\infty]$  convexa y  $x \in \text{dom}(f)$ . Entonces:

- El conjunto  $\partial f(x)$  es convexo y cerrado.
- Si  $f$  es diferenciable en  $x$ , entonces

$$\partial f(x) = \{\nabla f(x)\}.$$

- La condición de optimalidad de primer orden se escribe:

$$0 \in \partial f(x) \iff x \text{ es un minimizador global de } f.$$

- La aplicación  $x \mapsto \partial f(x)$  es monótona en el sentido de operadores:

$$(g_1 - g_2)^T(x_1 - x_2) \geq 0 \quad \text{para todo } g_i \in \partial f(x_i).$$

Para ilustrar esta noción, presentamos ahora algunos ejemplos clásicos de cálculo de subdiferenciales.

### Ejemplos.

- **Valor absoluto.** Sea  $f(x) = |x|$  con  $x \in \mathbb{R}$ . Entonces:

$$\partial f(x) = \begin{cases} \{1\} & \text{si } x > 0, \\ \{-1\} & \text{si } x < 0, \\ [-1, 1] & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

- **Parte positiva.** Sea  $f(x) = \max(0, x)$ . Entonces:

$$\partial f(x) = \begin{cases} \{1\} & \text{si } x > 0, \\ \{0\} & \text{si } x < 0, \\ [0, 1] & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

- **Función indicatriz.** Sea  $C \subset \mathbb{R}^n$  un conjunto convexo cerrado y

$$\iota_C(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in C, \\ +\infty & \text{si } x \notin C. \end{cases}$$

Entonces, para  $x \in C$ , el subdiferencial está dado por el cono normal:

$$\partial \iota_C(x) = N_C(x) = \{g \in \mathbb{R}^n \mid g^T(y - x) \leq 0, \forall y \in C\}.$$

Estos ejemplos muestran cómo el subdiferencial captura la falta de diferenciabilidad mediante conjuntos de pendientes admisibles, lo cual resulta esencial en el análisis y la resolución de problemas de optimización convexa no suave.

### E.1.4. Caracterización de mínimos

Una de las principales ventajas del subdiferencial es que permite formular condiciones de optimalidad de primer orden sin requerir diferenciabilidad. En el contexto de funciones convexas, esta caracterización es particularmente simple y poderosa. El siguiente resultado establece una condición necesaria y suficiente de optimalidad global.

**Teorema 18** (Caracterización de mínimos). *Sea  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, +\infty]$  una función convexa. Un punto  $x^* \in \text{dom}(f)$  es un mínimo global de  $f$  si y solo si*

$$0 \in \partial f(x^*).$$

Este resultado generaliza la condición clásica  $\nabla f(x^*) = 0$  del caso diferenciable. En efecto, cuando  $f$  es diferenciable en  $x^*$ , se tiene  $\partial f(x^*) = \{\nabla f(x^*)\}$ , y la condición anterior se reduce a la conocida anulación del gradiente.

**Idea de la demostración.** La demostración se basa directamente en la definición de subgradiente.

- (*Suficiencia*) Si  $0 \in \partial f(x^*)$ , entonces por definición:

$$f(y) \geq f(x^*) \quad \forall y \in \mathbb{R}^n,$$

lo que implica que  $x^*$  es un mínimo global.

- (*Necesidad*) Si  $x^*$  es un mínimo global, entonces

$$f(y) \geq f(x^*) \quad \forall y,$$

lo que corresponde exactamente a la desigualdad de subgradiente con  $g = 0$ .

Para una demostración más detallada y en un marco más general (espacios vectoriales normados), se puede consultar textos clásicos de optimización convexa como [18].

**Interpretación geométrica.** La condición  $0 \in \partial f(x^*)$  significa que existe un hiperplano de soporte horizontal al epígrafo de  $f$  en  $x^*$ . Intuitivamente, esto indica que no existe ninguna dirección de descenso, lo que caracteriza un mínimo global en el caso convexo.

A continuación, ilustramos esta caracterización con ejemplos clásicos.

### Ejemplos.

- **Valor absoluto.** Sea  $f(x) = |x|$ . Entonces:

$$\partial f(0) = [-1, 1].$$

Como  $0 \in [-1, 1]$ , se concluye que  $x^* = 0$  es un mínimo global. En cambio, si  $x \neq 0$ , entonces  $\partial f(x)$  no contiene al cero, lo que confirma que no son minimizadores.

- **Parte positiva.** Sea  $f(x) = \max(0, x)$ . Se tiene:

$$\partial f(0) = [0, 1].$$

Dado que  $0 \in \partial f(0)$ , el punto  $x^* = 0$  es un mínimo global (de hecho,  $f(x) \geq 0$  para todo  $x$ ).

- **Función indicatriz.** Sea  $C \subset \mathbb{R}^n$  convexo cerrado y  $f = \iota_C$ . Entonces:

$$\partial f(x) = N_C(x).$$

La condición de optimalidad se escribe:

$$0 \in N_C(x^*),$$

lo cual equivale a decir que

$$0^T(y - x^*) \leq 0 \quad \forall y \in C,$$

condición que es siempre verdadera. Esto refleja el hecho de que todo punto de  $C$  es minimizador de  $\iota_C$ .

**Comentario.** Este criterio es fundamental en optimización convexa y sirve como base para numerosos algoritmos (métodos de subgradiente, métodos proximales, etc.). Su simplicidad contrasta con su gran generalidad, ya que sigue siendo válido incluso en ausencia de diferenciabilidad.

## E.2. Existencia de mínimo

Consideremos una función  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$  convexa, propia (es decir,  $f(x) < +\infty$  para al menos un  $x \in \mathbb{R}^n$ ) y semicontinua inferiormente. Si el dominio efectivo de  $f$ , definido como  $\text{dom}(f) = \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) < +\infty\}$ , es no vacío, cerrado y acotado, entonces  $f$  alcanza su mínimo global en  $\mathbb{R}^n$ .

**Teorema 19.** *Sea  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$  una función convexa, propia y semicontinua inferiormente. Si  $\text{dom}(f)$  es no vacío, cerrado y acotado, entonces existe  $x^* \in \text{dom}(f)$  tal que*

$$f(x^*) = \inf_{x \in \mathbb{R}^n} f(x).$$

Consideremos la función  $f(x) = x^2$ , definida en  $\mathbb{R}$ . Esta función es convexa, propia y semicontinua inferiormente. Su dominio efectivo es  $\mathbb{R}$ , que no es acotado. Sin embargo, si restringimos el dominio a un intervalo cerrado y acotado, por ejemplo,  $[-1, 1]$ , entonces  $f$  alcanza su mínimo en  $x = 0$ .

## E.3. Caso diferenciable

**Definición 19** (Función convexa diferenciable). *Si  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  es convexa y diferenciable en  $x$ , entonces*

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T(y - x) \quad \forall y \in \mathbb{R}^n.$$

*Además,  $\nabla f(x)$  es el único subgradiente de  $f$  en  $x$ .*

**Definición 20** (Función convexa dos veces diferenciable). *Si  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  es convexa y dos veces diferenciable, entonces su matriz Hessiana  $\nabla^2 f(x)$  es **semidefinida positiva** para todo  $x \in \mathbb{R}^n$ . Recíprocamente, si  $\nabla^2 f(x)$  es semidefinida positiva para todo  $x$ , entonces  $f$  es convexa.*

**Teorema 20** (Caracterización de mínimos con gradiente). *Sea  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  una función convexa y diferenciable. Un punto  $x^* \in \mathbb{R}^n$  es un mínimo global de  $f$  si y solo si*

$$\nabla f(x^*) = 0.$$

**Teorema 21** (Caracterización de mínimos con Hessiana). *Sea  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  una función convexa y dos veces diferenciable. Un punto  $x^* \in \mathbb{R}^n$  es un mínimo global estricto de  $f$  si y solo si*

$$\nabla f(x^*) = 0 \quad \text{y} \quad \nabla^2 f(x^*) \text{ es definida positiva.}$$

# Apéndice F

## Más métodos

---

### F.1. Método de penalización

El **método de penalización** transforma un problema con restricciones mín  $f(x)$  sujeto a  $c_i(x) = 0$  en un problema sin restricciones:

$$\min f(x) + \mu \sum_{i=1}^m c_i(x)^2,$$

donde  $\mu > 0$  es el parámetro de penalización.

### F.2. Método de Lagrange

El **método de Lagrange** introduce multiplicadores  $\lambda$  para problemas con restricciones  $c_i(x) = 0$ . La función Lagrangiana es:

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i c_i(x).$$

Las condiciones de optimalidad son:

$$\nabla_x \mathcal{L}(x^*, \lambda^*) = 0, \quad c_i(x^*) = 0.$$

### F.3. Método de Lagrange aumentado

#### F.3.1. Definición

El método de Lagrange aumentado, también conocido como método de los multiplicadores de Lagrange con penalización, es una técnica

utilizada para resolver problemas de optimización con restricciones. Este método es una generalización del método clásico de los multiplicadores de Lagrange, incorporando una función de penalización que permite manejar restricciones de igualdad de manera más flexible.

**Problema general:** Dado un problema de optimización no lineal con restricciones de igualdad:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^n} \quad & f(x) \\ \text{sueto a} \quad & h_i(x) = 0, \quad i = 1, \dots, m, \end{aligned}$$

donde  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  es la función objetivo y  $h_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  son las funciones de restricción, el método de Lagrange aumentado introduce una función de penalización cuadrática en las restricciones, transformando el problema en uno sin restricciones de la siguiente manera:

$$\mathcal{L}_\mu(x, \lambda) = f(x) + \lambda^T h(x) + \frac{\mu}{2} \|h(x)\|^2,$$

donde  $\lambda \in \mathbb{R}^m$  son los multiplicadores de Lagrange asociados a las restricciones, y  $\mu > 0$  es un parámetro de penalización.

### F.3.2. Algoritmo

El algoritmo básico del método de Lagrange aumentado (Uzawa) es el siguiente:

1. Inicializar  $\lambda_0$  y  $\mu > 0$ .
2. Resolver el problema sin restricciones:

$$x_{k+1} = \arg \min_x \mathcal{L}_\mu(x, \lambda_k).$$

3. Actualizar los multiplicadores:

$$\lambda_{k+1} = \lambda_k + \mu h(x_{k+1}).$$

4. Verificar convergencia. Si no se cumple, repetir desde el paso 2.

### F.3.3. Ejemplo

Consideremos el siguiente problema de optimización con restricción de igualdad:

$$\begin{aligned} \min_{x,y} \quad & x^2 + y^2 \\ \text{sujeto a} \quad & x + y = 1. \end{aligned}$$

Aplicando el método de Lagrange aumentado, definimos la función de Lagrange aumentada:

$$\mathcal{L}_\mu(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 + \lambda(x + y - 1) + \frac{\mu}{2}(x + y - 1)^2.$$

Para resolver el problema, minimizamos  $\mathcal{L}_\mu$  respecto a  $x$  e  $y$ , y luego actualizamos  $\lambda$  iterativamente hasta alcanzar la convergencia. Por ejemplo, si tomamos  $\mu = 1$  y  $\lambda_0 = 0$ , el punto óptimo se alcanza en  $(x, y) = (0,5, 0,5)$ .

## F.4. Métodos cuasi-Newton (BFGS)

El método **BFGS** aproxima la inversa de la Hessiana  $H_k$  mediante actualizaciones iterativas:

$$H_{k+1} = \left( I - \frac{y_k s_k^T}{y_k^T s_k} \right) H_k \left( I - \frac{s_k y_k^T}{y_k^T s_k} \right) + \frac{s_k s_k^T}{y_k^T s_k},$$

donde  $s_k = x_{k+1} - x_k$  y  $y_k = \nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k)$ . La iteración es:

$$x_{k+1} = x_k - \alpha_k H_k \nabla f(x_k).$$



# Apéndice G

## Medida y análisis funcional

---

Este capítulo está dedicado a profundizar en los fundamentos matemáticos esenciales para el análisis avanzado: la **teoría de medida**, la **integral de Lebesgue** y los **espacios funcionales**. Estos conceptos son pilares en el estudio de la probabilidad, la ecuación diferencial parcial, el análisis funcional y la teoría de control. A través de un enfoque riguroso, se presentan las herramientas teóricas necesarias para abordar problemas complejos en matemática, sentando las bases para el desarrollo de métodos modernos en optimización, física matemática y ciencia de datos.

### G.1. Medida

La noción de **medida** generaliza el concepto clásico de longitud, área y volumen a conjuntos abstractos, permitiendo cuantificar el "tamaño" de subconjuntos en espacios arbitrarios. Esta teoría es fundamental para definir integrales generalizadas, como la integral de Lebesgue, y para analizar funciones medibles. Se exploran las propiedades de los espacios de medida, la construcción de medidas a partir de premedidas, y la relación entre la medida y la topología. Además, se estudian los teoremas clásicos de convergencia, como el de la convergencia monótona y el de la convergencia dominada, que son esenciales en el análisis funcional y en la teoría de la probabilidad.

## G.2. Medida y funciones

### G.2.1. Funciones BV

**Definición 21** (Variación acotada). *Una función  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  es de **variación acotada** si su variación total es finita:*

$$V_a^b(f) = \sup \left\{ \sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})| : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b \right\} < \infty.$$

*El espacio  $BV([a, b])$  es el conjunto de funciones de variación acotada en  $[a, b]$ .*

**Teorema 22** (Estructura de funciones BV). *Toda función  $f \in BV([a, b])$  puede escribirse como la diferencia de dos funciones crecientes. Además,  $f$  es derivable en casi todo punto y su derivada es integrable.*

### G.2.2. Continuidad absoluta

**Definición 22** (Continuidad absoluta). *Una función  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  es **absolutamente continua** si para todo  $\varepsilon > 0$  existe  $\delta > 0$  tal que para cualquier colección finita de intervalos disjuntos  $(a_i, b_i) \subset [a, b]$  con  $\sum_i (b_i - a_i) < \delta$ , se tiene:*

$$\sum_i |f(b_i) - f(a_i)| < \varepsilon.$$

**Teorema 23** (Caracterización de funciones absolutamente continuas). *Sea  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una función. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1.  *$f$  es absolutamente continua.*
2.  *$f$  es la integral indefinida de su derivada: existe  $g \in L^1([a, b])$  tal que*

$$f(x) = f(a) + \int_a^x g(t) dt \quad \forall x \in [a, b].$$

3.  *$f$  es continua, de variación acotada, y la medida de Lebesgue-Stieltjes asociada a  $f$  es absolutamente continua respecto a la medida de Lebesgue.*

**Observación 3.** *Las funciones absolutamente continuas son un subconjunto propio de las funciones continuas de variación acotada. Además, toda función absolutamente continua es derivable en casi todo punto y su derivada coincide con la función  $g$  del teorema anterior.*

**Ejemplo 24.** *La función  $f(x) = x^2 \sin(1/x)$  para  $x \neq 0$  y  $f(0) = 0$  es absolutamente continua en  $[0, 1]$ , pero no es Lipschitz continua.*

**Ejemplo 25.** *La función de Cantor-Lebesgue es un ejemplo clásico de función en  $BV([0, 1])$  pero no absolutamente continua.*

### G.2.3. Teorema de aproximación de Lebesgue

**Teorema 24** (Teorema de aproximación de Lebesgue). *Sea  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  una función medible. Entonces, existe una sucesión de funciones continuas  $f_k$  tal que  $f_k \rightarrow f$  casi en todo punto y en medida.*

**Observación 4.** *Este teorema es fundamental para aproximar funciones no continuas por funciones continuas en el contexto de la teoría de la medida, y está estrechamente relacionado con la diferenciabilidad en casi todo punto.*

### G.2.4. Teorema de Lebesgue

**Teorema 25** (Teorema de diferenciación de Lebesgue). *Sea  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  una función localmente integrable. Entonces, para casi todo  $x \in \mathbb{R}^n$ , se tiene:*

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} f(y) dy = f(x),$$

donde  $B(x, r)$  es la bola de centro  $x$  y radio  $r$ .

**Teorema 26** (Teorema de Lebesgue para funciones de variación acotada). *Sea  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una función de variación acotada. Entonces,  $f$  es derivable en casi todo punto de  $[a, b]$ , y su derivada  $f'$  es integrable en  $[a, b]$ .*

**Observación 5.** *El teorema de Lebesgue asegura que, aunque una función no sea continua, su promedio local converge a su valor en casi todo punto. Esto es clave para entender la diferenciabilidad en el contexto de la teoría de la medida.*

### G.2.5. Teorema de Rademacher

**Definición 23** (Función Lipschitz). *Una función  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  es **Lipschitz** si existe  $L \geq 0$  tal que*

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

*El menor  $L$  que satisface esta desigualdad se denomina **constante de Lipschitz** de  $f$ .*

**Teorema 27** (Teorema de Rademacher). *Toda función Lipschitz  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  es derivable en casi todo punto de  $\mathbb{R}^n$ . Además, su diferencial  $Df(x)$  es esencialmente acotada (i.e.,  $\|Df(x)\| \leq L$  c.t.p.).*

*Demostración.* La demostración clásica usa el teorema de diferenciación de Lebesgue y el hecho de que las funciones Lipschitz son de variación acotada en casi todo punto.  $\square$

**Observación 6.** *El teorema de Rademacher es fundamental en el análisis de funciones no diferenciables en el sentido clásico, pero con regularidad Lipschitz. Extiende el resultado de que las funciones de variación acotada son derivables en casi todo punto (Teorema de Lebesgue).*

**Ejemplo 26.** *La función  $f(x) = |x|$  es Lipschitz en  $\mathbb{R}$ , pero no es derivable en  $x = 0$ . Sin embargo, es derivable en casi todo punto de  $\mathbb{R}$  (excepto en  $x = 0$ ).*

### G.2.6. Resumen de Relaciones entre Propiedades

| Propiedad            | Derivable en c.t.p. | Relación con $L^1$                  |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Continuidad absoluta | Sí                  | $f(x) = f(a) + \int_a^x g(t) dt$    |
| Función Lipschitz    | Sí (Rademacher)     | $\ Df\ _\infty \leq L$              |
| Variación acotada    | Sí (Lebesgue)       | $f' \in L^1$                        |
| Medible              | No necesariamente   | Aproximable por funciones continuas |

## G.3. Hahn–Banach

El **teorema de Hahn–Banach** es uno de los resultados más profundos y útiles del análisis funcional. Este teorema garantiza la existencia de

extensiones lineales y continuas de funcionales definidos en subespacios de un espacio vectorial normado, preservando su norma. Sus consecuencias son vastas: permite demostrar la existencia de funcionales lineales continuos no triviales, la separación de conjuntos convexos disjuntos, y la unicidad de normas equivalentes. El teorema de Hahn–Banach es clave en la dualidad entre espacios de Banach y en el estudio de la convergencia en espacios de funciones.

## G.4. Espacios de Hilbert

Los **espacios de Hilbert** son generalizaciones del espacio euclidiano a dimensiones infinitas, donde la noción de ortogonalidad y proyección juega un papel central. Estos espacios poseen una estructura geométrica rica, basada en el producto interno, y permiten desarrollar teorías de series de Fourier generalizadas, bases ortonormales y operadores compactos. Se analizan propiedades como la completitud, la descomposición ortogonal y la representación de funcionales lineales continuos mediante el teorema de representación de Riesz. Los espacios de Hilbert son fundamentales en mecánica cuántica, teoría de aproximación y procesamiento de señales.

## G.5. Espacios de Lebesgue

Los **espacios de Lebesgue**  $L^p$  son espacios funcionales que generalizan el concepto de integrabilidad en el sentido de Lebesgue. Estos espacios, parametrizados por  $p \in [1, \infty]$ , consisten en clases de equivalencia de funciones medibles cuyas potencias  $p$ -ésimas son integrables. Se estudian sus propiedades topológicas, la densidad de funciones continuas, y los teoremas de densidad y aproximación. Además, se exploran las desigualdades fundamentales, como las de Hölder y Minkowski, y su relación con la convergencia en medida y la continuidad de operadores lineales.

## G.6. Derivada débil

La **derivada débil** extiende el concepto clásico de derivada a funciones que no son diferenciables en el sentido usual, pero que poseen una derivada generalizada en un sentido distribucional. Esta noción es esencial en la teoría de distribuciones y en el estudio de ecuaciones diferenciales parciales, donde muchas soluciones no son clásicas. Se definen los espacios de Sobolev y se analizan sus propiedades, incluyendo los teoremas de inmersión y traza, que permiten entender cómo las propiedades de regularidad de una función se transfieren a su frontera. La derivada débil es una herramienta poderosa para formular problemas variacionales y analizar su solubilidad.

## G.7. Espacios de Sobolev

Los **espacios de Sobolev** son espacios funcionales que combinan propiedades de diferenciabilidad y integrabilidad, siendo fundamentales en el estudio de ecuaciones diferenciales parciales y en el análisis numérico. Estos espacios consisten en funciones cuyas derivadas débiles hasta cierto orden pertenecen a espacios de Lebesgue. Se analizan sus propiedades de completitud, densidad, y los teoremas de compactación, que son cruciales para demostrar la existencia de soluciones débiles. Los espacios de Sobolev también permiten formular problemas de minimización en cálculo de variaciones y en la teoría del potencial, proporcionando un marco riguroso para el análisis de regularidad y unicidad de soluciones.

## G.8. Ejemplos

### G.8.1. Generales

A continuación se dan ejemplos sencillos en una dimensión (dominio habitual  $(-1, 1)$  o  $\mathbb{R}$ ) que ilustran pertenencia o no a los espacios  $L^2$  y  $H^1$ .

- **Función continua que está en  $L^2$  pero no en  $H^1$ :**

$$f(x) = |x|^\alpha, \quad \alpha = \frac{1}{4}, \quad x \in (-1, 1).$$

Aquí  $f \in L^2((-1, 1))$  porque  $\int_{-1}^1 |x|^{2\alpha} dx < \infty$  (ya que  $2\alpha > -1$ ), pero la derivada puntual es  $f'(x) = \alpha \operatorname{sgn}(x)|x|^{\alpha-1}$  cuya norma  $L^2$  diverge porque  $2(\alpha - 1) \leq -1$ ; por tanto no existe derivada débil en  $L^2$  y  $f \notin H^1((-1, 1))$ . Este ejemplo es continuo pero no pertenece a  $H^1$ .

- **Función discontinua que pertenece a  $L^2$  pero no a  $H^1$ :**

$$\chi_{(0,1)}(x) = \begin{cases} 1, & x \in (0, 1), \\ 0, & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

vista como función en  $\mathbb{R}$ . Tiene norma  $L^2$  finita, pero presenta una discontinuidad por salto; su derivada en sentido de distribuciones contiene deltas de frontera (no representables por una función en  $L^2$ ), luego  $\chi_{(0,1)} \notin H^1(\mathbb{R})$ .

- **Función o distribución que no está en  $L^2$ :**

- La función singular  $g(x) = |x|^{-\beta}$  en  $(-1, 1)$  con  $\beta \geq \frac{1}{2}$  no pertenece a  $L^2((-1, 1))$  porque  $\int_{-1}^1 |x|^{-2\beta} dx = \infty$ .
- La delta de Dirac  $\delta_0$  (distribución) no es una función en  $L^2$  (no es una función cuadrado-integrable).

Cada ejemplo indica la razón básica (comportamiento en el origen o saltos) por la que falla la integrabilidad cuadrática o la existencia de derivada débil en  $L^2$ .

## G.8.2. Indicador

La función  $1_{\{0,1\}}(x)$  representa la **indicador de  $\{0, 1\}$** , definida como:

$$1_{\{0,1\}}(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \{0, 1\}, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Esta función es discontinua en  $x = 0$  y  $x = 1$ , por lo que no pertenece a los espacios clásicos de Sobolev  $H^s(\mathbb{R})$  para  $s \geq 1/2$  en el sentido estándar.

Sin embargo, su regularidad puede analizarse en el marco de los **espacios de Sobolev fraccionarios**  $H^s(\mathbb{R})$ ,  $s \in (0, 1)$ .

En particular, la indicatriz  $1_{\{0,1\}}$  pertenece al espacio  $H^{1/2-\varepsilon}(\mathbb{R})$  para todo  $\varepsilon > 0$ , pero **no** pertenece a  $H^{1/2}(\mathbb{R})$ . Este resultado se justifica mediante el cálculo de la norma de Sobolev fraccionaria:

$$\|1_{\{0,1\}}\|_{H^s(\mathbb{R})}^2 = \int_{\mathbb{R}} |\xi|^{2s} |\widehat{1_{\{0,1\}}}(\xi)|^2 d\xi,$$

donde  $\widehat{1_{\{0,1\}}}(\xi)$  es la transformada de Fourier de la indicatriz. Dado que la transformada de Fourier de  $1_{\{0,1\}}$  decae como  $|\xi|^{-1}$  en el infinito, la integral converge si y solo si  $s < 1/2$ . Por lo tanto, la regularidad fraccionaria de la indicatriz está limitada por  $s = 1/2$ . La **transformada de Fourier** de la indicatriz  $1_{\{0,1\}}(x)$  es:

$$\widehat{1_{\{0,1\}}}(\xi) = e^{-i\xi} \frac{\sin(\xi)}{\xi},$$

que también puede escribirse como:

$$\widehat{1_{\{0,1\}}}(\xi) = e^{-i\xi} \frac{\sin(\xi)}{\xi}.$$

Esta función decae como  $|\xi|^{-1}$  cuando  $|\xi| \rightarrow \infty$ .

## G.9. Más espacios funcionales

### G.9.1. Espacios de Sobolev $H^s(\mathbb{R})$

El espacio de Sobolev  $H^s(\mathbb{R})$  para  $s \in \mathbb{R}$  se define como:

$$H^s(\mathbb{R}) = \left\{ f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}) : \int_{\mathbb{R}} (1 + |\xi|^2)^s |\widehat{f}(\xi)|^2 d\xi < \infty \right\},$$

donde  $\widehat{f}$  es la transformada de Fourier de  $f$ . La norma en  $H^s(\mathbb{R})$  es:

$$\|f\|_{H^s(\mathbb{R})}^2 = \int_{\mathbb{R}} (1 + |\xi|^2)^s |\widehat{f}(\xi)|^2 d\xi.$$

### G.9.2. Espacios de Besov $\mathcal{B}_{p,q}^s(\mathbb{R})$

El espacio de Besov  $\mathcal{B}_{p,q}^s(\mathbb{R})$  para  $s \in \mathbb{R}$  y  $p, q \in [1, \infty]$  se define mediante diferencias finitas o mediante la descomposición en frecuencias. Intuitivamente, mide la regularidad de  $f$  en términos de cómo sus diferencias finitas decaen. Para  $0 < s < 1$  y  $1 \leq p, q \leq \infty$ , se tiene:

$$\mathcal{B}_{p,q}^s(\mathbb{R}) = \left\{ f \in L^p(\mathbb{R}) : \left( \int_0^\infty (t^{-s} \omega_p(f, t))^q \frac{dt}{t} \right)^{1/q} < \infty \right\},$$

donde  $\omega_p(f, t)$  es el módulo de continuidad en  $L^p$ .

### G.9.3. Exponente de Hölder

El **exponente de Hölder**  $\alpha$  de una función  $f$  en un punto  $x_0$  es el supremo de todos  $\alpha > 0$  tales que:

$$|f(x) - f(x_0)| \leq C|x - x_0|^\alpha \quad \text{para } x \text{ cerca de } x_0.$$

## G.10. Fractales

### G.10.1. Función de Weierstrass

La **función de Weierstrass** se define para  $\lambda > 1$  y  $0 < H < 1$  como:

$$W_H(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda^{-nH} \cos(2\pi \lambda^n x).$$

- **Propiedades:** Es continua pero nowhere differentiable.
- **Regularidad de Sobolev:**  $W_H \in H^s(\mathbb{R})$  para todo  $s < H$ .
- **Regularidad de Besov:**  $W_H \in \mathcal{B}_{p,q}^H(\mathbb{R})$  para todo  $p, q \geq 1$ .
- **Exponente de Hölder:**  $\alpha = H$  en casi todo punto.
- **Referencia:** Mandelbrot [23].

### G.10.2. Función de Takagi

La **función de Takagi** se define como:

$$T(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \text{dist}(2^n x, \mathbb{Z}),$$

donde  $\text{dist}(x, \mathbb{Z})$  es la distancia de  $x$  al entero más cercano.

- **Propiedades:** Es continua, creciente, y nowhere differentiable.
- **Regularidad de Sobolev:**  $T \in H^s(\mathbb{R})$  para todo  $s < 1/2$ .
- **Regularidad de Besov:**  $T \in \mathcal{B}_{p,q}^{1/2}(\mathbb{R})$  para todo  $p, q \geq 1$ .
- **Exponente de Hölder:**  $\alpha = 1/2$  en casi todo punto.
- **Referencia:** Takagi [27].

### G.10.3. Movimiento browniano fraccionario

El **movimiento Browniano fraccionario**  $B_H(t)$  con parámetro de Hurst  $0 < H < 1$  es un proceso estocástico gaussiano con trayectorias fractales.

- **Propiedades:** Tiene trayectorias continuas pero nowhere diferenciables si  $H \neq 1$ .
- **Regularidad de Sobolev:** Casi todas las trayectorias satisfacen  $B_H \in H^s(\mathbb{R})$  para todo  $s < H$ .
- **Regularidad de Besov:** Casi todas las trayectorias satisfacen  $B_H \in \mathcal{B}_{p,q}^H(\mathbb{R})$  para todo  $p, q \geq 1$ .
- **Exponente de Hölder:**  $\alpha = H$  en casi todo punto y trayectoria.
- **Referencia:** Samorodnitsky y Taqqu [26].

### G.10.4. Conjunto de Cantor

El **conjunto de Cantor**  $C$  se construye eliminando el tercio central de cada intervalo.

- **Propiedades:** Es un fractal autosimilar con dimensión de Hausdorff  $D = \frac{\log 2}{\log 3}$ .
- **Función indicatriz:** La función  $1_C(x)$  tiene regularidad de Besov  $s < D$ .
- **Regularidad de Sobolev:**  $1_C \notin H^{1/2}(\mathbb{R})$ .
- **Referencia:** Cantor [8].

### G.10.5. Función de Cantor-Lebesgue

La **función de Cantor-Lebesgue**  $f_C(x)$  es continua, creciente, y singular (constante en los intervalos del complemento de  $C$ ).

- **Propiedades:** Es constante en los intervalos de  $\mathbb{R} \setminus C$ .
- **Regularidad de Sobolev:**  $f_C \notin H^{1/2}(\mathbb{R})$ .
- **Regularidad de Besov:**  $f_C \in \mathcal{B}_{p,q}^s(\mathbb{R})$  para  $s < D$ .
- **Referencia:** Lebesgue [21].

## G.11. Ecuaciones elípticas

Las ecuaciones elípticas son un tipo de ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden cuyo símbolo principal es definido positivo (por ejemplo, la ecuación de Laplace  $\Delta u = 0$  o la de Poisson  $-\Delta u = f$ ), y modelan estados estacionarios y distribuciones espaciales equilibradas; en problemas de contorno bien planteados suelen garantizar existencia, unicidad y regularidad de soluciones suaves en dominios regulares, y poseen propiedades cualitativas importantes como el principio del máximo, estimaciones a priori y dependencia continua respecto de los datos, lo que las convierte en herramientas centrales en análisis y aplicaciones físicas e ingenieriles.



# Apéndice H

## Ejemplos para minimizar con descenso de gradiente

---

Este presenta cuatro ejemplos **concretos y precisos** de funcionales diferenciables que pueden minimizarse utilizando el método de **descenso de gradiente**. Los ejemplos abarcan:

- Una función fuertemente convexa (regresión Ridge).
- Un problema físico (energía potencial de un sistema de resortes).
- Un problema de optimización de forma (área de un polígono bajo restricción de perímetro).
- Un ejemplo de aprendizaje automático (regresión logística).

Todos los ejemplos están formulados con un número reducido de variables (entre 2 y 10) para facilitar su comprensión y implementación.

### H.1. Ridge

#### H.1.1. Contexto

En aprendizaje automático, la regresión Ridge busca minimizar el error cuadrático entre las predicciones de un modelo lineal y los datos reales, añadiendo un término de regularización L2 para evitar el sobreajuste.

#### H.1.2. Funcional

Dada una matriz de datos  $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times d}$ , un vector de etiquetas  $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ , y un vector de pesos  $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^d$ , la funcional a minimizar es:  $J(\mathbf{w}) = \frac{1}{2n} \|\mathbf{X}\mathbf{w} - \mathbf{y}\|_2^2 + \lambda \|\mathbf{w}\|_2^2$  donde  $\lambda > 0$  es el parámetro de regularización.

### H.1.3. Propiedades

- **Fuertemente convexa** si  $\lambda > 0$ .
- Diferenciable, con gradiente:  $\nabla J(\mathbf{w}) = \frac{1}{n} \mathbf{X}^T (\mathbf{X}\mathbf{w} - \mathbf{y}) + 2\lambda\mathbf{w}$ .

### H.1.4. Ejemplo

Para  $d = 2$  (dos variables  $w_1, w_2$ ) y  $n = 3$  muestras:

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & 23 & 45 & 6 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 3711 \end{bmatrix}, \quad \lambda = 0,1.$$

La funcional se escribe como:

$$J(w_1, w_2) = \frac{1}{6} ((w_1 + 2w_2 - 3)^2 + (3w_1 + 4w_2 - 7)^2 + (5w_1 + 6w_2 - 11)^2) + 0,1(w_1^2 + w_2^2).$$

## H.2. Energía potencial de un sistema de resortes

### H.2.1. Contexto

Minimización de la energía potencial elástica de un sistema de masas conectadas por resortes en 1D. Este es un problema clásico en física de medios continuos.

### H.2.2. Funcional

Consideremos  $N$  masas conectadas por resortes. Sea  $x_i$  la posición de la masa  $i$  (con  $x_0$  y  $x_{N+1}$  fijas). La energía potencial total es:  $E(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^N \frac{k}{2} (x_i - x_{i-1} - L_i)^2$  donde  $k$  es la constante elástica,  $L_i$  es la longitud en reposo del resorte  $i$ , y  $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_N]$ .

### H.2.3. Propiedades

- **Convexa** (suma de cuadrados).
- Diferenciable, con gradiente:  $\frac{\partial E}{\partial x_i} = k (2x_i - x_{i-1} - x_{i+1} - L_i + L_{i+1})$  (con  $x_0$  y  $x_{N+1}$  fijas).

### H.2.4. Ejemplo

Para  $N = 2$  masas (2 variables  $x_1, x_2$ ):  $k = 1$ ,  $L_1 = L_2 = 1$ ,  $x_0 = 0$ ,  $x_3 = 2$  La funcional se escribe como:  $E(x_1, x_2) = \frac{1}{2}(x_1 - 1)^2 + \frac{1}{2}(x_2 - x_1 - 1)^2 + \frac{1}{2}(2 - x_2 - 1)^2$ .

## H.3. Optimización de forma

### H.3.1. Contexto

Encontrar las coordenadas de los vértices de un triángulo que minimice su área, sujetas a una restricción de perímetro fijo. Este es un problema simplificado de optimización de forma.

### H.3.2. Funcional

Para un triángulo con vértices  $\mathbf{p}_1 = (x_1, y_1)$ ,  $\mathbf{p}_2 = (x_2, y_2)$ ,  $\mathbf{p}_3 = (x_3, y_3)$ , y un perímetro  $P$  fijo:

- **Área** (a minimizar):  $A(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3) = \frac{1}{2}(\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1) \times (\mathbf{p}_3 - \mathbf{p}_1)$  (producto vectorial en 2D).
- **Restricción:**  $\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_3 - \mathbf{p}_2 + \mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_3 = P$ .

### H.3.3. Penalización

Para transformar el problema restringido en uno no restringido, se usa:

$$J(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3) = A(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3) + \mu (\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_3 - \mathbf{p}_2 + \mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_3 - P)^2$$

donde  $\mu$  es un parámetro de penalización.

### H.3.4. Ejemplo

Para  $P = 6$ , y fijando  $\mathbf{p}_1 = (0, 0)$ ,  $\mathbf{p}_2 = (a, 0)$ ,  $\mathbf{p}_3 = (b, c)$ :

- **Área:**  $A(a, b, c) = \frac{1}{2}|a \cdot c|$ .
- **Restricción:**  $a + \sqrt{(b - a)^2 + c^2} + \sqrt{b^2 + c^2} = 6$ .

## H.4. Aprendizaje automático

### H.4.1. Contexto

Clasificar puntos en 2D en dos clases (0 o 1) aprendiendo los parámetros de un modelo logístico.

### H.4.2. Funcional

Dada una matriz de datos  $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times 2}$ , un vector de etiquetas  $\mathbf{y} \in \{0, 1\}^n$ , y parámetros  $\mathbf{w} = (w_1, w_2)$ ,  $b$  (pesos y sesgo), la log-verosimilitud negativa (a minimizar) es:

$$J(\mathbf{w}, b) = - \sum_{i=1}^n [y_i \log(\sigma(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i + b)) + (1 - y_i) \log(1 - \sigma(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i + b))]$$

donde  $\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$  es la función sigmoide.

### H.4.3. Propiedades

- **Convexa** (la log-verosimilitud negativa es convexa para regresión logística).
- Diferenciable, con gradiente:

$$\nabla_{\mathbf{w}_j} J = - \sum_{i=1}^n (y_i - \sigma(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i + b)) x_{ij}, \quad \nabla_b J = - \sum_{i=1}^n (y_i - \sigma(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i + b)).$$

### H.4.4. Ejemplo

Para  $n = 3$  muestras:

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & 22 & 13 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = [101].$$

La funcional se escribe como:

$$J(w_1, w_2, b) = - [\log(\sigma(w_1 + 2w_2 + b)) + \log(1 - \sigma(2w_1 + w_2 + b)) + \log(\sigma(3w_1 + 3w_2 + b))].$$

# Referencias bibliográficas

---

- [1] G. ALLAIRE, *Numerical analysis and optimization*, Oxford University Press, 2007.
- [2] G. ALLAIRE AND S. M. KABER, *Numerical linear algebra*, vol. 55 of Texts Appl. Math., New York, NY: Springer, 2008.
- [3] V. BARBU AND T. PRECUPANU, *Convexity and optimization in Banach spaces.*, Springer Monogr. Math., Dordrecht: Springer, 4th updated and revised ed. ed., 2012.
- [4] D. P. BERTSEKAS, *Constrained optimization and Lagrange multiplier methods*. Computer Science and Applied Mathematics. New York - London etc.: Academic Press. A Subsidiary of Harcourt Brace Jovanovich, Publishers. XIII, 395 p. \$ 65.00 (1982)., 1982.
- [5] S. BOYD AND L. VANDENBERGHE, *Convex optimization*, Cambridge University Press, 2004.
- [6] A. BRESSAN, *Lecture notes on functional analysis. With applications to linear partial differential equations*, vol. 143 of Grad. Stud. Math., Providence, RI: American Mathematical Society (AMS), 2013.
- [7] H. BREZIS, *Functional analysis, Sobolev spaces and partial differential equations*, Universitext, New York, NY: Springer, 2011.
- [8] G. CANTOR, *Über unendliche lineare punktmannigfaltigkeiten*, Math. Ann., 20 (1883), pp. 61–74.
- [9] P. G. CIARLET, *The finite element methods for elliptic problems.*, vol. 40 of Class. Appl. Math., Philadelphia, PA: SIAM, repr., unabridged republ. of the orig. 1978 ed., 2002.
- [10] G. DUVAUT AND J.-L. LIONS, *Les inéquations en mécanique et en physique*, Travaux et Recherches Mathématiques, No. 21, Dunod, Paris, 1972.
- [11] ———, *Inequalities in mechanics and physics*, Springer-Verlag, 1976.
- [12] W. GANDER, M. J. GANDER, AND F. KWOK, *Scientific computing. An introduction using Maple and MATLAB*, vol. 11 of Texts Comput. Sci. Eng., Cham: Springer, 2014.
- [13] R. GLOWINSKI, *Lectures on numerical methods for nonlinear variational problems*, Springer-Verlag, 1980.
- [14] R. GLOWINSKI, *Numerical methods for nonlinear variational problems*. Springer Series in Computational Physics. New York etc.: Springer-Verlag. xv, 493 p. DM 158.00; \$ 61.30 (1984)., 1984.

- [15] R. GLOWINSKI, J.-L. LIONS, AND R. TRÉMOLIÈRES, *Numerical analysis of variational inequalities*, vol. 8 of Studies in Mathematics and its Applications, North-Holland Publishing Co., Amsterdam-New York, 1981.
- [16] B. GRÜNBAUM, *Convex polytopes*, Interscience Publishers, 1963.
- [17] T. GUSTAFSSON, *Adaptive finite elements for obstacle problems*, Advances in Applied Mechanics (AAMS), 58 (2024), pp. 205–243. Chapter 5, <https://doi.org/10.1016/bs.aams.2024.03.004>.
- [18] J.-B. HIRIART-URRUTY AND C. LEMARÉCHAL, *Fundamentals of convex analysis*, Springer-Verlag, 2001.
- [19] C. JOHNSON AND V. THOMEE, *Error estimates for a finite element approximation of a minimal surface*, Math. Comput., 29 (1975), pp. 343–349.
- [20] D. KINDERLEHRER AND G. STAMPACCHIA, *An introduction to variational inequalities and their applications*, Academic Press, 1980.
- [21] H. LEBESGUE, *Leçons sur l'intégration et la recherche des fonctions primitives*, Gauthier-Villars, 1904.
- [22] D. G. LUENBERGER, *Optimization by vector space methods*. John Wiley and Sons, 1969.
- [23] B. B. MANDELBROT, *The Fractal Geometry of Nature*, W. H. Freeman and Company, 1982.
- [24] J. PEYPOUQUET, *Convex optimization in normed spaces. Theory, methods and examples*, SpringerBriefs Optim., Cham: Springer, 2015.
- [25] R. T. ROCKAFELLAR, *Convex analysis*, Princeton University Press, 1970.
- [26] G. SAMORODNITSKY AND M. S. TAQQU, *Stable non-gaussian random processes*, Chapman & Hall, 1994.
- [27] T. TAKAGI, *A simple example of a continuous function without derivative*, Proc. Phys.-Math. Soc. Japan, 1 (1903), pp. 124–125.
- [28] D. A. TARZIA, *Introduction to elliptic variational inequations and their application to free boundary problems. (Introducción a las inecuaciones variacionales elípticas y sus aplicaciones a problemas de frontera libre)*. Centro Latinoamericano de Matemática e Informática (CLAMI), 5. Buenos Aires: Centro Latinoamericano de Matemática e Informática (CLAMI). Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 208 p. (1981)., 1981.