

# Groupe 2

## EXERCICE

*On justifiera toutes les réponses.*

On appelle « fraction égyptienne » toute fraction de la forme  $\frac{1}{n}$ ,  $n$  désignant un nombre entier naturel non nul. Dans l’Egypte ancienne, on n’écrivait les nombres rationnels positifs inférieurs à 1 que sous la forme de sommes de « fractions égyptiennes » toutes différentes.

$$\text{Par exemple, } \frac{25}{28} \text{ peut s'écrire } \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{7}.$$

Le but du problème est de présenter quelques méthodes de décomposition de nombres rationnels en somme de « fractions égyptiennes » toutes différentes.

### Partie A : Exemples

1. Calculer la somme des six « fractions égyptiennes »  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{16}$ ,  $\frac{1}{32}$  et  $\frac{1}{64}$ .
2. Décomposer  $\frac{5}{8}$  en somme de « fractions égyptiennes » toutes différentes, dont les dénominateurs sont tous des puissances de 2.

### Partie B : Présentation d’une méthode de décomposition dans un cas particulier

On s’intéresse au cas où la fraction à décomposer a un numérateur égal à 2 et un dénominateur égal au produit de deux nombres entiers naturels impairs  $p$  et  $q$ .

1. Démontrer la formule 
$$\frac{2}{pq} = \frac{1}{p\left(\frac{p+q}{2}\right)} + \frac{1}{q\left(\frac{p+q}{2}\right)}$$
2. Justifier que les dénominateurs des fractions précédentes sont des nombres entiers naturels.
3. **En utilisant la formule établie à la question 1),** trouver deux décompositions différentes de  $\frac{2}{15}$  en somme de « fractions égyptiennes » différentes.
4. Soit  $n$  un nombre entier naturel non nul. Donner une décomposition de la fraction  $\frac{2}{2n+1}$  en somme de deux « fractions égyptiennes » différentes.

## Partie C « Algorithme glouton » de Fibonacci

En 1201, Léonard de Pise (1175-1250), dit « Fibonacci », prouva que tout nombre rationnel compris entre 0 et 1 peut s'écrire sous la forme d'une somme de « fractions égyptiennes » toutes différentes et proposa la méthode suivante pour obtenir une telle décomposition :

« Soustraire à la fraction donnée la plus grande fraction égyptienne possible qui lui est inférieure, répéter l'opération avec la nouvelle fraction, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on obtienne 0. »

1. Appliquer cet algorithme à  $\frac{13}{81}$  et donner une décomposition de la fraction  $\frac{13}{81}$  en somme de trois « fractions égyptiennes » toutes différentes.
2. Dans le papyrus Rhind (1650 av JC), exposé au *British Museum*, figure une des plus anciennes approximations du nombre  $\pi$  égale à  $\frac{256}{81}$  (écriture moderne).
  - a) Ecrire  $\frac{256}{81}$  sous la forme d'une somme d'un entier naturel et d'une fraction comprise entre 0 et 1.
  - b) Proposer une écriture de l'approximation de  $\pi$  donnée dans le papyrus Rhind sous forme d'une somme d'un nombre entier naturel et de « fractions égyptiennes » toutes différentes.