

Configuraciones centrales en el problema de los N -cuerpos

Fernando Mazzone

Depto de Matemática, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y
Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto
CONICET



Seminario de Investigación en Matemática Aplicada

Problema

Configuraciones
centrales

F. Mazzone

Problema de
los N -cuerpos

Ecuación
Simetrías

Soluciones
homográficas

Sistema físico

Espacio: Espacio euclideo d dimensional $d \geq 2$ (\mathbb{R}^d).

Objetos: N -puntos de masas m_1, m_2, \dots, m_N ,

Variables: tiempo t , posiciones $\vec{r}_i = \vec{r}_i(t) \in \mathbb{R}^d$, $i = 1, \dots, N$,

Fuerzas: gravitacionales,

Leyes físicas: Mecánica Newtoniana: Segunda Ley y Ley de gravitación universal.

Ecuación de los N -cuerpos

Configuraciones
centrales

F. Mazzone

Problema de
los N -cuerpos

Ecuación
Simetrías

Soluciones
homográficas

Ecuaciones N -cuerpos

$$\vec{r}_i''(t) = G \sum_{j \neq i} m_j \frac{\vec{r}_j - \vec{r}_i}{\|\vec{r}_j - \vec{r}_i\|^3}.$$

G constante gravitación universal, supondremos $G = 1$.

Problemas: mapa conceptual


Configuraciones
centrales

F. Mazzone

Problema de
los N -cuerpos

Ecuación
Simetrías

Soluciones
homográficas



Notaciones

Configuraciones
centrales

F. Mazzone

Problema de
los N -cuerpos

Ecuación
Simetrías

Soluciones
homográficas

$\vec{r} = (\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N) \in \mathbb{R}^{dN}$, Vector configuración,
 $r_{ij} = \|\vec{r}_i - \vec{r}_j\|$, distancias relativas,

$$M = \begin{pmatrix} M_1 & 0_{d \times d} & \cdots & 0_{d \times d} \\ 0_{d \times d} & M_2 & \cdots & 0_{d \times d} \\ \vdots & \ddots & & \vdots \\ 0_{d \times d} & \cdots & & M_N \end{pmatrix}, \quad M_j = \begin{pmatrix} m_j & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & m_j \end{pmatrix}$$

$$U(\vec{r}) = \sum_{i < j} \frac{m_i m_j}{r_{ij}} \quad \text{Potencial newtoniano}$$

$$\Delta = \{\vec{r}_i = \vec{r}_j \mid \text{para algunos } i \neq j\},$$

$$\mathbb{R}^{dN} - \Delta \quad \text{Espacio de configuraciones .}$$

Notaciones

Configuraciones
centrales

F. Mazzone

Problema de
los N -cuerpos

Ecuación
Simetrías

Soluciones
homográficas

$$\vec{v} = \vec{r}' \quad (\text{Velocidades})$$

$$K(\vec{v}) = \frac{1}{2} \vec{v} \cdot M \vec{v} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N m_j \|\vec{v}_j\|^2, \quad (\text{Energía cinética})$$

$$\vec{c} = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^N m_j \vec{r}_j, \quad \text{con } m := \sum_{j=1}^N m_j \quad (\text{Centro masas})$$

$$\vec{p} = \sum_{j=1}^N m_j \vec{v}_j, \quad (\text{momento total})$$

$$\omega_{kl} = \sum_{j=1}^N m_j \left(\vec{r}_{jk} \vec{v}_{jl} - \vec{r}_{jl} \vec{v}_{jk} \right), \quad (\text{Momento angular total } \omega^t = -\omega)$$

$$\boxed{M \vec{r}''(t) = \nabla U(\vec{r})}, \quad (\text{Ecuación } N\text{-cuerpos})$$



Simetrías e integrales primeras

Configuraciones
centrales

F. Mazzone

Problema de
los N -cuerpos

Ecuación
Simetrías

Soluciones
homográficas

- **Simetría por traslaciones** ($\vec{r}_j \rightarrow \vec{r}_j + \vec{v}_0 t + \vec{c}_0$, $\vec{c}_0, \vec{v}_0 \in \mathbb{R}^d$) \Rightarrow conservación $\vec{p} \Rightarrow$ movimiento rectilíneo uniforme de \vec{c}
- **Simetría por rotaciones** ($\vec{r}_j \rightarrow Q\vec{r}_j$, $Q \in O(d)$) \Rightarrow conservación ω

Soluciones homográficas

Configuraciones
centrales

F. Mazzone

Problema de
los N -cuerpos

Ecuación

Simetrías

Soluciones
homográficas

Definición