

# TEORÍA DE LIE Y ODE

Fernando Mazzone

Depto de Matemática  
Facultad de Ciencias Exactas Físico-Químicas y Naturales  
Universidad Nacional de Río Cuarto

11 de diciembre de 2014



# GRUPOS, REPASO

## GRUPOS

Sean  $G$  un conjunto y  $\alpha$  una función tal que  $\alpha : G \times G \rightarrow G$ . En el contexto de grupos es más usual la notación  $\alpha(g_1, g_2) = g_1 g_2$ . El par  $(G, \alpha)$  se llama un grupo si se satisface

- ❶  $(g_1 g_2) g_3 = g_1 (g_2 g_3)$ , para todos  $g_1, g_2, g_3 \in G$ ,
- ❷ Existe  $e \in G$  tal que  $eg = ge = g$ , para todo  $g \in G$ .
- ❸ Para todo  $g \in G$  existe  $h \in G$  tal que  $gh = hg = e$ . Se acostumbra denotar  $h = g^{-1}$ .

## EJEMPLOS DE GRUPOS

**Ejemplo 1** Sea  $\Pi$  un plano euclideo y  $G$  el conjunto de todas las transformaciones rígidas de  $\Pi$  en si mismo. Entonces  $G$  es un grupo con la operación de composición. Se llama el **grupo de transformaciones rígidas**


**Ejemplo 2** Sea  $X = \{x_1, \dots, x_n\}$  un conjunto de  $n$  elementos y  $S_n$  definido por

$$S_n = \{\sigma | \sigma : X \rightarrow X \text{ y } \sigma \text{ es biyectiva} \}$$

Entonces  $S_n$  es un grupo con la operación de composición. Se denomina **grupo simétrico**

# EJEMPLOS DE GRUPOS

**Ejemplo 3** Sea  $\Delta$  un polígono regular de  $n$  lados en un plano euclideo  $\Pi$  y  $D_{2n}$  el conjunto de todas las transformaciones rígidas de  $\Pi$  en si mismo que llevan  $\Delta$  en si mismo.  $D_{2n}$  se llama el **grupo diedral** de orden  $2n$ . Para un triángulo equilatero **grupo diedral**



# TEORÍA DE GRUPOS COMPUTACIONAL: SAGE Y GAP

**GAP - Groups, Algorithms, Programming** Lenguaje de programación para álgebra discreta

**SAGE:** es un sistema de software de matemáticas libre de código abierto bajo la licencia GPL. Se basa en muchos paquetes de código abierto existentes: NumPy, SciPy, matplotlib, SymPy, Maxima, GAP, FLINT, R y muchos más. Acceda a su poder combinado a través de un lenguaje común, basado en Python  
Misión: Creación de una alternativa libre de código abierto viable a Magma, Maple, Mathematica y Matlab.

# TEORÍA DE GRUPOS COMPUTACIONAL: SAGE Y GAP

<b>sage:</b> <code>G=SymmetricGroup(5)</code>	1
<b>sage:</b> <code>sigma=G([(1,2,3),(4,5)])</code>	2
<b>sage:</b> <code>sigma^2</code>	3
<code>(1,3,2)</code>	4
<b>sage:</b> <code>sigma^3</code>	5
<code>(4,5)</code>	6
<b>sage:</b> <code>sigma^6</code>	7
<code>()</code>	8
<b>sage:</b> <code>G.order()</code>	9
<code>120</code>	10
<b>sage:</b> <code>H=G.subgroup([sigma])</code>	11
<b>sage:</b> <code>H.order()</code>	12
<code>6</code>	13

# TEORÍA DE GRUPOS COMPUTACIONAL: SAGE Y GAP

<b>sage:</b> <code>H.list()</code>	14
<code>[(), (4,5), (1,2,3), (1,2,3)(4,5), (1,3,2),</code>	15
<code>(1,3,2)(4,5)]</code>	
<b>sage:</b> <code>H.is_normal()</code>	16
<code>False</code>	17
<b>sage:</b> <code>G1=DihedralGroup(3)</code>	18
<b>sage:</b> <code>G1[-2]</code>	19
<code>(1,3,2)</code>	20
<b>sage:</b> <code>H1=G1.subgroup(G1[-2])</code>	21
<b>sage:</b> <code>H1.is_normal()</code>	22
<code>True</code>	23
<b>sage:</b> <code>G1.quotient(H1)</code>	24
<code>Permutation Group with generators [(1,2)]</code>	25

# GRUPOS DE SIMETRÍAS

## GRUPOS DE SIMETRÍAS

Los cambios de variables de un conjunto de dos variables, digamos  $x$  e  $y$ , son funciones  $\varphi$ , invertibles, de clase  $C^\infty$ , donde  $\varphi : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ , con  $\Omega_1, \Omega_2$  abiertos de  $\mathbb{R}^2$ .

Acostumbraremos escribir  $(\xi, \eta) = \varphi(x, y)$  y diremos que  $(\xi, \eta)$  son la variables nuevas e  $(x, y)$  las viejas.

Llamaremos  $\mathcal{T}$  al conjunto de todas los cambios de variables  $\varphi$ . El conjunto  $\mathcal{T}$  tiene una estructura de grupo con la operación de composición.



## GRUPOS DE SIMETRÍAS, EJEMPLOS

**Ejemplo, polares:** Es más fácil describir la transformación que lleva coordenadas polares en cartesianas. En este caso

$(x, y) = \varphi(r, \theta)$  y

$$\varphi(r, \theta) = (r \cos(\theta), r \sin(\theta)),$$

$$\Omega_1 = (0, \infty) \times (-\pi, \pi),$$

$$\Omega_2 = \mathbb{R}^2 - \{(x, y) | y = 0, x \leq 0\}$$

# GRUPOS DE LIE UNIPARAMÉTRICOS

## GRUPOS UNIPARAMÉTRICOS DE SIMETRÍAS

Sea  $\mathcal{T}$  el grupo de cambios de variables. Supongamos dado un homomorfismo de grupos  $P : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathcal{T}, \circ)$ .

### Notación:

- ❶ Para  $\lambda \in \mathbb{R}$  escribiremos  $P_\lambda = P(\lambda)$
- ❷ Si  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  escribimos  $(\xi, \eta) = f(x, y, \lambda) := P_\lambda(x, y)$ .

Si  $f(x, y, \lambda)$  es diferenciable respecto a  $(x, y)$  y analítica respecto a  $\lambda$  diremos que  $\{P_\lambda | \lambda \in \mathbb{R}\}$  es un **grupo de Lie uniparamétrico de simetrías**.

# GRUPOS DE LIE UNIPARAMÉTRICOS

## PROPIEDADES DE $P_\lambda$

- 1  $P_\lambda$  es biyectiva y diferenciable sobre su dominio de definición en su imagen.
- 2  $P_{\lambda_1} \circ P_{\lambda_2} = P_{\lambda_1 + \lambda_2}$ , equivalentemente  $f(f(x, y, \lambda_1), \lambda_2) = f(x, y, \lambda_1 + \lambda_2)$ .
- 3  $P_0 = I$ , o  $f(x, y, 0) = (x, y)$ .
- 4  $(P_\lambda)^{-1} = P_{-\lambda}$
- 5 Si  $P_\lambda(x, y) = (\xi, \eta)$ , entonces  $\xi(x, y, \lambda)$  y  $\eta(x, y, \lambda)$  son diferenciables respecto  $(x, y)$  y se desarrollan en serie de potencias respecto a  $\lambda$ . Es decir para todo  $\lambda_0 \in \mathbb{R}$

$$\xi(x, y, \lambda) = a_0(x, y) + a_1(x, y)(\lambda - \lambda_0) + \dots$$

$$\eta(x, y, \lambda) = b_0(x, y) + b_1(x, y)(\lambda - \lambda_0) + \dots$$

## EJEMPLOS GRUPOS DE LIE UNIPARAMÉTRICOS

**Ejercicio:** Demostrar que las siguientes aplicaciones induce grupos de Lie uniparamétricos

①  $P_\lambda(x, y) = (x + \lambda, y)$  y  $P_\lambda(x, y) = (x, y + \lambda)$ .

②  $P_\lambda(x, y) = (e^\lambda x, y)$

③  $P_\lambda(x, y) = \left( \frac{x}{1-\lambda x}, \frac{y}{1-\lambda x} \right)$

④  $P_\lambda(x, y) = \begin{pmatrix} \cos(\lambda) & -\sin(\lambda) \\ \sin(\lambda) & \cos(\lambda) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

# CAMBIOS DE VARIABLES CON SYMPY

## PROCEDIMIENTO

- 1 Declarar variables independientes vieja y nueva,
- 2 Introducir relación entre ellas
- 3 Declarar variable dependiente nueva, como función de variable independiente nueva.
- 4 Introducir relación variables dependientes
- 5 Introducir ecuación.