

Durée : 2h00	Examen papier 2 feuilles R/V (manuscrites ou non) autorisées Calculatrice autorisée
--------------	---

Ce sujet contient un seul exercice avec plusieurs parties.

On considère le jeu de données Ozone. Nous souhaitons analyser la relation entre le maximum journalier de la concentration en ozone maxO3 (en microgrammes par millilitre : $\mu\text{g}/\text{m}^3$) et la température à différentes heures de la journée, la nébulosité à différentes heures de la journée, la projection du vent sur l'axe Est-ouest à différentes heures de la journée et la concentration maximale de la veille du jour considéré. Nous disposons de 112 données relevées durant l'été 2001 à Rennes (fichier ozone.txt).

A- Analyse Quantitative x Quantitative

L'objectif est d'étudier le lien entre le maximum journalier de la concentration en ozone (maxO3) et la température à 9h00 du matin (T9). Avec le logiciel R, nous avons obtenu ce résultat :

```
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -25.622     11.4551   -2.235    0.0274 *
T9            6.3130      0.6151   10.263   <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '****' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 20.24 on 110 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.4891,
Adjusted R-squared:  0.4845
F-statistic: 105.3 on 1 and 110 DF, p-value: < 2.2e-16
```

a) Déterminer la droite de régression de maxO3 en fonction de T9.

b) Quel est le pourcentage de variation de maxO3 expliquée par la droite de régression ?

c) Donner une estimation du coefficient de corrélation entre les deux variables maxO3 et T9.

d) Calculer la prévision de la valeur de maxO3 si la température à 9h00 du matin est de 15.6.

- e) On observe une concentration maximale $\text{maxO3}=87$ pour une température à 9h00 du matin de 15.6. Calculer le résidu dans ce cas.

- f) Comment peut-on vérifier les hypothèses sur les résidus. Comment peut-on valider un modèle de régression ?

On donne les indicateurs numériques suivants,

$$\bar{x} = 18.36, \bar{y} = 90.30, s_x^2 = 9.75, s_y^2 = 794.52, \text{cov}(x, y) = 61.56$$

où $y=\text{maxO3}$ et $x=T9$.

- g) Retrouver les coefficients de la droite de régression à partir de ces indicateurs (aux arrondis près).

B- Analyse Qualitative x Qualitative

L'objectif est d'étudier le lien entre les deux variables vent (Nord, Est, Ouest, Sud) et la variable Pluie (Pluie, Sec).

A partir des tableaux ci-dessous, répondez aux questions suivantes.

Tableau des effectifs observés					Tableau des fréquences observées						
	Est	Nord	Ouest	Sud	Total	Est	Nord	Ouest	Sud	Total	
Pluie	2	10	26	5	43	Pluie	0,02	0,09	0,23	0,04	0,38
Sec	8	16	23	16	63	Sec	0,07	0,14	0,14	0,14	
Humide	0	5	1	0	6	Humide	0,00	0,04	0,01	0,00	0,05
Total	10	31	50	21	112	Total	0,09	0,28	0,45	0,19	1,00

Tableau des profils lignes					Tableau des profils colonnes					
	Est	Nord	Ouest	Sud	Est	Nord	Ouest	Sud		
Pluie	0,05	0,23	0,60	0,12	Pluie	0,20	0,32	0,24		
Sec	0,13		0,37	0,25	Sec	0,80	0,52	0,46	0,76	
Humide	0,00	0,83	0,17	0,00	Humide	0,00	0,16	0,02	0,00	

a) Compléter les 4 cases vides dans les tableaux ci-dessus. Expliquez vos calculs.

b) Quel est le pourcentage des observations avec un vent d'Est et un temp pluvieux ?

c) Quel est le pourcentage des observations de vent de Sud ayant un temp sec ?

d) Avec quelles fréquences peut-on comparer les profils lignes ? Que pouvez-vous en conclure sur le lien entre les deux variables ? Argumentez votre réponse.

e) Calculer le tableau des effectifs théoriques, en détaillant le calcul d'une seule case.

- f) On suppose que la distance de khi-deux est de 17.7, donner une conclusion sur le lien entre les variables. Justifiez votre réponse.

Voici le tableau de seuils de décision :

d.d.l	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15
Seuil	5.99	7.82	9.49	11.075	12.59	14.07	15.51	16.92	18.31	24.99

C- Analyse Quantitative x Qualitative

On souhaite étudier le lien entre les deux variables **T9 et Pluie**.

Analysis of Variance Table

Response: T9

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
as.factor(pluie)	1	159.05	159.050	18.948	3.022e-05 ***
Residuals	110	923.36	8.394		

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 '' 1

- a) Donner les variances inter-groupe et intra-groupe.

b) Déduire la variance totale.

c) Calculer le rapport de corrélation. Commenter.

D- ACP

Nous réalisons une analyse en composantes principales sur les variables : maxO3, T9, Ne9, Vx9 et maxO3v. (les résultats sont en Annexe).

a) Le nuage de points est constitué de combien de points ? Combien de dimensions sont nécessaires pour représenter les points ?

a) Comment est définie la quantité d'information (inertie) contenue dans le nuage de points ? A partir de quelle matrice peut-on la calculer et comment la calcule-t-on ?

b) Quel est le pourcentage manquant dans le tableau des valeurs propres ?

c) Combien d'axes faut-il retenir et pourquoi ?

d) Quel est la contribution théorique (poids) de chaque variable ?

e) Utiliser les résultats sur les variables de l'annexe pour étudier la qualité de représentation des variables T9 et Vx9 ?

f) Interpréter le graphe des variables.

Annexe

Résultats sur les valeurs propres :

	eigenvalue	percentage of variance
comp 1	3.021	60.422
comp 2	0.879	17.575
comp 3	0.610	
comp 4	0.300	5.990
comp 5	0.191	3.822

Résultats sur les variables

