




线性代数 (B1)

习题课讲义

作者：助教-崔平凡

时间：2024 秋

版本：1.0



我看见极光撕开夜空，星星从间隙里洒下，洒在我的怀里，洒满我的眼底。

目录

第 1 章 作业答案	1
1.1 第四周作业	1
第 2 章 习题课讲义	4
2.1 第三次习题课	4
2.1.1 基础矩阵与标准单位向量	4
2.1.2 迹及其应用	5
2.1.3 降阶公式及其应用	6
2.1.4 利用矩阵乘法计算行列式	8
2.1.5 摄动法及其应用	9
2.1.6 运用多项式处理行列式	9

第 1 章 作业答案

1.1 第四周作业

习题 1.1 (第三章第 1 题)

计算下列行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & -4 \\ -1 & -3 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & 2 \end{vmatrix}$$

$$(2) \begin{vmatrix} 1 & 4 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ -3 & 3 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$(3) \begin{vmatrix} x+a & x+b & x+c \\ y+a & y+b & y+c \\ z+a & z+b & z+c \end{vmatrix}$$

$$(4) \begin{vmatrix} & & a_{1n} \\ & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$(5) \begin{vmatrix} a^2 & (a+1)^2 & (a+2)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b+2)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c+2)^2 \end{vmatrix}$$

$$(6) \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & 0 & 0 & 0 \\ b_1 & b_2 & 0 & 0 & 0 \\ c_1 & c_2 & c_3 & 0 & 0 \\ d_1 & d_2 & d_3 & d_4 & 0 \\ e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 \end{vmatrix}$$

解 (1)

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & -4 \\ -1 & -3 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & -3 & 1 & -6 \\ 2 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & -3 & 1 & -6 \\ 0 & -1 & 2 & 8 \\ 0 & 3 & -3 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & 1 & -6 \\ -1 & 2 & 8 \\ 3 & -3 & 2 \end{vmatrix} = -40.$$

(2)

$$\begin{vmatrix} 1 & 4 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ -3 & 3 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 4 & -1 & -1 \\ 0 & -4 & 1 & 2 \\ -3 & 3 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 4 & -1 & -1 \\ 0 & -4 & 1 & 2 \\ 0 & 15 & -7 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & 1 & 2 \\ 15 & -7 & -3 \\ 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = -20.$$

(3)

$$(法一) \begin{vmatrix} x+a & x+b & x+c \\ y+a & y+b & y+c \\ z+a & z+b & z+c \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x-y & x-y & x-y \\ y+a & y+b & y+c \\ z+a & z+b & z+c \end{vmatrix} = (x-y) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ y+a & y+b & y+c \\ z+a & z+b & z+c \end{vmatrix} = (x-y) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a & b & c \end{vmatrix} = 0.$$

(法二) 可以将行列式

$$f(x) \triangleq \begin{vmatrix} x+a & x+b & x+c \\ y+a & y+b & y+c \\ z+a & z+b & z+c \end{vmatrix}$$

看成系数为 $F[y, z]$ 关于 x 的多项式. 根据行列式的完全展开式知 $f(x)$ 为关于 x 的一次多项式且有两个根 y, z . 故 $f(x) = 0$.

(4)

$$\begin{vmatrix} & & & a_{1n} \\ & & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{n+1} a_{1n} \begin{vmatrix} & & a_{2,n-1} \\ & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n-1,n-1} \end{vmatrix} = \cdots = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n} a_{2,n-1} \cdots a_{n1}.$$

(5) 考虑如下多项式函数

$$f(x) \triangleq \begin{vmatrix} x^2 & (x+1)^2 & (x+2)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b+2)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c+2)^2 \end{vmatrix}$$

由行列式的完全展开式知 $f(x)$ 为关于 x 的二次多项式. 易知 $f(b) = f(c) = 0$, 故可设 $f(x) = \lambda(x-b)(x-c)$.

$$\lambda bc = f(0) = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 4 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b+2)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c+2)^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 4 \\ b^2 & b^2+b & b^2 \\ c^2 & c^2+c & c^2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} b^2 & b^2 \\ c^2 & c^2 \end{vmatrix} + 4 \begin{vmatrix} b^2 & b^2+b \\ c^2 & c^2+c \end{vmatrix} = 4bc(b-c)$$

故 $\lambda = 4(b-c)$, 于是 $f(x) = 4(b-c)(x-b)(x-c)$. 带入 $x = a$ 有

$$f(a) = \begin{vmatrix} a^2 & (a+1)^2 & (a+2)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b+2)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c+2)^2 \end{vmatrix} = 4(b-c)(a-b)(a-c).$$

(6) 由行列式的 Laplace 展开

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & 0 & 0 & 0 \\ b_1 & b_2 & 0 & 0 & 0 \\ c_1 & c_2 & c_3 & 0 & 0 \\ d_1 & d_2 & d_3 & d_4 & 0 \\ e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} c_3 & 0 & 0 \\ d_3 & d_4 & 0 \\ e_3 & e_4 & e_5 \end{vmatrix} = (a_1 b_2 - a_2 b_1) c_3 d_4 e_5.$$

习题 1.2 (第三章第 2 题)

在三维直角坐标系中, 已知点 A, B, C, D 的坐标分别是 $(1, 1, 0), (3, 1, 2), (0, 1, 3), (2, 2, 4)$. 求四面体 $ABCD$ 的体积及各个面的面积.

解 $\overrightarrow{AB} = (2, 0, 2), \overrightarrow{AC} = (-1, 0, 3), \overrightarrow{AD} = (1, 1, 4), \overrightarrow{BC} = (-3, 0, 1), \overrightarrow{BD} = (-1, 1, 2).$

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = (0, -8, 0)$$

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \end{vmatrix} = (-2, -6, 2)$$

$$\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AD} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 4 \end{vmatrix} = (-3, 7, -1)$$

$$\overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{BD} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -3 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = (-1, 5, -3)$$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}|\vec{AB} \times \vec{AC}| = 4, S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2}|\vec{AB} \times \vec{AD}| = \sqrt{11}, S_{\triangle ACD} = \frac{1}{2}|\vec{AC} \times \vec{AD}| = \frac{\sqrt{59}}{2}, S_{\triangle BCD} = \frac{1}{2}|\vec{BC} \times \vec{BD}| = \frac{\sqrt{35}}{2}.$$

$$V_{ABCD} = \frac{1}{6}|(\vec{AB} \times \vec{AC}) \cdot \vec{AD}| = \frac{1}{6}\text{abs}\left(\begin{vmatrix} 2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 4 \end{vmatrix}\right) = \frac{4}{3}.$$

习题 1.3 (第三章第 3 题)

将行列式

$$\begin{vmatrix} x-2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & x-2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & x-2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & x-2 \end{vmatrix}$$

展开为关于 x 的多项式.

解

$$\begin{vmatrix} x-2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & x-2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & x-2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & x-2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -x^2+4x-3 & 2-x & 0 \\ 1 & x-2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & x-2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & x-2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & x-2 & 1 & 0 \\ 0 & x^2-4x+3 & x-2 & 0 \\ 0 & 1 & x-2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & x-2 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} x^2-4x+3 & x-2 & 0 \\ 1 & x-2 & 1 \\ 0 & 1 & x-2 \end{vmatrix} = (x^2-4x+3) \begin{vmatrix} x-2 & 1 \\ 1 & x-2 \end{vmatrix} - (x-2) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & x-2 \end{vmatrix} = (x^2-4x+3)^2 - (x-2)^2$$

$$= (x^2-3x+1)(x^2-5x+5).$$

习题 1.4 (第三章第 4 题)

 A 为 n 阶方阵, λ 为常数. 证明: $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$ **证明** 由矩阵数乘的定义及行列式映射的多重线性性知 $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$.

习题 1.5 (第三章第 5 题)

方阵 A 称为反对称方阵, 如果它的转置方阵等于 $-A$. 证明: 奇数阶反对称方阵的行列式为零.**证明** 由第四题知 $\det(A) = \det(A^T) = \det(-A) = (-1)^n \det(A)$. 由于 n 为奇数, 因此 $\det(A) = -\det(A)$. 故 $2\det(A) = 0$, 即 $\det(A) = 0$.

第2章 习题课讲义

2.1 第三次习题课

2.1.1 基础矩阵与标准单位向量

定义 2.1

n 维标准列向量是指以下 n 个 n 维列向量

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

定义 2.2

n 阶基础矩阵是指 n^2 个 n 阶矩阵 $\{E_{ij}(i, j = 1, 2, \dots, n)\}$. 其中 $E_{ij} \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 它的第 (i, j) 元素是 1, 其他元素为 0.

性质 (1) $e_i^T e_j = 0, e_i^T e_i = 1$. 其中 $i \neq j$;

(2) 若 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$, 则 Ae_i 为 A 的第 i 个列向量; $e_i^T A$ 为 A 的第 i 个行向量;

(3) 若 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$, 则 $e_i^T A e_j = a_{ij}$;

(4) $E_{ij} E_{kl} = \delta_{jk} E_{il}$;

(5) 若 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 则 $E_{ij} A$ 将 A 的第 j 行变成第 i 行, 其他元素变为 0;

(6) 若 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 则 $A E_{ij}$ 将 A 的第 i 列变成第 j 列, 其他元素变为 0.

习题 2.1

设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

证明:

$$A^k = \begin{pmatrix} 0 & I_{n-k} \\ I_k & 0 \end{pmatrix}.$$

证明 将矩阵 A 写成 $A = (e_n, e_1, \dots, e_{n-1})$. 由分块矩阵的乘法及性质 (2), 有 $A^2 = (Ae_n, Ae_1, Ae_2, \dots, Ae_{n-1}) = (e_{n-1}, e_n, e_1, \dots, e_{n-2})$. 如此下去便可得到结论.

习题 2.2

具有以下形状的矩阵称为循环矩阵

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}.$$

证明：同阶循环矩阵的乘积仍然是循环矩阵。

证明 设

$$J = \begin{pmatrix} 0 & I_{n-1} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

注意到任意循环矩阵 A 可以表示为 $A = a_1 I_n + a_2 J + a_3 J^2 + \cdots + a_n J^{n-1}$ 的形式，反之有如前形式的矩阵也一定是循环矩阵。两个循环矩阵的乘积可以写成关于 J 的两个多项式的乘积，又 $J^n = I_n$ ，即可得到结论。

习题 2.3

设 A 是 n 阶上三角矩阵且主对角线上元素全为零，证明： $A^n = 0$ 。

证明 可以设

$$A = \sum_{i < j} a_{ij} E_{ij}.$$

当 $j \neq k$ 时， $E_{ij}E_{kl} = 0$ ，因此在 A^n 的乘法展开式中，可能的非 0 项只能具有形状 $E_{ij_1}E_{j_1j_2} \cdots E_{j_{n-1}j_n}$ ，且 $1 \leq i < j_1 < j_2 < \cdots < j_n \leq n$ 。显然这是不可能的，因此 $A^n = 0$ 。

2.1.2 迹及其应用

定义 2.3

设 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ ，则 A 上主对角线元素之和称为矩阵 A 的迹，记为 $\text{tr}(A)$ 。

性质 若 $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}, k \in \mathbb{F}$ ，则

- (1) $\text{tr}(A+B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$;
- (2) $\text{tr}(kA) = k(\text{tr}A)$;
- (3) $\text{tr}A^T = \text{tr}A$;
- (4) $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ 。

命题 2.1 (迹的等价刻画)

若映射 $f: \mathbb{F}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{F}$ ，对任意 $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}, k \in \mathbb{F}$ ，满足

- (1) $f(A+B) = f(A) + f(B)$;
- (2) $f(kA) = kf(A)$;
- (3) $f(AB) = f(BA)$;
- (4) $f(I_n) = n$ 。

则 f 是迹。

证明 由 f 的线性性知， $f(E_{11}) + f(E_{22}) + \cdots + f(E_{nn}) = f(E_{11} + E_{22} + \cdots + E_{nn}) = f(I_n) = n$ 。

又 $f(E_{ii}) = f(E_{ij}E_{ji}) = f(E_{ji}E_{ij}) = f(E_{jj})$ ，故 $f(E_{ii}) = 1$ 。当 $i \neq j$ 时， $E_{ij} = E_{i1}E_{1j}$ ，则 $f(E_{ij}) = f(E_{i1}E_{1j}) =$

$f(E_{1j}E_{i1}) = f(0) = f(0I_n) = 0f(I_n) = 0$. 设 $A = (a_{ij})$, 则 $f(A) = f(\sum_{i,j=1}^n a_{ij}E_{ij}) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}f(E_{ij}) = \sum_{i=1}^n a_{ii} = \text{tr}A$. 即映射 f 就是迹.

习题 2.4

不存在矩阵 $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 使得 $AB - BA = kI_n$, 其中 $k \neq 0$.

证明 若存在这样的矩阵 A, B , 使得 $AB - BA = kI_n$, 且 $k \neq 0$. 同时取迹, 有 $0 = \text{tr}(AB) - \text{tr}(BA) = \text{tr}(AB - BA) = \text{tr}(kI_n) = kn$, 矛盾!

习题 2.5

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 证明: $\text{tr}(AA^T) \geq 0$, 等号成立当且仅当 $A = 0$.

证明 设 $A = (a_{ij})$, 经计算易得 $\text{tr}(AA^T) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}^2 \geq 0$. 等号成立当且仅当 $a_{ij} = 0, \forall i, j$, 即 $A = 0$.

习题 2.6

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 满足 $AA^T = A^2$, 证明: A 是对称矩阵.

证明 只需证明 $A - A^T = 0$. 由上题知只需证明 $\text{tr}((A - A^T)(A - A^T)^T) = 0$ 即可. 由 $AA^T = A^2$, 知 $A^T A = (A^T)^2$. $\text{tr}((A - A^T)(A - A^T)^T) = \text{tr}((A - A^T)(A^T - A)) = \text{tr}(AA^T - A^2 - (A^T)^2 + A^T A) = \text{tr}(A^T A - AA^T) = \text{tr}(A^T A) - \text{tr}(AA^T) = 0$, 从而结论得证.

2.1.3 降阶公式及其应用**命题 2.2**

若 $A \in \mathbb{F}^{m \times m}, B \in \mathbb{F}^{m \times n}, C \in \mathbb{F}^{n \times m}, D \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 其中 A 可逆, 则

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det A \cdot \det(D - CA^{-1}B).$$

证明 注意到

$$\begin{pmatrix} I_m & 0 \\ -CA^{-1} & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}$$

上述等式两边同时取行列式即可得到结论.

注 当 D 可逆时, 有

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ -D^{-1}C & I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A - BD^{-1}C & B \\ 0 & D \end{pmatrix}.$$

故

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det D \cdot \det(A - BD^{-1}C).$$

于是, 当矩阵 A, D 同时可逆时, 有如下等式

$$\det A \cdot \det(D - CA^{-1}B) = \det D \cdot \det(A - BD^{-1}C). \quad (2.1)$$

等式 (2.1) 我们称为降阶公式.

推论 2.1

若 $A \in \mathbb{F}^{n \times m}, B \in \mathbb{F}^{m \times n}$, 且 $n \geq m$, 则

$$\det(\lambda I_n - AB) = \lambda^{n-m} \det(\lambda I_m - BA).$$



证明 当 $\lambda \neq 0$ 时, 考虑矩阵

$$\begin{pmatrix} \lambda I_m & B \\ A & I_n \end{pmatrix}$$

对上述矩阵作同命题 2.2 及其注记中的处理.

当 $\lambda = 0$ 时, 分别考虑 $m = n$ 和 $n > m$ 的情况.

习题 2.7 (小测第四题)

计算 n 阶行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix}.$$



解 注意到

$$A = -I_n + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} (1, 1, \cdots, 1).$$

由推论 2.1 知

$$\det A = \det \left(-I_n + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} (1, 1, \cdots, 1) \right) = (-1)^{n-1} \det \left(-1 + (1, 1, \cdots, 1) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right) = (-1)^{n-1} (n-1).$$

习题 2.8 (第五周作业)

计算下列 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}.$$

其中 $a_i \neq 0, i = 1, 2, \cdots, n$.



解

$$\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix} = \det 1 \cdot \det \begin{pmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} 1^{-1} (1, 1, \cdots, 1)$$

$$= \det \begin{pmatrix} a_1 & & \\ & a_2 & \\ & & \ddots \\ & & & a_n \end{pmatrix} \cdot \det(1 + (1, 1, \dots, 1) \begin{pmatrix} \frac{1}{a_1} & & \\ & \frac{1}{a_2} & \\ & & \ddots \\ & & & \frac{1}{a_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}) = \left(\prod_{i=1}^n a_i\right) \left(1 + \sum_{j=1}^n \frac{1}{a_j}\right)$$

$$= \prod_{i=1}^n a_i + \sum_{j=1}^n \prod_{k \neq j} a_k.$$

注 后面将处理存在 $a_i = 0$ 的情形.

2.1.4 利用矩阵乘法计算行列式

习题 2.9

设 $s_k = x_1^k + x_2^k + \dots + x_n^k (k \geq 0)$, $s_0 = n$

$$S = \begin{pmatrix} s_0 & s_1 & s_2 & \cdots & s_{n-1} \\ s_1 & s_2 & s_3 & \cdots & s_n \\ s_2 & s_3 & s_4 & \cdots & s_{n+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ s_{n-1} & s_n & s_{n+1} & \cdots & s_{2n-2} \end{pmatrix}.$$

求 $\det S$, 并证明当 $x_i \in \mathbb{R}$ 时, 有 $\det S \geq 0$.



解 设

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

则 $S = VV^T$, 因此 $\det S = (\det V)^2 = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)^2 \geq 0$.

习题 2.10

计算下列矩阵 A 的行列式

$$A = \begin{pmatrix} x & y & -z & w \\ y & -x & -w & -z \\ z & -w & x & y \\ w & z & y & -x \end{pmatrix}.$$



解 注意到 $AA^T = \text{diag}(u, u, u, u)$, 其中 $u = x^2 + y^2 + z^2 + w^2$. 于是

$$(\det A)^2 = (x^2 + y^2 + z^2 + w^2)^4.$$

因此 $\det A = (x^2 + y^2 + z^2 + w^2)^2$ 或者 $\det A = -(x^2 + y^2 + z^2 + w^2)^2$, 带入 $x = 1, y = z = w = 0$, 有 $\det A = 1$, 故 $\det A = (x^2 + y^2 + z^2 + w^2)^2$.

2.1.5 摄动法及其应用

命题 2.3

若 A 是一个 n 阶方阵, 则存在一个正数 a , 使得对任意的 $0 < t < a$, 矩阵 $tI_n + A$ 总是可逆矩阵.

证明 由行列式的展开式, 可以假设

$$\det(tI_n + A) = t^n + a_1 t^{n-1} + \cdots + a_{n-1}t + a_n.$$

这是一个关于 t 的 n 次多项式, 其上至多有 n 个不同的根. 若上述多项式的根均为零, 则可取 $a = 1$; 若上述多项式有非零根, 则可取 a 为上述多项式模长的最小值. 无论上述哪种情况, 当 $0 < t_0 < a$ 时, t_0 都不会是上述多项式的根, 因此 $\det(t_0 I_n + A) \neq 0$, 即矩阵 $t_0 I_n + A$ 可逆.

注 这个命题告诉我们对任意的 n 阶矩阵 A , 经过微小的一维摄动后, $tI_n + A$ 总能成为一个可逆矩阵.

笔记 摄动法原理 设 A 是 n 阶矩阵, 由上面命题知, 存在一列有理数 $t_k \rightarrow 0$, 使得 $t_k I_n + A$ 都是可逆矩阵. 如果一个矩阵问题对可逆矩阵成立, 特别地对 $t_k I_n + A$ 成立, 并且该问题关于 t_k 连续, 则可以让 $t_k \rightarrow 0$, 最后得到该问题对一般的方阵 A 也成立. 需要注意的是: 摄动法处理矩阵问题时一定要关于 t_k 连续. 这一点非常重要, 否则我们将不能用摄动法来归结处理. 一般而言, 运用摄动法分为两步: 首先处理可逆矩阵情形; 其次再利用摄动以及取极限得到一般情况的证明. 接下来, 我们来看一个具体的例子.

习题 2.11

设 $A, B, C, D \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 且 $AC = CA$. 证明:

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(AD - CB).$$

证明 若矩阵 A 可逆, 由命题 2.2 及矩阵 A, C 的交换性知

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det A \cdot \det(D - CA^{-1}B) = \det(AD - ACA^{-1}B) = \det(AD - CB).$$

对于一般的方阵 A , 可以取到一列有理数 $t_k \rightarrow 0$, 使得 $t_k I_n + A$ 是可逆矩阵, 且 $(t_k I_n + A)C = C(t_k I_n + A)$. 由前面分析知

$$\det \begin{pmatrix} t_k I_n + A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det((t_k I_n + A)D - CB).$$

注意到上述等式两边均为关于 t_k 的多项式, 从而关于 t_k 连续 (适合摄动法使用条件). 上述等式两边同时取极限, 令 $t_k \rightarrow 0$, 即有

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(AD - CB).$$

结论得证.

2.1.6 运用多项式处理行列式

命题 2.4

设多项式

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0.$$

若 $f(x)$ 有 $n+1$ 个不同的根 $b_1, b_2, \cdots, b_{n+1}$, 即 $f(b_1) = f(b_2) = \cdots = f(b_{n+1}) = 0$, 则 $f(x)$ 是零多项式.

证明 由假设 $x_0 = a_0, x_1 = a_1, \dots, x_{n-1} = a_{n-1}, x_n = a_n$ 是下列方程组的解

$$\begin{cases} x_0 + b_1 x_1 + \dots + b_1^{n-1} x_{n-1} + b_1^n x_n = 0 \\ x_0 + b_2 x_1 + \dots + b_2^{n-1} x_{n-1} + b_2^n x_n = 0 \\ \dots\dots\dots \\ x_0 + b_{n+1} x_1 + \dots + b_{n+1}^{n-1} x_{n-1} + b_{n+1}^n x_n = 0 \end{cases}$$

上述线性方程组的系数是一个 *Vander Monde* 行列式, 又 b_1, b_2, \dots, b_{n+1} 互不相同, 所以系数行列式不为零. 由 *Cramer* 法则知上述方程组只有零解, 即 $a_n = a_{n-1} = \dots = a_1 = a_0 = 0$, 故 $f(x)$ 是零多项式.

习题 2.12

设 $f_k(x) (k = 1, 2, \dots, n)$ 是次数不超过 $n-2$ 的多项式, 证明: 对任意 n 个数 a_1, a_2, \dots, a_n 均有

$$\begin{vmatrix} f_1(a_1) & f_2(a_1) & \dots & f_n(a_1) \\ f_1(a_2) & f_2(a_2) & \dots & f_n(a_2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_1(a_n) & f_2(a_n) & \dots & f_n(a_n) \end{vmatrix} = 0.$$

证明 考虑如下多项式函数

$$g(x) \triangleq \begin{vmatrix} f_1(x) & f_2(x) & \dots & f_n(x) \\ f_1(a_2) & f_2(a_2) & \dots & f_n(a_2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_1(a_n) & f_2(a_n) & \dots & f_n(a_n) \end{vmatrix} = 0.$$

若 $a_i (i = 2, \dots, n)$ 中有相同者, 则显然有 $g(x) = 0$. 若诸 a_i 互不相同, 则由 $g(a_i) = 0 (i = 2, \dots, n)$, 知 $g(x)$ 有 $n-1$ 个互不相同的根, 由命题 2.4, 知 $g(x) = 0$. 综上, 无论何种情况, 总有 $g(x) = 0$, 特别 $g(a_1) = 0$, 因此原行列式值等于零.

习题 2.13

计算下列 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 1+a_n \end{vmatrix}.$$

解 考虑如下多项式函数

$$f(x) \triangleq \begin{vmatrix} 1+a_1+x & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1+a_2+x & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 1+a_n+x \end{vmatrix}.$$

存在自然数 N , 当 $x > N$ 时, $a_i + x (i = 1, 2, \dots, n)$ 全不为零. 于是由习题 2.8 知, 当 $x > N$ 时 $f(x) = \prod_{i=1}^n (a_i + x) + \sum_{j=1}^n \prod_{k \neq j} (a_k + x)$. 再由命题 2.4 知 $f(x) = \prod_{i=1}^n (a_i + x) + \sum_{j=1}^n \prod_{k \neq j} (a_k + x)$ 对任意 x 成立. 特别对

$x = 0$ 成立. 因此

$$\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^n a_i + \sum_{j=1}^n \prod_{k \neq j} a_k.$$