

线性代数 B2 课程讲义

陈洪佳

中国科学技术大学数学科学学院

目录

1	B系列线性代数简介	3
2	行列式	5
2.1	行列式: 线性代数(B1)回顾	5
2.2	Laplace展开定理	5
2.3	行列式计算	7
2.3.1	化为三角形	7
2.3.2	建立递推公式	8
2.3.3	加边	12
2.3.4	拆行	13
2.3.5	视行列式为某些元素的多项式	15
2.3.6	Laplace展开	18
2.3.7	公式法	19
2.3.8	反对称矩阵	19
3	矩阵	23
3.1	矩阵: 线性代数(B1)回顾	23
3.2	Binet-Cauchy公式	23
3.3	分块矩阵	26
3.4	一些例子	29
3.4.1	A^k 和 e^A	29
3.4.2	矩阵的逆	31
3.4.3	秩与相抵	32

Chapter 1

B系列线性代数简介

参考课程PPT.

Chapter 2

行列式

2.1 行列式: 线性代数(B1)回顾

参考课程PPT.

2.2 Laplace展开定理

定义 2.2.1. 设方阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$. 子式 $A \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_r \\ j_1, \dots, j_r \end{pmatrix}$ 的余子式即 A 删除第 $i_1, \dots, i_r$ 行和第 $j_1, \dots, j_r$ 列后得到的子方阵行列式. 更具体地, 若 $(i_1, \dots, i_r)$ 和 $(j_1, \dots, j_r)$ 是 $\{1, \dots, n\}$ 的两个排列且 $i_{r+1} < \dots < i_n, j_{r+1} < \dots < j_n$, 则子式 $A \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_r \\ j_1, \dots, j_r \end{pmatrix}$ 的余子式即 $A \begin{pmatrix} i_{r+1}, \dots, i_n \\ j_{r+1}, \dots, j_n \end{pmatrix}$, 同时称

$$(-1)^{i_1 + \dots + i_r + j_1 + \dots + j_r} A \begin{pmatrix} i_{r+1}, \dots, i_n \\ j_{r+1}, \dots, j_n \end{pmatrix}$$

为它的代数余子式.

下面的定理就是按行 $i_1, \dots, i_r$ 展开的 Laplace 公式:

定理 2.2.1. 设 $1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq n$. 则对于方阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$,

$$\det A = \sum_{\text{行为第 } i_1, \dots, i_r \text{ 行}} \text{子式} \times \text{对应的代数余子式}.$$

更具体地说,

$$\det A = \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_r \leq n} A \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_r \\ j_1, \dots, j_r \end{pmatrix} (-1)^{i_1 + \dots + i_r + j_1 + \dots + j_r} A \begin{pmatrix} i_{r+1}, \dots, i_n \\ j_{r+1}, \dots, j_n \end{pmatrix}. \quad (2.1)$$

这里 $(i_1, \dots, i_r), (j_1, \dots, j_r)$ 是 $\{1, \dots, n\}$ 的排列, 且 $i_{r+1} < \dots < i_n$ 和 $j_{r+1} < \dots < j_n$.

证明. 设 $A = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$. 先考虑 $(i_1, i_2, \dots, i_r) = (1, 2, \dots, r)$ 的情形, 此时 $(i_{r+1}, \dots, i_n) = (r+1, \dots, n)$. 对于 $1 \leq j_1 < \dots < j_r \leq n$, 记 $I = \{j_1, \dots, j_r\}$, 定义集合 S 为 I 的所有排列.

则有

$$\begin{aligned}
 \Delta &= \det(\alpha_1, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n) \\
 &= \det \left(\sum_{k_1=1}^n a_{1k_1} e_{k_1}, \dots, \sum_{k_r=1}^n a_{rk_r} e_{k_r}, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n \right) \\
 &= \sum_{k_1=1}^n \cdots \sum_{k_r=1}^n a_{1k_1} \cdots a_{rk_r} \det(e_{k_1}, \dots, e_{k_r}, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n) \\
 &= \sum_{1 \leq j_1 < \cdots < j_r \leq n} \sum_{(k_1, \dots, k_r) \in S} a_{1k_1} a_{2k_2} \cdots a_{rk_r} \det(e_{k_1}, \dots, e_{k_r}, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n) \\
 &= \sum_{1 \leq j_1 < \cdots < j_r \leq n} A \begin{pmatrix} 1, \dots, r \\ j_1, \dots, j_r \end{pmatrix} (-1)^{1+\cdots+r+j_1+\cdots+j_r} A \begin{pmatrix} r+1, \dots, n \\ j_{r+1}, \dots, j_n \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

其中最后一步由如下引理给出:

引理: 设 $1 \leq j_1 < \cdots < j_r \leq n$, 则有如下等式

$$\begin{aligned}
 &\sum_{(k_1, \dots, k_r) \in S} a_{1k_1} a_{2k_2} \cdots a_{rk_r} \det(e_{k_1}, \dots, e_{k_r}, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n) \\
 &= A \begin{pmatrix} 1, \dots, r \\ j_1, \dots, j_r \end{pmatrix} (-1)^{1+\cdots+r+j_1+\cdots+j_r} A \begin{pmatrix} r+1, \dots, n \\ j_{r+1}, \dots, j_n \end{pmatrix}.
 \end{aligned} \tag{2.2}$$

证明. 令 $\beta_i = a_{ij_1} e_{j_1} + \cdots + a_{ij_r} e_{j_r}$, 其中 $1 \leq i \leq r$. 考虑行列式

$$\Delta = \det(\beta_1, \dots, \beta_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n).$$

一方面, 经过 $j_1 - 1$ 次相邻两列对换将第 j_1 列换到第 1 列, 再经过 $j_2 - 2$ 次相邻两列对换将第 j_2 列换到第 2 列, 以此类推, 经过 $j_1 - 1 + \cdots + j_r - r$ 次对换后第 $j_1, \dots, j_r$ 列分别换到第 $1, \dots, r$ 列, 立即有

$$\begin{aligned}
 \Delta &= (-1)^{j_1-1+j_2-2+\cdots+j_r-r} \begin{vmatrix} a_{1j_1} & \cdots & a_{1j_r} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{rj_1} & \cdots & a_{rj_r} & 0 & \cdots & 0 \\ * & * & * & a_{r+1,j_{r+1}} & \cdots & a_{r+1,j_n} \\ * & * & * & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & * & a_{n,j_{r+1}} & \cdots & a_{n,j_n} \end{vmatrix} \\
 &= A \begin{pmatrix} 1, \dots, r \\ j_1, \dots, j_r \end{pmatrix} (-1)^{1+\cdots+r+j_1+\cdots+j_r} A \begin{pmatrix} r+1, \dots, n \\ j_{r+1}, \dots, j_n \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

另一方面, 由行列式性质有

$$\begin{aligned}
 \Delta &= \det(\beta_1, \dots, \beta_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n) \\
 &= \det \left(\sum_{k_1 \in I} a_{1k_1} e_{k_1}, \dots, \sum_{k_r \in I} a_{rk_r} e_{k_r}, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n \right) \\
 &= \sum_{k_1 \in I} \cdots \sum_{k_r \in I} a_{1k_1} \cdots a_{rk_r} \det(e_{k_1}, \dots, e_{k_r}, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n) \\
 &= \sum_{(k_1, \dots, k_r) \in S} a_{1k_1} a_{2k_2} \cdots a_{rk_r} \det(e_{k_1}, \dots, e_{k_r}, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n).
 \end{aligned}$$

□

对于一般情况, 可以经过 $i_1 - 1$ 次相邻行对换将第 i_1 行换到第 1 行, 其他行相对次序不变, 以此类推, 经 $i_1 - 1 + \cdots + i_r - r$ 次对换后第 $i_1, \cdots, i_r$ 行换到第 $1, \cdots, r$ 行, 原行列式与新行列式的差别是 $(-1)^{i_1 + \cdots + i_r + 1 + \cdots + r}$ 倍, 故一般情况的公式由特殊情况给出. $\square$

2.3 行列式计算

2.3.1 化为三角形

例 2.3.1. $\Delta = \det A(x, a) = \begin{vmatrix} x & a & \cdots & a \\ a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & \cdots & x \end{vmatrix}.$

解1. 此时

$$\begin{aligned} \Delta &= (x + (n-1)a) \begin{vmatrix} 1 & a & \cdots & a \\ 1 & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a & \cdots & x \end{vmatrix} = (x + (n-1)a) \begin{vmatrix} 1 & a & \cdots & a \\ 0 & x-a & \cdots & 0 \\ \vdots & \cdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & & x-a \end{vmatrix} \\ &= (x + (n-1)a)(x-a)^{n-1}. \end{aligned} \quad \square$$

解2. 利用特征多项式的性质: 注意到方阵 $A(x, a)$ 为对称阵, 且 Δ 是 x 的 n 次首一多项式. 由于 $\text{rank}((x-a)I_n - A(x, a)) = 1$ 并且 $\det((x + (n-1)a)I_n - A(x, a)) = 0$, 立即有 $\Delta = (x + (n-1)a)(x-a)^{n-1}$. $\square$

解3. 应用关系式

$$\lambda^n \det(\lambda I_m + AB) = \lambda^m \det(\lambda I_n + BA).$$

有

$$(x-a)\Delta = (x-a) \det((x-a)I_n + \begin{pmatrix} a \\ \vdots \\ a \end{pmatrix} (1, \cdots, 1)) = (x-a)^n (x-a+na),$$

从而 $\Delta = (x + (n-1)a)(x-a)^{n-1}$. $\square$

例 2.3.2. 计算 n 阶行列式 Δ , 其中

$$\Delta = \begin{vmatrix} a & a+d & \cdots & a+(n-2)d & a+(n-1)d \\ a+d & a+2d & \cdots & a+(n-1)d & a \\ a+2d & a+3d & \cdots & a & a+d \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a+(n-1)d & a & \cdots & a+(n-3)d & a+(n-2)d \end{vmatrix}.$$

解. 将第 $2, 3, \dots, n$ 列都加到第 1 列, 得

$$\Delta = \begin{vmatrix} S & a+d & \cdots & a+(n-2)d & a+(n-1)d \\ S & a+2d & \cdots & a+(n-1)d & a \\ S & a+3d & \cdots & a & a+d \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ S & a & \cdots & a+(n-3)d & a+(n-2)d \end{vmatrix},$$

其中

$$S = na + \frac{n(n-1)}{2}d.$$

提取第 1 列的公因子 S , 有

$$\Delta = S \begin{vmatrix} 1 & a+d & \cdots & a+(n-2)d & a+(n-1)d \\ 1 & a+2d & \cdots & a+(n-1)d & a \\ 1 & a+3d & \cdots & a & a+d \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & a & \cdots & a+(n-3)d & a+(n-2)d \end{vmatrix}.$$

从第 2 行开始, 每一行减去上一行 (即 $r_{i+1} \mapsto r_{i+1} - r_i, i = 1, 2, \dots, n-1$), 得

$$\begin{aligned} \Delta &= S \begin{vmatrix} d & d & \cdots & d & (1-n)d \\ d & d & \cdots & (1-n)d & d \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ d & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ (1-n)d & d & \cdots & \cdots & d \end{vmatrix} \\ &= Sd^{n-1}(-1)^{\frac{(n-2)(n-1)}{2}} \det A(1-n, 1) \\ &= (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} (nd)^{n-1} \left(a + \frac{n-1}{2}d \right). \end{aligned} \quad \square$$

2.3.2 建立递推公式

例 2.3.3. 计算 n 阶 Vandermonde 行列式

$$\Delta_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

解. 对行列式进行行变换: 从第 n 行开始, 依次将后一行减去前一行乘以 x_1 , 即对 $i = n, n-1, \dots, 2$, 执行 $r_i \mapsto r_i - x_1 r_{i-1}$. 得到

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\ 0 & x_2(x_2 - x_1) & x_3(x_3 - x_1) & \cdots & x_n(x_n - x_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & x_3^{n-2}(x_3 - x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix}.$$

按第一列展开, 得

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\ x_2(x_2 - x_1) & x_3(x_3 - x_1) & \cdots & x_n(x_n - x_1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & x_3^{n-2}(x_3 - x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix}.$$

从每一列中提取公因子 $(x_i - x_1)$ ($i = 2, \dots, n$), 得

$$\Delta_n = \prod_{i=2}^n (x_i - x_1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \end{vmatrix}.$$

右边的行列式正是 $n-1$ 阶 Vandermonde 行列式 $\Delta_{n-1}(x_2, x_3, \dots, x_n)$. 因此得到递推关系

$$\Delta_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=2}^n (x_i - x_1) \cdot \Delta_{n-1}(x_2, x_3, \dots, x_n).$$

反复递推, 可得

$$\Delta_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

□

例 2.3.4. 计算下述柯西方阵 C_n 的行列式 Δ_n :

$$C_n = C_n(a_1, \dots, a_n; b_1, \dots, b_n) = \begin{pmatrix} \frac{1}{a_1 + b_1} & \frac{1}{a_1 + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_1 + b_n} \\ \frac{1}{a_2 + b_1} & \frac{1}{a_2 + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_2 + b_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{a_n + b_1} & \frac{1}{a_n + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_n + b_n} \end{pmatrix}.$$

解. 这个解法主要利用递推关系. 我们有

$$\begin{aligned}
 \Delta_n &= \begin{vmatrix} \frac{1}{a_1+b_1} & \cdots & \frac{1}{a_1+b_j} & \cdots & \frac{1}{a_1+b_n} \\ \frac{a_1-a_2}{(a_2+b_1)(a_1+b_1)} & \cdots & \frac{a_1-a_2}{(a_2+b_j)(a_1+b_j)} & \cdots & \frac{1}{(a_2+b_n)(a_1+b_n)} \\ \vdots & & & & \vdots \\ \frac{a_1-a_n}{(a_n+b_1)(a_1+b_1)} & \cdots & \frac{a_1-a_n}{(a_n+b_j)(a_1+b_j)} & \cdots & \frac{a_1-a_n}{(a_n+b_n)(a_1+b_n)} \end{vmatrix} \\
 &= \frac{\prod_{2 \leq i \leq n} (a_1 - a_i)}{\prod_{1 \leq j \leq n} (a_1 + b_j)} \begin{vmatrix} \frac{1}{a_2+b_1} & \frac{1}{a_2+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_2+b_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{a_n+b_1} & \frac{1}{a_n+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_n+b_n} \end{vmatrix} \\
 &= \frac{\prod_{2 \leq i \leq n} (a_1 - a_i)(b_1 - b_i)}{\prod_{1 \leq j \leq n} (a_1 + b_j)(a_j + b_1)} \Delta_{n-1},
 \end{aligned}$$

其中

$$\Delta_{n-1} = \begin{vmatrix} \frac{1}{a_2+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_2+b_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{a_n+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_n+b_n} \end{vmatrix}.$$

由递推关系, 故得

$$\Delta_n = \prod_{k=1}^{n-1} \frac{\prod_{k \leq i \leq n} (a_k - a_i)(b_k - b_i)}{\prod_{k \leq j \leq n} (a_k + b_j)(a_j + b_k)} \Delta_1 = \frac{\prod_{1 \leq k < i \leq n} (a_k - a_i)(b_k - b_i)}{\prod_{1 \leq k, j \leq n} (a_k + b_j)}. \quad \square$$

例 2.3.5. 求 n 阶三对角行列式 Δ_n , 其中未写出的元素都是零, $bc \neq 0$:

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} a & b & & & \\ c & a & b & & \\ & c & a & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & b \\ & & & c & a \end{vmatrix}_{n \times n}.$$

解. 将行列式 Δ_n 按第一行展开, 得到

$$\Delta_n = a \begin{vmatrix} a & b & & & \\ c & a & b & & \\ & c & a & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & b \\ & & & c & a \end{vmatrix}_{(n-1) \times (n-1)} - b \begin{vmatrix} c & b & & & \\ a & a & b & & \\ & c & a & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & b \\ & & & c & a \end{vmatrix}_{(n-1) \times (n-1)}.$$

第二个行列式按第一行展开, 得到

$$\begin{vmatrix} c & b & & \\ & a & b & \\ & c & a & \ddots \\ & & \ddots & \ddots & b \\ & & & c & a \end{vmatrix}_{(n-1) \times (n-1)} = c\Delta_{n-2}.$$

因此

$$\Delta_n = a\Delta_{n-1} - bc\Delta_{n-2}.$$

从而得到递推方程

$$\Delta_n - a\Delta_{n-1} + bc\Delta_{n-2} = 0, \quad (2.5.1)$$

初始条件为

$$\Delta_0 = 1, \quad \Delta_1 = a.$$

递推方程 (2.5.1) 的特征方程为

$$x^2 - ax + bc = 0,$$

其两根记为 α, β , 于是

$$\alpha + \beta = a, \quad \alpha\beta = bc.$$

由 (2.5.1) 得

$$\Delta_n - (\alpha + \beta)\Delta_{n-1} + \alpha\beta\Delta_{n-2} = 0.$$

因此

$$\Delta_n - \alpha\Delta_{n-1} = \beta(\Delta_{n-1} - \alpha\Delta_{n-2}) = \cdots = \beta^{n-1}(\Delta_1 - \alpha\Delta_0) = \beta^n,$$

$$\Delta_n - \beta\Delta_{n-1} = \alpha(\Delta_{n-1} - \beta\Delta_{n-2}) = \cdots = \alpha^{n-1}(\Delta_1 - \beta\Delta_0) = \alpha^n.$$

当 $\alpha \neq \beta$ 时, 由上述两式相减得

$$\Delta_{n-1} = \frac{\beta^n - \alpha^n}{\beta - \alpha},$$

从而

$$\Delta_n = \frac{\beta^{n+1} - \alpha^{n+1}}{\beta - \alpha}.$$

当 $\alpha = \beta$ 时, 由 $2\alpha = a, \alpha^2 = bc \neq 0$, 可知 $\alpha = \frac{a}{2} \neq 0$. 由

$$\frac{\Delta_n}{\alpha^n} - \frac{\Delta_{n-1}}{\alpha^{n-1}} = 1,$$

累加得

$$\frac{\Delta_n}{\alpha^n} = n + \Delta_0 = n + 1.$$

因此

$$\Delta_n = (n + 1)\alpha^n = (n + 1) \left(\frac{a}{2}\right)^n.$$

综上所述,

$$\Delta_n = \begin{cases} \frac{\beta^{n+1} - \alpha^{n+1}}{\beta - \alpha}, & \alpha \neq \beta, \\ (n+1) \left(\frac{a}{2}\right)^n, & \alpha = \beta, \end{cases}$$

其中 α, β 是方程 $x^2 - ax + bc = 0$ 的两个根. □

2.3.3 加边

例 2.3.6. 计算

$$\Delta = \begin{vmatrix} \lambda_1 + a_1 b_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & \lambda_2 + a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n b_1 & a_n b_2 & \cdots & \lambda_n + a_n b_n \end{vmatrix}.$$

解1. 这个行列式可以通过添加一条边来解决. 若 λ_i 全不为 0, 则

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} 1 & -b_1 & -b_2 & \cdots & -b_n \\ 0 & \lambda_1 + a_1 b_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_n b_1 & a_n b_2 & \cdots & \lambda_n + a_n b_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -b_1 & -b_2 & \cdots & -b_n \\ a_1 & \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & \vdots & 0 & \cdots & \lambda_n \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 + \sum \frac{a_i b_i}{\lambda_i} & -b_n & \cdots & -b_1 \\ 0 & \lambda_1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^n \lambda_i + \sum_{i=1}^n \left(a_i b_i \prod_{j \neq i} \lambda_j \right). \end{aligned}$$

若存在 $\lambda_i = 0$, 则利用连续性有 $\Delta = a_i b_i \prod_{j \neq i} \lambda_j$. □

解2. 这个方法应用恒等式 $\det(I_n - AB) = \det(I_m - BA)$, 其中 $A \in F^{n \times m}$, $B \in F^{m \times n}$.

令 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. 若 λ_i 全不为 0, 则

$$\begin{aligned} \det \left(\Lambda + \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} (b_1, \dots, b_n) \right) &= \det(\Lambda) \det \left(I + \Lambda^{-1} \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} (b_1, \dots, b_n) \right) \\ &= \det(\Lambda) \det \left(1 + (b_1, \dots, b_n) \Lambda^{-1} \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \right) \\ &= \lambda_1 \cdots \lambda_n \left(1 + \sum \frac{a_i b_i}{\lambda_i} \right) = \prod_{i=1}^n \lambda_i + \sum_{i=1}^n \left(a_i b_i \prod_{j \neq i} \lambda_j \right). \end{aligned}$$

若存在 $\lambda_i = 0$, 则运用连续性. □

例 2.3.7. 求 n 阶行列式

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} c_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & c_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 & c_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & c_n \end{vmatrix}.$$

解1. 添加一行一列到行列式 Δ_n :

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & -x_1 & -x_2 & -x_3 & \cdots & -x_n \\ 0 & c_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ 0 & x_1 & c_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ 0 & x_1 & x_2 & c_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & c_n \end{vmatrix}.$$

再将第 1 行加到其它各行, 得到

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & -x_1 & -x_2 & -x_3 & \cdots & -x_n \\ 1 & c_1 - x_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & c_2 - x_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & c_3 - x_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & c_n - x_n \end{vmatrix}. \quad (2.5.3)$$

$$\Delta_n = \begin{cases} \prod_{i=1}^n (c_i - x_i) + \sum_{j=1}^n x_j \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n (c_i - x_i), & \text{若 } c_i \neq x_i \ (1 \leq i \leq n), \\ (c_1 - x_1) \cdots (c_{i-1} - x_{i-1}) x_i (c_{i+1} - x_{i+1}) \cdots (c_n - x_n), & \text{若 } \exists i \text{ 使 } c_i = x_i. \end{cases} \quad \square$$

解2. 取 $a_i = 1, b_i = x_i, \lambda_i = c_i - x_i$, 直接应用例 2.3.6 结论即可. $\square$

2.3.4 拆行

例 2.3.8.

$$\Delta_n(x, y, a_1, a_2, \dots, a_n) = \begin{vmatrix} a_1 & x & x & \cdots & x \\ y & a_2 & x & \cdots & x \\ y & y & a_3 & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y & y & y & \cdots & a_n \end{vmatrix}.$$

解1. 将最后一列元素拆分: $a_n = x + (a_n - x)$, 则行列式可拆为两个行列式之和:

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} a_1 & x & \cdots & x & x \\ y & a_2 & \cdots & x & x \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ y & y & \cdots & a_{n-1} & x \\ y & y & \cdots & y & x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1 & x & \cdots & x & 0 \\ y & a_2 & \cdots & x & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ y & y & \cdots & a_{n-1} & 0 \\ y & y & \cdots & y & a_n - x \end{vmatrix}.$$

对第一个行列式, 将最后一行乘以 -1 加到上面各行, 得到

$$\begin{vmatrix} a_1 - y & x - y & \cdots & x - y & 0 \\ 0 & a_2 - y & \cdots & x - y & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} - y & 0 \\ y & y & \cdots & y & x \end{vmatrix} = x \prod_{i=1}^{n-1} (a_i - y).$$

第二个行列式按最后一行展开, 得

$$(a_n - x)\Delta_{n-1}(x, y, a_1, \dots, a_{n-1}).$$

因此得到递推关系

$$\Delta_n = x \prod_{i=1}^{n-1} (a_i - y) + (a_n - x)\Delta_{n-1}. \quad (1)$$

同理, 考虑转置行列式 (或对最后一行拆分时将 a_n 拆为 $y + (a_n - y)$), 可得另一递推

$$\Delta_n = y \prod_{i=1}^{n-1} (a_i - x) + (a_n - y)\Delta_{n-1}. \quad (2)$$

由 (1)(2) 相减得

$$(y - x)\Delta_{n-1} = y \prod_{i=1}^{n-1} (a_i - x) - x \prod_{i=1}^{n-1} (a_i - y),$$

即

$$\Delta_{n-1}(x, y, a_1, \dots, a_{n-1}) = \frac{y \prod_{i=1}^{n-1} (a_i - x) - x \prod_{i=1}^{n-1} (a_i - y)}{y - x}.$$

将此式代入 (1) 即得

$$\Delta_n(x, y, a_1, \dots, a_n) = \frac{y \prod_{i=1}^n (a_i - x) - x \prod_{i=1}^n (a_i - y)}{y - x}.$$

□

解2. 定义

$$f(t) = \begin{vmatrix} 1 & t & t & t & \cdots & t \\ 1 & a_1 & x & x & \cdots & x \\ 1 & y & a_2 & x & \cdots & x \\ 1 & y & y & a_3 & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & y & y & y & \cdots & a_n \end{vmatrix} = \alpha t + \beta.$$

则有

$$\Delta_n(x, y, a_1, \dots, a_n) = f(0) = \beta.$$

另外, 我们有

$$f(t) = \begin{vmatrix} 1 & t & t & t & \cdots & t \\ 0 & a_1 - t & x - t & x - t & \cdots & x - t \\ 0 & y - t & a_2 - t & x - t & \cdots & x - t \\ 0 & y - t & y - t & a_3 - t & \cdots & x - t \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & y - t & y - t & y - t & \cdots & a_n - t \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 - t & x - t & x - t & \cdots & x - t \\ y - t & a_2 - t & x - t & \cdots & x - t \\ y - t & y - t & a_3 - t & \cdots & x - t \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y - t & y - t & y - t & \cdots & a_n - t \end{vmatrix}.$$

因此

$$f(x) = \alpha x + \beta = \prod_{i=1}^n (a_i - x), \quad f(y) = \alpha y + \beta = \prod_{i=1}^n (a_i - y).$$

立即可得

$$\Delta_n(x, y, a_1, \dots, a_n) = \frac{y \prod_{i=1}^n (a_i - x) - x \prod_{i=1}^n (a_i - y)}{y - x}.$$

□

2.3.5 视行列式为某些元素的多项式

例 2.3.9. 求 n 阶行列式

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} x & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_1 & x & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_1 & a_2 & x & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & x \end{vmatrix}.$$

解1. 把 Δ_n 中元素 x 看成未定元, 元素 $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ 看成常数, 则 Δ_n 是关于 x 的多项式 $f(x)$. 由行列式的展开式可知, $f(x)$ 的次数为 n , 首项系数为 1.

把其它各列加到第一列, 得到

$$f(x) = \begin{vmatrix} x + \sum_{i=1}^{n-1} a_i & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ x + \sum_{i=1}^{n-1} a_i & x & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ x + \sum_{i=1}^{n-1} a_i & a_2 & x & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x + \sum_{i=1}^{n-1} a_i & a_2 & a_3 & \cdots & x \end{vmatrix}.$$

由此看出, 当 $x = -\sum_{i=1}^{n-1} a_i$ 时, 第一列元素全为零, 故

$$f\left(-\sum_{i=1}^{n-1} a_i\right) = 0.$$

所以 $x = -\sum_{i=1}^{n-1} a_i$ 是 $f(x)$ 的一个根.

把 $x = a_i$ ($i = 1, 2, \dots, n-1$) 代入 $f(x)$, 得到

$$f(a_i) = \begin{vmatrix} a_i & a_1 & a_2 & \cdots & a_{i-2} & a_{i-1} & a_i & a_{i+1} & \cdots & a_{n-1} \\ a_1 & a_i & a_2 & \cdots & a_{i-2} & a_{i-1} & a_i & a_{i+1} & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{i-1} & a_i & a_i & a_{i+1} & \cdots & a_{n-1} \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{i-1} & a_i & a_i & a_{i+1} & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{i-1} & a_i & a_{i+1} & a_{i+2} & \cdots & a_i \end{vmatrix}.$$

其中第 i 行和第 $i+1$ 行相同 (当 $i = n-1$ 时, 第 $n-1$ 行和第 n 行相同), 所以 $f(a_i) = 0$. 因此 a_i 是 $f(x)$ 的根.

于是

$$f(x) = c \left(x + \sum_{i=1}^{n-1} a_i \right) (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_{n-1}).$$

因为 $f(x)$ 的首项系数为 1, 所以 $c = 1$. 因此

$$\Delta_n = \left(x + \sum_{i=1}^{n-1} a_i \right) \prod_{i=1}^{n-1} (x - a_i).$$

□

解2.

$$\begin{aligned} \Delta_n &= \left(x + \sum_{i=1}^{n-1} a_i \right) \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ 1 & x & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ 1 & a_2 & x & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_2 & a_3 & \cdots & x \end{vmatrix} \\ &= \left(x + \sum_{i=1}^{n-1} a_i \right) \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-2} & a_{n-1} \\ 0 & x - a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a_2 - x & x - a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & a_3 & \cdots & x - a_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & \cdots & a_{n-1} - x & x - a_{n-1} \end{vmatrix} \\ &= \left(x + \sum_{i=1}^{n-1} a_i \right) \prod_{i=1}^{n-1} (x - a_i). \end{aligned}$$

□

例 2.3.10. 求 n 阶行列式 Δ_n :

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{k-1} & x_2^{k-1} & \cdots & x_n^{k-1} \\ x_1^{k+1} & x_2^{k+1} & \cdots & x_n^{k+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^n & x_2^n & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}.$$

解. 在 Δ_n 中添加一行一列构成如下的 $n+1$ 阶 Vandermonde 行列式 Δ :

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n & x \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 & x^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x_1^{k-1} & x_2^{k-1} & \cdots & x_n^{k-1} & x^{k-1} \\ x_1^k & x_2^k & \cdots & x_n^k & x^k \\ x_1^{k+1} & x_2^{k+1} & \cdots & x_n^{k+1} & x^{k+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x_1^n & x_2^n & \cdots & x_n^n & x^n \end{vmatrix}.$$

由 Vandermonde 行列式公式,

$$\Delta = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) \prod_{i=1}^n (x - x_i). \quad (1)$$

把 x 看成未定元, 则 Δ 是关于 x 的多项式. 将 Δ 按最后一列展开, 则 Δ_n 正好是展开式中 x^k 项的系数 (相差一个符号). 事实上, 最后一列的元素为 $1, x, x^2, \dots, x^n$, 其中 x^k 对应的余子式正是去掉第 $k+1$ 行和最后一列后得到的行列式, 即 Δ_n , 其余子式符号为 $(-1)^{(k+1)+(n+1)} = (-1)^{n+k}$. 因此

$$\Delta = \sum_{j=0}^n (-1)^{n+j} \cdot (\text{去掉第 } j+1 \text{ 行和最后一列的行列式}) x^j.$$

其中 x^k 项的系数为 $(-1)^{n+k} \Delta_n$, 故

$$\Delta_n = (-1)^{n+k} \cdot [x^k] \Delta.$$

由 (1), $\Delta = \prod_{i < j} (x_j - x_i) \cdot \prod_{i=1}^n (x - x_i)$. 展开 $\prod_{i=1}^n (x - x_i)$, 得

$$\prod_{i=1}^n (x - x_i) = x^n - e_1 x^{n-1} + e_2 x^{n-2} - \cdots + (-1)^n e_n,$$

其中 $e_r = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq n} x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_r}$. 所以 x^k 的系数为 $(-1)^{n-k} e_{n-k}$. 于是

$$[x^k] \Delta = \prod_{i < j} (x_j - x_i) \cdot (-1)^{n-k} e_{n-k}.$$

因此

$$\Delta_n = (-1)^{n+k} \cdot (-1)^{n-k} \prod_{i < j} (x_j - x_i) e_{n-k} = \prod_{i < j} (x_j - x_i) e_{n-k}.$$

即

$$\Delta_n = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_{n-k} \leq n} x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_{n-k}}.$$

□

2.3.6 Laplace展开

例 2.3.11. 设 $bc b_1 c_1 \neq 0$, 共 $m+n$ 行, 未写出的元素均为零. 计算

$$\Delta = \begin{vmatrix} a & b & & & & & & & & & \\ c & a & b & & & & & & & & \\ & c & a & \ddots & & & & & & & \\ & & \ddots & \ddots & b & & & & & & \\ & & & c & a & b & & & & & \\ & & & & c_1 & a_1 & b_1 & & & & \\ & & & & & c_1 & a_1 & b_1 & & & \\ & & & & & & c_1 & a_1 & \ddots & & \\ & & & & & & & \ddots & \ddots & b_1 & \\ & & & & & & & & c_1 & a_1 & \end{vmatrix}$$

其中左上块为 m 阶三对角矩阵, 右下块为 n 阶三对角矩阵,, 且在交接处右上角有一个 b (位于第 m 行第 $m+1$ 列), 左下角有一个 c_1 (位于第 $m+1$ 行第 m 列).

解. 按前 m 行作 Laplace 展开, 得到

$$\begin{aligned} \Delta &= (-1)^{1+2+\dots+m+1+2+\dots+m} \cdot \begin{vmatrix} a & b & & & \\ c & a & b & & \\ & c & a & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & b \\ & & & c & a \end{vmatrix}_m \cdot \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & & & \\ c_1 & a_1 & b_1 & & \\ & c_1 & a_1 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & b_1 \\ & & & c_1 & a_1 \end{vmatrix}_n \\ &+ (-1)^{1+\dots+m+1+\dots+(m-1)+(m+1)} \cdot \begin{vmatrix} a & b & & & \\ c & a & b & & \\ & c & a & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & b \\ & & & c & a \\ & & & & c & b \end{vmatrix}_m \cdot \begin{vmatrix} c_1 & b_1 & & & \\ a_1 & b_1 & & & \\ c_1 & a_1 & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & b_1 & \\ & & c_1 & a_1 & \end{vmatrix}_n. \end{aligned}$$

记 m 阶三对角行列式为

$$\Delta_m(a, b, c) = \begin{vmatrix} a & b & & & \\ c & a & b & & \\ & c & a & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & b \\ & & & c & a \end{vmatrix}_m.$$

则上式可化简为

$$\Delta = \Delta_m(a, b, c)\Delta_n(a_1, b_1, c_1) - bc_1\Delta_{m-1}(a, b, c)\Delta_{n-1}(a_1, b_1, c_1).$$

□

注. 若 $a_1 = a, b_1 = b, c_1 = c$, 则有

$$\Delta_{m+n} = \Delta_m\Delta_n - bc\Delta_{m-1}\Delta_{n-1}.$$

2.3.7 公式法

- $\det(AB) = \det A \cdot \det B$, 或者 Binet-Cauchy 公式.
- $\lambda^n \det(\lambda I_m + AB) = \lambda^m \det(\lambda I_n + BA)$.

例 2.3.12. 求行列式

$$\Delta = \det(a_i + b_j), \quad \Delta = \det(\delta_{ij} + a_i + b_j).$$

2.3.8 反对称矩阵

定义 2.3.1. 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶方阵, 若满足

$$a_{ji} = -a_{ij} \quad (1 \leq i, j \leq n),$$

则称 A 为反对称矩阵 (斜对称矩阵). 显然, 其主对角元 $a_{ii} = 0$.

例 2.3.13. 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶反对称矩阵.

- (1). 若 $n = 2m + 1$ 为奇数, 则 $\det A = 0$.
- (2). 若 $n = 2m$ 为偶数, 将 $\det A$ 视为 $\{a_{ij} \mid 1 \leq i < j \leq n\}$ 的多项式, 则存在多项式 $\text{Pf}(A) \in \mathbb{F}[a_{ij} \mid 1 \leq i < j \leq n]$, 使得 $\det A = (\text{Pf}(A))^2$.
- (3). 若 $n = 2m$ 为偶数, 则对任意 $\lambda \in \mathbb{F}$ 有 $\det(a_{ij} + \lambda) = \det A$.

证明. (1). 由反对称性以及行列式的性质, 立即有:

$$\det(A) = \det(A^T) = \det(-A) = (-1)^{2m+1} \det(A) = -\det A.$$

从而 $\det A = 0$.

(2). 我们对 m 进行归纳. $m = 1$, 即 $n = 2$. 则

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} \\ -a_{12} & 0 \end{pmatrix},$$

立即有 $\det A = a_{12}^2$. 令 $\text{Pf}(A) = a_{12}$, 命题成立.

假设对 $2(m-1)$ 阶反对称矩阵命题成立, 现考虑 $2m$ 阶反对称矩阵 A . 对 A 分别实施如下变换: 当 $j = 3, 4, \dots, 2m$

$$\text{第 } j \text{ 列} - \frac{a_{1j}}{a_{12}} \cdot \text{第 } 2 \text{ 列}, \quad \text{第 } j \text{ 行} - \frac{a_{2j}}{a_{21}} \cdot \text{第 } 1 \text{ 行},$$

则 a_{ij} 变为

$$a'_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{1j}a_{i2}}{a_{12}} - \frac{a_{2j}a_{i1}}{a_{21}}.$$

由于 A 是反对称的, 立即有

$$a'_{ji} = a_{ji} - \frac{a_{1i}a_{j2}}{a_{12}} - \frac{a_{2i}a_{j1}}{a_{21}} = -a_{ij} + \frac{a_{i1}a_{2j}}{a_{21}} + \frac{a_{i2}a_{1j}}{a_{12}} = -a'_{ij}$$

对所有 $3 \leq i, j \leq 2m$ 成立. 也就是

$$B = (a'_{ij})_{(2m-2) \times (2m-2)} = \frac{1}{a_{12}} (a_{12}a_{ij} - a_{1j}a_{i2} + a_{2j}a_{i1})$$

是 $(2m-2)$ 阶反对称方阵. 由归纳假设存在多项式 $f \in \mathbb{F}[a_{ij} | 1 \leq i < j \leq n]$ 使得

$$A = a_{12}^2 \det B = a_{12}^{4-2m} f^2 = (a_{12}^{2-m} f)^2.$$

由于 $\mathbb{F}[a_{ij} | 1 \leq i < j \leq n]$ 是唯一分解整环, 则有 $\text{Pf}(A) = a_{12}^{2-m} f \in \mathbb{F}[a_{ij} | 1 \leq i < j \leq n]$.

注. 若 $A \in \mathbb{R}^{2m \times 2m}$, $A^T = -A$, 则有 $\det A \geq 0$.

(3). 通过加边有

$$\begin{aligned} \Delta(\lambda) &= \begin{vmatrix} 0+\lambda & a_{12}+\lambda & \cdots & a_{1n}+\lambda \\ -a_{12}+\lambda & 0+\lambda & \cdots & a_{2n}+\lambda \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{1n}+\lambda & -a_{2n}+\lambda & \cdots & 0+\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & \lambda & \cdots & \lambda \\ 0 & 0+\lambda & \cdots & a_{1n}+\lambda \\ 0 & -a_{12}+\lambda & \cdots & a_{2n}+\lambda \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & -a_{1n}+\lambda & \cdots & 0+\lambda \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & \lambda & \cdots & \lambda \\ -1 & 0 & \cdots & a_{12} \\ -1 & -a_{12} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & -a_{1n} & \cdots & 0 \end{vmatrix} = \Delta_1 + \Delta_2 \end{aligned}$$

其中

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 0 & \lambda & \cdots & \lambda \\ -1 & 0 & \cdots & a_{12} \\ -1 & -a_{12} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & -a_{1n} & \cdots & 0 \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ -1 & 0 & \cdots & a_{12} \\ -1 & -a_{12} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & -a_{1n} & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

是 $n+1$ (奇数) 阶反对称方阵的行列式的 λ 倍, 等于 0.

而

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ -1 & -a_{12} & 0 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & -a_{1n} & -a_{2n} & \cdots & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ -a_{12} & 0 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{1n} & -a_{2n} & \cdots & 0 \end{vmatrix} = |A|.$$

因此

$$\Delta(\lambda) = \Delta_1 + \Delta_2 = 0 + |A| = |A|.$$

(3). **证明2.** 将 A 视为 $\{a_{ij} \mid 1 \leq i < j \leq n\}$ 的反对称方阵, 故可设为可逆的, 并且反对称方阵的逆也是反对称的. 记

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} (1, 1, \dots, 1).$$

则有

$$\begin{aligned} \Delta(\lambda) &= \det(A + \lambda J) = \det(A) \det \left(I_n + \lambda A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} (1, \dots, 1) \right) \\ &= \det(A) \left(1 + \lambda (1, \dots, 1) A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \det A. \end{aligned} \quad \square$$

事实上, 多项式 $\text{Pf}(A)$ 有如下形式:

定义 2.3.2. 设 $A = (a_{ij})$ 为 $2m$ 阶反对称矩阵. 定义

$$\text{Pf}(A) = \sum_{\sigma} \text{sgn}(\sigma) a_{\sigma(1)\sigma(2)} a_{\sigma(3)\sigma(4)} \cdots a_{\sigma(2m-1)\sigma(2m)},$$

其中求和遍历所有置换 $\sigma \in S_{2m}$ 将集合 $\{1, 2, \dots, 2m\}$ 分成 m 个无序对 $\{\sigma(1), \sigma(2)\}, \dots, \{\sigma(2m-1), \sigma(2m)\}$, 满足 $\sigma(1) < \sigma(3) < \cdots < \sigma(2m-1)$, 以及 $\sigma(2i-1) < \sigma(2i)$, $1 \leq i \leq m$, 其中 $\text{sgn}(\sigma)$ 是置换 σ 的符号. 更简洁地, 我们有

$$\text{Pf}(A) = \frac{1}{2^m m!} \sum_{\pi \in S_{2m}} \text{sgn}(\pi) \prod_{i=1}^m a_{\pi(2i-1)\pi(2i)}.$$

例 2.3.14. 证明:

$$\begin{vmatrix} a_{11} + x_1 & \cdots & a_{1n} + x_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} + x_1 & \cdots & a_{nn} + x_n \end{vmatrix} = \det A + \sum_{j=1}^n x_j \sum_{k=1}^n A_{kj},$$

其中 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, A_{jk} 是 a_{jk} 在 $\det A$ 中的代数余子式.

证明. 将行列式中每个元素 $x_j + a_{ij}$ 拆分为 x_j 与 a_{ij} 之和. 由行列式的多重线性性, 行列式可展开为 2^n 个行列式之和, 每个行列式的第 j 列要么全为 x_j , 要么取 A 的第 j 列.

- 若有两列及以上取全 x_j , 则这两列成比例, 行列式为0.
- 若恰有一列 (设为第 j 列) 取 x_j , 其余列取 A 的对应列, 则此行列式等于 x_j 乘以 A 中第 j 列全为1、其余列不变的行列式. 按第 j 列展开, 等于 $x_j \sum_{k=1}^n A_{kj}$.
- 若所有列均取 A 的对应列, 则得 $\det A$.

$$\text{因此原行列式} = \det A + \sum_{j=1}^n x_j \sum_{k=1}^n A_{kj}.$$

□

例 2.3.15. 设 n 阶方阵 $A = (a_{ij})$ 的元素都是复数, 并且对任意 $i = 1, \dots, n$,

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|,$$

则方阵 A 称为主对角占优矩阵. 证明主对角占优矩阵的行列式不为零.

证1. 打洞+归纳法.

□

证2. 假设 $\det A = 0$, 则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解. 取非零解 $x = (x_1, \dots, x_n)^T$, 并选取指标 k 使得

$$|x_k| = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| > 0.$$

考虑第 k 个方程:

$$a_{kk}x_k = - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^n a_{kj}x_j.$$

两边取模, 得

$$|a_{kk}||x_k| \leq \sum_{j \neq k} |a_{kj}||x_j| \leq \sum_{j \neq k} |a_{kj}| \cdot |x_k|.$$

由于 $|x_k| > 0$, 两边同时除以 $|x_k|$, 得到

$$|a_{kk}| \leq \sum_{j \neq k} |a_{kj}|,$$

这与题设的主对角占优条件

$$|a_{kk}| > \sum_{j \neq k} |a_{kj}|$$

矛盾. 因此假设不成立, $\det A \neq 0$.

□

Chapter 3

矩阵

3.1 矩阵: 线性代数(B1)回顾

参考课程PPT.

3.2 Binet-Cauchy公式

定理 3.2.1 (Binet-Cauchy). 设 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{F}^{n \times m}$, 则

$$\det(AB) = \begin{cases} 0, & n < m, \\ \det A \det B, & m = n, \\ \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_m \leq n} A \begin{pmatrix} 1, & 2, & \dots, & m \\ j_1, & j_2, & \dots, & j_m \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} j_1, & j_2, & \dots, & j_m \\ 1, & 2, & \dots, & m \end{pmatrix}, & n > m. \end{cases}$$

证明. 记 $A = (a_{ij})$, B 的行向量依次为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$, 则

$$\begin{aligned} \det(AB) &= \det \left(\sum_{j=1}^n a_{1j} \beta_j, \sum_{j=1}^n a_{2j} \beta_j, \dots, \sum_{j=1}^n a_{mj} \beta_j \right) \\ &= \sum_{1 \leq j_1, \dots, j_m \leq n} a_{1j_1} \dots a_{mj_m} \det(\beta_{j_1}, \dots, \beta_{j_m}) \\ &= \sum_{j_1, \dots, j_m \text{ 两两不等}} a_{1j_1} \dots a_{mj_m} \det(\beta_{j_1}, \dots, \beta_{j_m}) \\ &= \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_m \leq n} \sum_{\substack{(i_1, \dots, i_m) \\ (j_1, \dots, j_m)}} a_{1j_1} \dots a_{mj_m} (-1)^{\tau(j_1, \dots, j_m)} \det(\beta_{i_1}, \dots, \beta_{i_m}) \\ &= \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_m \leq n} A \begin{pmatrix} 1, \dots, m \\ i_1, \dots, i_m \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_m \\ 1, \dots, m \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

其中, $\binom{i_1, \dots, i_m}{j_1, \dots, j_m}$ 表示 $(j_1, \dots, j_m)$ 是 $\{i_1, \dots, i_m\}$ 的排列. □

利用 Binet-Cauchy 公式, 可以证明以下定理.

定理 3.2.2. 设 $A \in \mathbb{F}^{p \times q}$, $B \in \mathbb{F}^{q \times s}$, $C = AB$. 则矩阵 C 的 r 阶子式满足

$$C \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_r \\ j_1, j_2, \dots, j_r \end{pmatrix} = \begin{cases} 0, & r > q, \\ \sum_{1 \leq k_1 < \dots < k_r \leq q} A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_r \\ k_1, k_2, \dots, k_r \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} k_1, k_2, \dots, k_r \\ j_1, j_2, \dots, j_r \end{pmatrix}, & r \leq q. \end{cases}$$

证明. 设 $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$, $C = AB = (c_{ij})$, 其中

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^q a_{ik} b_{kj}.$$

则

$$C \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_r \\ j_1, j_2, \dots, j_r \end{pmatrix} = \det(A_1 B_1) = \begin{vmatrix} \sum_{k_1=1}^q a_{i_1 k_1} b_{k_1 j_1} & \sum_{k_2=1}^q a_{i_1 k_2} b_{k_2 j_2} & \cdots & \sum_{k_r=1}^q a_{i_1 k_r} b_{k_r j_r} \\ \sum_{k_1=1}^q a_{i_2 k_1} b_{k_1 j_1} & \sum_{k_2=1}^q a_{i_2 k_2} b_{k_2 j_2} & \cdots & \sum_{k_r=1}^q a_{i_2 k_r} b_{k_r j_r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{k_1=1}^q a_{i_r k_1} b_{k_1 j_1} & \sum_{k_2=1}^q a_{i_r k_2} b_{k_2 j_2} & \cdots & \sum_{k_r=1}^q a_{i_r k_r} b_{k_r j_r} \end{vmatrix}.$$

对矩阵 A 的子矩阵

$$A_1 = \begin{pmatrix} a_{i_1 1} & a_{i_1 2} & \cdots & a_{i_1 q} \\ a_{i_2 1} & a_{i_2 2} & \cdots & a_{i_2 q} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i_r 1} & a_{i_r 2} & \cdots & a_{i_r q} \end{pmatrix}$$

和矩阵 B 的子矩阵

$$B_1 = \begin{pmatrix} b_{1 j_1} & b_{1 j_2} & \cdots & b_{1 j_r} \\ b_{2 j_1} & b_{2 j_2} & \cdots & b_{2 j_r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{q j_1} & b_{q j_2} & \cdots & b_{q j_r} \end{pmatrix}$$

应用 Binet-Cauchy 公式即得定理. □

现在举例说明上述定理的应用.

例 3.2.1. n 阶方阵

$$A = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_0 \end{pmatrix}$$

称为循环矩阵, 求 A 的行列式.

解. 设 ω 是 n 次本原单位根, 即 $\omega^i \neq 1$, $1 \leq i \leq n-1$, 但 $\omega^n = 1$. 令

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1} x^{n-1}.$$

取 n 阶矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 & \cdots & \omega^{n-1} \\ 1 & \omega^2 & \omega^4 & \cdots & \omega^{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega^{n-1} & \omega^{2(n-1)} & \cdots & \omega^{(n-1)^2} \end{pmatrix}.$$

容易验证

$$AB = B \operatorname{diag}(f(1), f(\omega), f(\omega^2), \dots, f(\omega^{n-1})).$$

两端取行列式, 由定理 3.2.1,

$$\det A \det B = \left(\prod_{i=0}^{n-1} f(\omega^i) \right) \det B.$$

显然 Vandermonde 行列式

$$\det B = \prod_{0 \leq i < j \leq n-1} (\omega^j - \omega^i) \neq 0.$$

因此

$$\det A = \prod_{i=0}^{n-1} f(\omega^i).$$

□

例 3.2.2. 利用行列式证明 Cauchy 不等式: 对实数 a_i, b_i ,

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right),$$

其中等号成立当且仅当 $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \cdots = \frac{a_n}{b_n}$.

证明. 取 $2 \times n$ 实矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix}.$$

则

$$AA^T = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n a_i^2 & \sum_{i=1}^n a_i b_i \\ \sum_{i=1}^n a_i b_i & \sum_{i=1}^n b_i^2 \end{pmatrix}.$$

因此

$$\det(AA^T) = \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right) - \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2.$$

另一方面, 由 Binet-Cauchy 公式,

$$\det(AA^T) = \sum_{1 \leq i < j \leq n} A \begin{pmatrix} 1, 2 \\ i, j \end{pmatrix} A^T \begin{pmatrix} i, j \\ 1, 2 \end{pmatrix} = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \left(A \begin{pmatrix} 1, 2 \\ i, j \end{pmatrix} \right)^2 \geq 0.$$

所以

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right) - \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \geq 0.$$

即得 Cauchy 不等式. 等号成立当且仅当对所有 $i < j$,

$$A \begin{pmatrix} 1, 2 \\ i, j \end{pmatrix} = a_i b_j - a_j b_i = 0,$$

即 $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \cdots = \frac{a_n}{b_n}$. □

3.3 分块矩阵

例 3.3.1 (Schur 公式). (1). 设 $A \in \mathbb{F}^{m \times m}$, $B \in \mathbb{F}^{m \times n}$, $C \in \mathbb{F}^{p \times m}$, $D \in \mathbb{F}^{p \times n}$, 若 A 可逆, 则有

$$\begin{pmatrix} I_m & \mathbf{0} \\ -CA^{-1} & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ \mathbf{0} & D - CA^{-1}B \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & -A^{-1}B \\ \mathbf{0} & I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ C & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} I_m & \mathbf{0} \\ -CA^{-1} & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & -A^{-1}B \\ \mathbf{0} & I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}.$$

(2). 设 $A \in \mathbb{F}^{m \times m}$, $B \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 均可逆, 则有

$$\begin{pmatrix} I_m & S \\ \mathbf{0} & I_n \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} I_m & -S \\ \mathbf{0} & I_n \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} I_m & \mathbf{0} \\ T & I_n \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} I_m & \mathbf{0} \\ -T & I_n \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} A & S \\ \mathbf{0} & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}SB^{-1} \\ \mathbf{0} & B^{-1} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ T & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & \mathbf{0} \\ -B^{-1}TA^{-1} & B^{-1} \end{pmatrix}.$$

例 3.3.2. 设 $A, B, C, D \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 并且 $AC = CA$. 证明

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(AD - CB).$$

证明. 首先, 若 A 可逆, 则对 Schur 公式两边取行列式, 即得

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(A) \cdot \det(D - CA^{-1}B) = \det(AD - ACA^{-1}B) = \det(AD - CB).$$

对于一般情况, 令 $A_x = xI + A$. 则 $f(x) = \det A_x$ 作为 x 的 n 次多项式最多有 n 个根. 若 $f(x) \neq 0$, 则 A_x 可逆. 由 $A_x C = C A_x$ 故 $\det \begin{pmatrix} A_x & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(A_x D - CB)$. 由于等式两边作为 x 的多项式最多有 n 个点取值不一样, 那么它们必然是同一个多项式. 令 $x = 0$ 即得欲证. □

例 3.3.3. 设 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{F}^{n \times m}$. 则

(1). 证明: $\det(I_m - AB) = \det(I_n - BA)$.

(2). 证明: 如果 $I_m - AB$ 可逆, 那么 $I_n - BA$ 可逆. 并求此时 $I_n - BA$ 的逆.

证明. 对等式

$$\begin{pmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_m & \mathbf{0} \\ B & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & A \\ \mathbf{0} & I_n - BA \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_m & A \\ \mathbf{0} & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m - AB & \mathbf{0} \\ B & I_n \end{pmatrix}$$

取行列式即得 $\det(I_m - AB) = \det(I_n - BA)$. 这说明 $I_m - AB$ 可逆, 当且仅当 $I_n - BA$ 可逆.

现在设 $I_m - AB$ 可逆. 由上述等式得

$$\begin{pmatrix} I_m & A \\ \mathbf{0} & I_n - BA \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_m & \mathbf{0} \\ -B & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & A \\ \mathbf{0} & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m - AB & \mathbf{0} \\ B & I_n \end{pmatrix}.$$

两边求逆, 即得

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} I_m & -A(I_n - BA)^{-1} \\ \mathbf{0} & (I_n - BA)^{-1} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} I_m - AB & \mathbf{0} \\ B & I_n \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} I_m & -A \\ \mathbf{0} & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & \mathbf{0} \\ B & I_n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (I_m - AB)^{-1} & \mathbf{0} \\ -B(I_m - AB)^{-1} & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m - AB & -A \\ B & I_n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} I_m & -(I_m - AB)^{-1}A \\ \mathbf{0} & I + B(I_n - AB)^{-1}A \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

因此

$$(I_n - BA)^{-1} = I_n + B(I_m - AB)^{-1}A. \quad \square$$

注. 注意如下性质: 若

$$\frac{1}{1 - xy} = 1 + xy + xyxy + xyxyxy + \cdots$$

则有

$$\begin{aligned} \frac{1}{1 - yx} &= 1 + yx + yxyx + yxyxyx + yxyxyxyx + \cdots = 1 + y(1 + xy + xyxy + \cdots)x \\ &= 1 + y \cdot \frac{1}{1 - xy} \cdot x. \end{aligned}$$

解2. 猜测, $(I_n - BA)^{-1} = I_n + B(I_m - AB)^{-1}A$. 计算有

$$\begin{aligned} (I_n - BA)(I_n + B(I_m - AB)^{-1}A) &= I_n - BA + (B - BAB)(I_m - AB)^{-1}A \\ &= I_n - BA + B(I_m - AB)(I_m - AB)^{-1}A = I_n. \end{aligned}$$

猜测成立. □

解3. 设 $X(I_m - AB) = I_m$, $(I_n - BA)Y = I_n$. 首先有 $Y - BAY = I_n$, 等式两边左乘 A 立即得到 $AY - ABAY = A$, 也就是 $(I_m - AB)AY = A$. 等式两边再左乘 X , 立即得到 $XA = X(I_m - AB)AY = AY$. 代入上式, 则有

$$Y = I_n + BAY = I_n + BXA = I_n + B(I_m - AB)^{-1}A. \quad \square$$

例 3.3.4. 设 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{F}^{n \times m}$, $\lambda \in \mathbb{F}$. 证明

$$\lambda^n \det(\lambda I_m - AB) = \lambda^m \det(\lambda I_n - BA).$$

证明. 设 $\text{rank } A = r$. 则存在可逆矩阵 $P \in \mathbb{F}^{m \times m}$, $Q \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 使得

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} Q = PCQ, \quad QB P \triangleq \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix},$$

其中 $B_{11} \in \mathbb{F}^{r \times r}$, 记矩阵 $\begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}$ 为 C . 于是

$$\begin{aligned} \lambda^n \det(\lambda I_m - AB) &= \lambda^n \det(\lambda I_m - PCQB) = \lambda^n \det(P(\lambda I_m - CQB P)P^{-1}) \\ &= \lambda^n \det(\lambda I_m - CQB P) = \lambda^n \det\left(\lambda I_m - \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}\right) \\ &= \lambda^n \det\begin{pmatrix} \lambda I_r - B_{11} & -B_{12} \\ \mathbf{0} & \lambda I_{m-r} \end{pmatrix} \\ &= \lambda^{m+n-r} \det(\lambda I_r - B_{11}). \end{aligned}$$

另一方面,

$$\begin{aligned} \lambda^m \det(\lambda I_n - BA) &= \lambda^m \det(\lambda I_n - BPCQ) = \lambda^m \det(Q^{-1}(\lambda I_n - QBPC)Q) \\ &= \lambda^m \det(\lambda I_n - QBPC) = \lambda^m \det\left(\lambda I_n - \begin{pmatrix} B_{11} & \mathbf{0} \\ B_{21} & \mathbf{0} \end{pmatrix}\right) \\ &= \lambda^m \det\begin{pmatrix} \lambda I_r - B_{11} & \mathbf{0} \\ -B_{21} & \lambda I_{n-r} \end{pmatrix} \\ &= \lambda^{m+n-r} \det(\lambda I_r - B_{11}). \end{aligned}$$

于是得到

$$\lambda^n \det(\lambda I_m - AB) = \lambda^m \det(\lambda I_n - BA).$$

□

例 3.3.5. n 阶方阵 A 的 n 个子式

$$A \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, k \\ 1, 2, \dots, k \end{pmatrix}, \quad k = 1, 2, \dots, n,$$

称为方阵 A 的**顺序主子式**. 设方阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的顺序主子式都是正的, 而非对角元都是负的. 证明: 逆矩阵 A^{-1} 的每个元素都是正的.

证明. 对阶数 n 用归纳法. 当 $n = 1$ 时, 结论显然成立. 设结论对 $n - 1$ 阶方阵成立, 并设 A 是 n 阶方阵. 把方阵 A 分块为

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & \alpha \\ \beta^T & a_{nn} \end{pmatrix},$$

其中 α 与 β 是 $(n - 1) \times 1$ 矩阵, A_1 是 A 的 $n - 1$ 阶子矩阵.

由假设,

$$\det A_1 = A \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, (n - 1) \\ 1, 2, \dots, (n - 1) \end{pmatrix} > 0,$$

因此 A_1 可逆. 由 Schur 公式,

$$\begin{pmatrix} I_{n-1} & \mathbf{0} \\ -\beta^T A_1^{-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 & \alpha \\ \beta^T & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_{n-1} & -A_1^{-1}\alpha \\ \mathbf{0} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & a_{nn} - \beta^T A_1^{-1}\alpha \end{pmatrix}.$$

两端取行列式, 得到

$$\det A = (a_{nn} - \beta^T A_1^{-1} \alpha) \det A_1.$$

因为 $\det A_1 > 0$, $\det A > 0$, 故

$$a_{nn} - \beta^T A_1^{-1} \alpha > 0.$$

由于

$$\begin{pmatrix} I_{n-1} & \mathbf{0} \\ -\beta^T A_1^{-1} & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} I_{n-1} & \mathbf{0} \\ \beta^T A_1^{-1} & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} I_{n-1} & -A_1^{-1} \alpha \\ \mathbf{0} & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} I_{n-1} & A_1^{-1} \alpha \\ \mathbf{0} & 1 \end{pmatrix}.$$

因此

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & \alpha \\ \beta^T & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{n-1} & \mathbf{0} \\ \beta^T A_1^{-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & a_{nn} - \beta^T A_1^{-1} \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_{n-1} & A_1^{-1} \alpha \\ \mathbf{0} & 1 \end{pmatrix}.$$

于是由“穿脱原理”:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1 & \alpha \\ \beta^T & a_{nn} \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} I_{n-1} & -A_1^{-1} \alpha \\ \mathbf{0} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1^{-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & (a_{nn} - \beta^T A_1^{-1} \alpha)^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_{n-1} & \mathbf{0} \\ -\beta^T A_1^{-1} & 1 \end{pmatrix}.$$

展开得

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} + (a_{nn} - \beta^T A_1^{-1} \alpha)^{-1} A_1^{-1} \alpha \beta^T A_1^{-1} & -(a_{nn} - \beta^T A_1^{-1} \alpha)^{-1} A_1^{-1} \alpha \\ -(a_{nn} - \beta^T A_1^{-1} \alpha)^{-1} \beta^T A_1^{-1} & (a_{nn} - \beta^T A_1^{-1} \alpha)^{-1} \end{pmatrix}.$$

由于 $a_{nn} - \beta^T A_1^{-1} \alpha > 0$, 故 A^{-1} 的 (n, n) 元是正的. 由归纳假设, A_1^{-1} 的每个元素都是正的, 而 α 与 β^T 的每个元素都是负的, 从而

$$-(a_{nn} - \beta^T A_1^{-1} \alpha)^{-1} \beta^T A_1^{-1} \quad \text{与} \quad -(a_{nn} - \beta^T A_1^{-1} \alpha)^{-1} A_1^{-1} \alpha$$

的每个元素都是正的.

最后, 由于 α 与 β^T 的每个元素都是负的, 因此 $\alpha \beta^T$ 的每个元素都是正的. 又 A_1^{-1} 的每个元素都是正的, 所以

$$A_1^{-1} + (a_{nn} - \beta^T A_1^{-1} \alpha)^{-1} A_1^{-1} \alpha \beta^T A_1^{-1}$$

的每个元素都是正的. 因此, A^{-1} 的所有元素均为正. □

3.4 一些例子

3.4.1 A^k 和 e^A

例 3.4.1. $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 定义 $e^A := \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^m \frac{A^k}{k!}$. 设复方阵 A, B 可交换, 则 $e^{A+B} = e^A \cdot e^B$.

证明. 首先证明极限 $\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^m \frac{A^k}{k!}$ 存在. 对 n 阶方阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 定义 A 的范数 $|A| := \max\{|a_{ij}|\}$. 根据矩阵加法和乘法运算, 立得

$$|A + B| \leq |A| + |B|, \quad |AB| \leq n|A||B|.$$

这就说明

$$|A^i B^j| \leq n^{i+j-1} |A|^i |B|^j.$$

此外, 根据定义, 显然有

$$\sum_{i=1}^{\infty} |A_i| \text{收敛} \implies \sum_{i=1}^{\infty} A_i \text{收敛}.$$

回到例子的情形, 令 $|A| = M$, $|B| = N$. 由 $|A^k| \leq n^{k-1} M^k$, 而级数 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{n^{k-1} M^k}{k!}$ 收敛, 故可得 $e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$ 收敛.

下面证明若 $AB = BA$, 则 $e^{A+B} = e^A \cdot e^B$. 我们有

$$\sum_{k=0}^{l+m} \frac{(A+B)^k}{k!} - \sum_{i=0}^l \sum_{j=0}^m \frac{A^i B^j}{i! j!} = \left(\sum_{i=l+1}^{l+m} \sum_{j=0}^{l+m-i} + \sum_{j=m+1}^{l+m} \sum_{i=0}^{l-m-j} \right) \frac{A^i B^j}{i! j!}.$$

故

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=0}^{l+m} \frac{(A+B)^k}{k!} - \sum_{i=0}^l \sum_{j=0}^m \frac{A^i B^j}{i! j!} \right| &\leq \left(\sum_{i=l+1}^{l+m} \sum_{j=0}^{l+m-i} + \sum_{j=m+1}^{l+m} \sum_{i=0}^{l-m-j} \right) \frac{n^{i+j-1} M^i N^j}{i! j!} \\ &\leq \sum_{i=l+1}^{l+m} \frac{n^{i-1} M^i}{i!} \sum_{j=0}^m \frac{n^j N^j}{j!} + \sum_{j=m+1}^{l+m} \frac{n^{j-1} N^j}{j!} \sum_{i=0}^l \frac{n^i M^i}{i!} \\ &\leq e^{nN} \sum_{i=l+1}^{l+m} \frac{n^{i-1} M^i}{i!} + e^{nM} \sum_{j=m+1}^{l+m} \frac{n^{j-1} N^j}{j!}. \end{aligned}$$

令 $l, m \rightarrow \infty$, 即例题得证. □

例 3.4.2. 设

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix}_{n \times n} = J_n(\lambda).$$

求 A^k 和 e^A .

解. 由于 $A = \lambda I_n + N$, 由牛顿二项式展开定理, 立即有

$$A^k = \lambda^k I_n + \binom{k}{1} \lambda^{k-1} N + \binom{k}{2} \lambda^{k-2} N^2 + \cdots = \sum_{i=0}^{\min(k, n-1)} \binom{k}{i} \lambda^{k-i} N^i.$$

从而

$$e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sum_{i=0}^{n-1} \binom{k}{i} \lambda^{k-i} N^i}{k!} = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{i!} \sum_{k=i}^{\infty} \frac{\lambda^{k-i}}{(k-i)!} N^i = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{e^\lambda}{i!} N^i.$$

特别地, $n = 2$ 时有

$$e^A = \begin{pmatrix} e^\lambda & e^\lambda \\ 0 & e^\lambda \end{pmatrix} = e^\lambda \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

若 $n = 3$ 则有

$$e^A = \begin{pmatrix} e^\lambda & e^\lambda & \frac{e^\lambda}{2} \\ 0 & e^\lambda & e^\lambda \\ 0 & 0 & e^\lambda \end{pmatrix} = e^\lambda \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

□

注. (1). 若 $A = \text{diag}(A_1, A_2, \dots, A_k)$, 其中 A_i 均为方阵, 则有

$$e^A = \text{diag}(e^{A_1}, e^{A_2}, \dots, e^{A_k}).$$

(2). 若存在可逆方阵 P 使得 $A = PJP^{-1}$, 则由定义立即有 $e^A = Pe^JP^{-1}$.

3.4.2 矩阵的逆

例 3.4.3. 求 A^{-1} , 其中

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

解1. 对增广矩阵 $(A | I)$ 做初等行变换: $(A | I) \xrightarrow{\text{行变换}} (I | A^{-1})$.

□

解2. 对增广矩阵 $\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & \alpha^T & 1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & A & \mathbf{0} & I_n \end{array} \right)$ 做初等行变换化为: $\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & \mathbf{0} & 1 & -\alpha^T A^{-1} \\ \mathbf{0} & I_n & \mathbf{0} & A^{-1} \end{array} \right)$.

□

解3. 因为

$$A + I = J = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} (1 \cdots 1) = \alpha \cdot \alpha^T,$$

那么 $(A + I)^2 = n(A + I)$, 即 $A^2 + (2 - n)A + (1 - n)I$. 所以

$$A^{-1} = \frac{1}{n-1}(A + (n-2)I) = \begin{pmatrix} \frac{2-n}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \cdots & \frac{1}{n-1} \\ \frac{1}{n-1} & \frac{2-n}{n-1} & \cdots & \frac{1}{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \cdots & \frac{2-n}{n-1} \end{pmatrix}.$$

□

解4. 由上述例题, 有

$$(I_n - BA)^{-1} = I_n + B(I_m - AB)^{-1}A.$$

因此

$$A^{-1} = (-I_n + J)^{-1} = -(I_n - \alpha \cdot \alpha^T)^{-1} = -(I_n + (1 - n)^{-1} \alpha \cdot \alpha^T) = \frac{1}{n-1}J - I_n.$$

□

例 3.4.4. 求矩阵 A 的逆, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & & \\ 1 & 2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ & & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

解1. 记 $A = A_n$, $\det(A) = \Delta_n$. 由三对角方阵行列式, 立即有 $\Delta_n = \Delta_2 - \Delta_1 = 1$, $\det(A) = n+1$. 更一般地, 我们有

$$\Delta_{m+n} = \Delta_m \Delta_n - bc \Delta_{m-1} \Delta_{n-1}.$$

计算可得 $i \leq j$ 时, 有

$$M_{ij} = \Delta_{i-1} \Delta_{n-j} = i(n+1-j).$$

那么根据 $M_{ij} = M_{ji}$, 可知

$$A^{-1} = \left((-1)^{i+j} (\min(i, j) - \frac{ij}{n+1}) \right). \quad \square$$

解2. 定义方阵 $B = (b_{ij})_{n \times n}$, 满足

$$b_{ij} = \begin{cases} (-1)^{i+j} \Delta_{i-1} \Delta_{n-j} = (-1)^{i+j} i(n+1-j), & i \leq j, \\ (-1)^{i+j} \Delta_{j-1} \Delta_{n-i} = (-1)^{i+j} j(n+1-i), & i > j. \end{cases}$$

也就是 $b_{ij} = (-1)^{i+j} (\min(i, j)(n+1) - ij)$. 设 $C = AB = (c_{ij})_{n \times n}$. 则立即有

$$\begin{aligned} (-1)^{i+j-1} c_{ij} &= (-1)^{i+j-1} \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} = (-1)^{i+j-1} (a_{i,i-1} b_{i-1,j} + a_{i,i} b_{i,j} + a_{i,i+1} b_{i+1,j}) \\ &= (n+1) (\min(i-1, j) - 2\min(i, j) + \min(i+1, j)) - (i-1)j + 2ij - (i+1)j \\ &= \delta_{ij}(n+1). \end{aligned}$$

因此有 $B = A^*$. □

3.4.3 秩与相抵

例 3.4.5. 矩阵 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$ 列满秩当且仅当存在 m 阶可逆方阵 P , 使得

$$A = P \begin{pmatrix} I_n \\ \mathbf{0} \end{pmatrix},$$

其中 $\mathbf{0}$ 是 $(m-n) \times n$ 零矩阵.

证明. 充分性显然. 下面证明必要性. 因为 A 是列满秩的, 即 $\text{rank } A = n$. 因此存在 m 阶与 n 阶可逆方阵 R 与 T , 使得

$$A = R \begin{pmatrix} I_n \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} T.$$

由分块矩阵的乘法,

$$A = R \begin{pmatrix} T \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} T & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & I_{m-n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} I_n \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}. \quad \square$$

例 3.4.6. 设 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$. 证明 $\text{rank } A = r \geq 1$ 的充分必要条件是, 存在列满秩的 $m \times r$ 矩阵 B 与行满秩的 $r \times n$ 矩阵 C , 使得 $A = BC$.

证明. 必要性: 设 $\text{rank } A = r$, 则存在 m 阶与 n 阶可逆方阵 P 与 Q , 使得

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} Q = P \begin{pmatrix} I_r \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}_{m \times r} \cdot \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \end{pmatrix}_{r \times n} Q = B \cdot C.$$

并且有

$$\text{rank } B = \text{rank } P \begin{pmatrix} I_r \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} I_r \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} = r,$$

$$\text{rank } C = \text{rank} \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \end{pmatrix}_{r \times n} Q = \text{rank} \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \end{pmatrix}_{r \times n} = r,$$

即 B 与 C 分别是列满秩与行满秩的, 并且 $A = BC$.

充分性: 设 $A = BC$, 其中 B 与 C 分别是列满秩与行满秩的. 则由上例

$$B = P \begin{pmatrix} I_r \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}_{m \times r}, \quad C^T = Q^T \begin{pmatrix} I_r \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}_{n \times r},$$

其中 P 为 m 阶可逆方阵, Q^T 是 n 阶可逆方阵. 于是

$$A = P \begin{pmatrix} I_r \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}_{m \times r} \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \end{pmatrix}_{r \times n} Q = P \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} Q.$$

所以 $\text{rank } A = r$. □

注. 任意矩阵可分解为列满秩矩阵与行满秩矩阵的乘积, 故上述结论也称为矩阵的**满秩分解定理**.

例 3.4.7. 证明: $r(AB) = r(A)$ 当且仅当存在矩阵 X 使得 $ABX = A$.

证明. 若 $ABX = A$, 则

$$r(A) = r(ABX) \leq r(AB) \leq r(A) \implies r(AB) = r(A).$$

另一方面, 设 $r(AB) = r(A)$. 则 $A = P \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} Q$, 其中 P, Q 为可逆阵. 记 $QB = \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}$

其中 C_1 的行数是 r , 则 $AB = P \begin{pmatrix} C_1 \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}$. 由 $r(AB) = r$ 知 C_1 是行满秩矩阵. 令 D_1 是它的一个右逆. 则 $X = (D_1 \mathbf{0})Q$ 满足 $ABX = A$. □

注. 由上述例题, 立即有

$$r(A^k) = r(A^{k+1}) \implies \exists X, A^k = A^{k+1}X \implies A^{k+1} = A^{k+2}X.$$

立即有

$$r(A^{k+1}) = r(A^{k+2}X) \leq r(A^{k+2}) \leq r(A^{k+1}).$$

例 3.4.8. 设 A 是给定 $m \times n$ 矩阵, X 是 $m \times n$ 矩阵, 求方程 $A^T X = X^T A$ 的所有解 X .

证明. 设 $\text{rank } A = r$, 取定 m 阶与 n 阶可逆方阵 P 与 Q , 使得

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} Q.$$

代入原矩阵方程, 得到

$$Q^T \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} P^T X = X^T P \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} Q \iff \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} P^T X Q^{-1} = (P^T X Q^{-1})^T \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}.$$

记

$$P^T X Q^{-1} = Y = \begin{pmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Y_{11}^T & \mathbf{0} \\ Y_{12}^T & \mathbf{0} \end{pmatrix}.$$

因此, $Y_{11}^T = Y_{11}$, $Y_{12} = \mathbf{0}$. 于是,

$$X = (P^T)^{-1} Y Q = (P^T)^{-1} \begin{pmatrix} Y_{11} & \mathbf{0} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{pmatrix} Q \quad (3.1)$$

其中 Y_{11} 是任意的 r 阶对称方阵, Y_{21} 与 Y_{22} 分别是任意的 $(m-r) \times r$ 与 $(m-r) \times (n-r)$ 矩阵. 这说明, 原矩阵方程的解 X 应具有形式 (3.1).

反之, 形如(3.1)的矩阵 X 一定是原矩阵方程的解. 因此, (3.1)给出了原矩阵方程的所有解. $\square$

例 3.4.9. 证明, n 阶幂等方阵 A (即适合 $A^2 = A$) 的秩等于它的迹.

证明1. 设 $\text{rank } A = r$, 则存在 n 阶可逆方阵 P 和 Q , 使得

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} Q.$$

因为方阵 A 是幂等的, 所以,

$$P \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} Q P \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} Q = P \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} Q \implies \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} Q P \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}.$$

记

$$Q P = R = \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} R_{11} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} \implies R_{11} = I_r, \quad Q = \begin{pmatrix} I_r & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{pmatrix} P^{-1}.$$

于是

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{pmatrix} P^{-1} = P \begin{pmatrix} I_r & R_{12} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} P^{-1}.$$

立即有 $\text{tr}(A) = r = r(A)$. $\square$

证明2. 考虑方阵 A 的特征值, 若 α 是 A 属于特征值 λ 的特征向量, 则有

$$\lambda \alpha = A \alpha = A^2 \alpha = \lambda^2 \alpha \implies \lambda^2 = \lambda \implies \lambda = 1, 0.$$

由任意方阵相似于上三角阵, 故存在可逆方阵 P 使得

$$PAP^{-1} = \begin{pmatrix} B & C \\ \mathbf{0} & D \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & * & \cdots & * \\ 0 & 1 & \ddots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & * \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}_{r \times r}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & * & \cdots & * \\ 0 & 0 & \ddots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & * \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

再由幂等性

$$A^2 = A \implies B^2 = B, D^2 = D \implies B(I_r - B) = \mathbf{0}, D(I_{n-r} - D) = \mathbf{0}.$$

由于 B 和 $I_{n-r} - D$ 可逆, 立即有 $B = I_r, D = \mathbf{0}$. □

例 3.4.10. 设 A 为 n 阶方阵. 证明: $A^2 = A \iff r(A) + r(I_n - A) = n$.

证明1. 设 $A = P \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} Q$, 其中 P, Q 可逆. 记 $QP = \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{pmatrix}$. 则

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} QPP^{-1} = P \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} P^{-1},$$

$$A^2 = P \begin{pmatrix} R_{11}^2 & R_{11}R_{12} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} P^{-1}, \quad I_n - A = P \begin{pmatrix} I_r - R_{11} & -R_{12} \\ \mathbf{0} & I_{n-r} \end{pmatrix} P^{-1}.$$

首先, 若 $A^2 = A$, 则 $R_{11}(R_{11}, R_{12}) = (R_{11}, R_{12})$, 所以 $r = r(R_{11}, R_{12}) \leq r(R_{11}) \leq r$. 这说明 $r(R_{11}) = r$ 即 R_{11} 可逆. 再由 $R_{11}^2 = R_{11}$ 有 $R_{11} = I_r$. 因此 $r(I_n - A) = n - r$.

另一方面, 由于 $r(I_n - A) \geq r(I_{n-r}) + r(I_r - R_{11})$, 若 $r(I_n - A) = n - r$, 则 $R_{11} = I_r$ 且 $A^2 = A$. □

证明2. 考虑 $2n$ 阶方阵如下广义初等变换

$$\begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & I_n - A \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} A & A \\ \mathbf{0} & I_n - A \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} A & I_n \\ \mathbf{0} & I_n - A \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} A & I_n \\ A^2 - A & \mathbf{0} \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} I_n & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & A^2 - A \end{pmatrix}.$$

立即有题目结论. □

更一般地, 我们有

例 3.4.11. 设 n 阶方阵 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 满足

$$A_1 + A_2 + \cdots + A_k = I_n.$$

证明, 方阵 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 为幂等的充分必要条件是,

$$\text{rank } A_1 + \text{rank } A_2 + \cdots + \text{rank } A_k = n.$$

证明. 必要性: 设方阵 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 幂等, 则由例 (3.4.10), $\text{rank } A_i = \text{tr } A_i$. 故

$$\text{rank } A_1 + \text{rank } A_2 + \dots + \text{rank } A_k = \text{tr } A_1 + \text{tr } A_2 + \dots + \text{tr } A_k = n.$$

充分性: 当 $k = 2$ 时, 由例 (3.4.10) 立即可得结论.

现在转到一般的 k . 记 $B_i = A_1 + \dots + A_{i-1} + A_{i+1} + \dots + A_k$, 则对于 $1 \leq i \leq k$,

$$A_i + B_i = I_n.$$

因为

$$\text{rank } B_i \leq \text{rank } A_1 + \dots + \text{rank } A_{i-1} + \text{rank } A_{i+1} + \dots + \text{rank } A_k = n - \text{rank } A_i,$$

即

$$\text{rank } A_i + \text{rank } B_i \leq n.$$

另一方面,

$$\text{rank } A_i + \text{rank } B_i \geq \text{rank}(A_i + B_i) = \text{rank } I_n = n.$$

因此, 对于 $1 \leq i \leq k$,

$$\text{rank } A_i + \text{rank } B_i = n.$$

这说明, 方阵 A_i 与 B_i 满足 $k = 2$ 时的条件, 从而方阵 A_i 是幂等的, $i = 1, 2, \dots, k$. □