

# Klinisk Dansk

Sygeplejesprog — bilingual referenceværk

Danish for nursing / healthcare · niveau B2–C1

---

## Fire dage — kredsløb, respiration, smerte & medicin

Dag 1 Kredsløb & blodtryk · Dag 2 Respiration & saturation

Dag 3 Smerte & neuro · Dag 4 Medicin & ordination

# Contents

|          |                                                             |           |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Kredsløb &amp; blodtryk</b>                              | <b>2</b>  |
| 1.1      | Ordforråd . . . . .                                         | 2         |
| 1.1.1    | Substantiver — organer, symptomer, måleværdier . . . . .    | 2         |
| 1.1.2    | Verber — sygepleje-handlinger . . . . .                     | 3         |
| 1.1.3    | Adjektiver — beskrivelser af symptomer og værdier . . . . . | 3         |
| 1.2      | Dokumentationssprog . . . . .                               | 4         |
| 1.2.1    | Grundregler . . . . .                                       | 4         |
| 1.2.2    | Dårlig vs. god formulering . . . . .                        | 4         |
| 1.3      | Patientnotat . . . . .                                      | 5         |
| 1.3.1    | Eksempel — indlæggelse, medicinsk afdeling . . . . .        | 6         |
| 1.3.2    | Øvelser . . . . .                                           | 6         |
| 1.3.3    | Facit . . . . .                                             | 6         |
| <b>2</b> | <b>Respiration &amp; saturation</b>                         | <b>7</b>  |
| 2.1      | Ordforråd . . . . .                                         | 7         |
| 2.1.1    | Substantiver . . . . .                                      | 7         |
| 2.1.2    | Verber . . . . .                                            | 7         |
| 2.1.3    | Adjektiver . . . . .                                        | 8         |
| 2.2      | Dokumentationssprog . . . . .                               | 8         |
| 2.2.1    | Grundregler . . . . .                                       | 8         |
| 2.2.2    | Dårlig vs. god formulering . . . . .                        | 9         |
| 2.3      | Patientnotat . . . . .                                      | 9         |
| 2.3.1    | Eksempel — forværring, medicinsk afdeling (KOL) . . . . .   | 9         |
| 2.3.2    | Øvelser . . . . .                                           | 10        |
| 2.3.3    | Facit . . . . .                                             | 10        |
| <b>3</b> | <b>Smerte &amp; neuro</b>                                   | <b>11</b> |
| 3.1      | Ordforråd . . . . .                                         | 11        |
| 3.1.1    | Substantiver . . . . .                                      | 11        |
| 3.1.2    | Verber . . . . .                                            | 11        |
| 3.1.3    | Adjektiver . . . . .                                        | 12        |
| 3.2      | Dokumentationssprog . . . . .                               | 12        |
| 3.2.1    | Grundregler . . . . .                                       | 12        |
| 3.2.2    | Dårlig vs. god formulering . . . . .                        | 13        |
| 3.3      | Patientnotat . . . . .                                      | 13        |
| 3.3.1    | Eksempel — akut modtagelse (hovedpine + neuro) . . . . .    | 13        |
| 3.3.2    | Øvelser . . . . .                                           | 14        |
| 3.3.3    | Facit . . . . .                                             | 14        |
| <b>4</b> | <b>Medicin &amp; ordination</b>                             | <b>15</b> |
| 4.1      | Ordforråd . . . . .                                         | 15        |
| 4.1.1    | Substantiver . . . . .                                      | 15        |
| 4.1.2    | Verber . . . . .                                            | 15        |
| 4.1.3    | Adjektiver / administrationsveje . . . . .                  | 16        |
| 4.2      | Dokumentationssprog . . . . .                               | 16        |
| 4.2.1    | Grundregler . . . . .                                       | 16        |
| 4.2.2    | Dårlig vs. god formulering . . . . .                        | 17        |

|       |                                                                |    |
|-------|----------------------------------------------------------------|----|
| 4.3   | Patientnotat . . . . .                                         | 17 |
| 4.3.1 | Eksempel — medicinadministration, medicinsk afdeling . . . . . | 17 |
| 4.3.2 | Øvelser . . . . .                                              | 18 |
| 4.3.3 | Facit . . . . .                                                | 18 |

# 1 Kredsløb & blodtryk

Denne dag dækker hjertet, karrene og blodtrykket — og hvordan du beskriver det, du ser og måler, i **objektivt fagsprog**. Bogen er tosproget: dansk er det primære sprog, og hver term og hvert eksempel har en engelsk oversættelse (*English in violet italics*).

## 1.1 Ordforråd

### 1.1.1 Substantiver — organer, symptomer, måleværdier

| Dansk                         | Ordklasse  | English                      | Eksempel                                                           |
|-------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| hjertet                       | substantiv | <i>the heart</i>             | Hjertet pumper iltet blod ud i det store kredsløb.                 |
| blodkar / kar                 | subst.     | <i>blood vessel</i>          | Karrene i benene er svære at palpere pga. ødem.                    |
| arterie (pulsåre)             | subst.     | <i>artery</i>                | Blodet i en arterie er iltrigt og lyserødt.                        |
| vene (blodåre)                | subst.     | <i>vein</i>                  | Der anlægges et perifert venekateter (PVK) i venstre underarm.     |
| kapillær (hårkar)             | subst.     | <i>capillary</i>             | Kapillærresponsen (CR) er under 2 sekunder — normal.               |
| hjerterklap                   | subst.     | <i>heart valve</i>           | Der høres en mislyd fra en af hjerterklapperne.                    |
| blodtryk (BT)                 | subst.     | <i>blood pressure</i>        | BT måles til 138/86 mmHg i højre arm.                              |
| det systoliske tryk           | subst.     | <i>systolic pressure</i>     | Det systoliske tryk er forhøjet.                                   |
| det diastoliske tryk          | subst.     | <i>diastolic pressure</i>    | Det diastoliske tryk ligger stabilt omkring 80.                    |
| puls                          | subst.     | <i>pulse</i>                 | Pulsen er 102 og regelmæssig.                                      |
| hjerterefrekvens (HF)         | subst.     | <i>heart rate</i>            | HF falder til 68 efter hvile.                                      |
| iltmætning / saturation (SAT) | subst.     | <i>oxygen saturation</i>     | Saturation 96 % på atmosfærisk luft.                               |
| brystsmerter                  | subst.     | <i>chest pain</i>            | Pt. angiver trykkende brystsmerter med udstråling til venstre arm. |
| hjerterbanken / palpitationer | subst.     | <i>palpitations</i>          | Pt. beskriver anfald af hjerterbanken i hvile.                     |
| ødem                          | subst.     | <i>oedema / swelling</i>     | Der ses bilateralt ankelødem, gradtrykbart.                        |
| blodprop (trombe)             | subst.     | <i>blood clot / thrombus</i> | Mistanke om blodprop i venstre underben (DVT).                     |
| hjerterinfarkt (AMI)          | subst.     | <i>myocardial infarction</i> | Symptomerne rejser mistanke om akut hjerterinfarkt.                |
| ordination                    | subst.     | <i>order / prescription</i>  | Nitroglycerin gives efter ordination.                              |
| kredsløbet                    | subst.     | <i>the circulation</i>       | Pt. er kredsløbsmæssigt stabil.                                    |

### 1.1.2 Verber — sygepleje-handlinger

| Dansk           | Ordklasse | English                     | Eksempel                                             |
|-----------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| at observere    | verbum    | <i>to observe</i>           | Pt. observeres for ændringer i bevidsthedsniveau.    |
| at måle         | verbum    | <i>to measure</i>           | Der måles BT, puls og saturation hver time.          |
| at palpere      | verbum    | <i>to palpate</i>           | Radialispulsen palperes kraftig og regelmæssig.      |
| at auskultere   | verbum    | <i>to auscultate</i>        | Hjertet auskulteres uden mislyde.                    |
| at monitorere   | verbum    | <i>to monitor</i>           | Pt. monitoreres kontinuerligt med EKG.               |
| at administrere | verbum    | <i>to administer</i>        | Furosemid 40 mg administreres i.v. efter ordination. |
| at ordinere     | verbum    | <i>to prescribe / order</i> | Lægen ordinerer ilt 2 l/min på næsekateter.          |
| at dokumentere  | verbum    | <i>to document</i>          | Observationerne dokumenteres i sygeplejebogen.       |
| at registrere   | verbum    | <i>to record</i>            | Værdierne registreres i observationsskemaet.         |
| at angive       | verbum    | <i>to report / state</i>    | Pt. angiver smerter svarende til 6 på VAS-skalaen.   |
| at klage over   | verbum    | <i>to complain of</i>       | Pt. klager over svimmelhed ved sengekanten.          |
| at desaturere   | verbum    | <i>to desaturate</i>        | Pt. desaturerer til 88 % ved gang på gangen.         |

### 1.1.3 Adjektiver — beskrivelser af symptomer og værdier

| Dansk                      | Ordklasse | English                    | Eksempel                                                    |
|----------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| regelmæssig / uregelmæssig | adjektiv  | <i>regular / irregular</i> | Pulsen er uregelmæssig — mistanke om atrieflimren.          |
| forhøjet                   | adjektiv  | <i>elevated</i>            | Blodtrykket er forhøjet gennem hele vagten.                 |
| hypertensiv                | adjektiv  | <i>hypertensive</i>        | Pt. er hypertensiv med BT 178/104.                          |
| hypotensiv                 | adjektiv  | <i>hypotensive</i>         | Pt. bliver hypotensiv ved skift til stående (ortostatisk).  |
| takykard                   | adjektiv  | <i>tachycardic</i>         | Pt. er takykard med HF 118 i hvile.                         |
| bradykard                  | adjektiv  | <i>bradycardic</i>         | Pt. er bradykard med HF 46 under søvn.                      |
| perifer                    | adjektiv  | <i>peripheral</i>          | Den perifere cirkulation i tærne er nedsat.                 |
| kold og klam               | adjektiv  | <i>cold and clammy</i>     | Huden er kold og klam, pt. er bleg.                         |
| marmoreret                 | adjektiv  | <i>mottled</i>             | Huden på knæene er marmoreret — tegn på dårlig cirkulation. |
| jagende / skarp            | adjektiv  | <i>sharp / stabbing</i>    | Pt. beskriver en jagende smerte ved indånding.              |

| Dansk     | Ordklasse | English                     | Eksempel                                                  |
|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| dump      | adjektiv  | <i>dull</i>                 | En dump, murrende smerte bag brystbenet.                  |
| murrende  | adjektiv  | <i>aching / nagging</i>     | Pt. angiver murrende ubehag i brystet.                    |
| trykkende | adjektiv  | <i>pressing / squeezing</i> | Trykkende bryst smerter, som ved en snørende fornemmelse. |
| bleg      | adjektiv  | <i>pale</i>                 | Pt. er bleg og forpint ved ankomst.                       |
| cyanotisk | adjektiv  | <i>cyanotic</i>             | Læberne er let cyanotiske.                                |

## 1.2 Dokumentationssprog

### 1.2.1 Grundregler

1. **Skriv objektivt** — beskriv hvad du ser, hører og måler, ikke hvad du tror eller føler.  
*Write objectively — what you see, hear and measure, not what you think or feel.*
2. **Ingen personlig vurdering.** Undgå ord som “virker”, “ser ud til”, “er sød/besværlig”.  
*No personal judgement. Avoid “seems”, “looks like”, “is nice/difficult”.*
3. **Adskil hvad patienten SIGER fra hvad du OBSERVERER.** Brug “pt. angiver ...” for det subjektive.  
*Separate what the patient SAYS from what you OBSERVE. Use “pt. reports ...”.*
4. **Brug tal og enheder:** BT 138/86 mmHg, puls 102, SAT 96 %, VAS 6/10.  
*Use numbers and units.*
5. **Angiv altid betingelsen** for en måling: “SAT 92 % på atmosfærisk luft” vs. “på 2 l ilt”.  
*Always state the condition of a measurement (room air vs. oxygen).*
6. **Skriv kort og telegramagtigt.** Forkortelser: pt. (patient), i.v., p.n. (efter behov).  
*Write short and telegraphic; standard abbreviations.*

### 1.2.2 Dårlig vs. god formulering

Pt. virker dårlig og har vist lidt ondt i brystet.

Pt. angiver trykkende bryst smerter VAS 6/10 med udstråling til venstre arm. BT 165/98, puls 102 regelmæssig, SAT 95 % på atm. luft, hud kold og klam.

#### Hvorfor

“Virker dårlig” og “vist lidt” er vurdering og gætterier. Den gode note adskiller det subjektive (pt. angiver) fra objektive målte værdier med tal og enheder.

Gav ham hans hjertemedicin.

Metoprolol 50 mg administreret p.o. kl. 08.00 efter ordination.

#### Hvorfor

Dokumentér præparat, dosis, administrationsvej, tidspunkt og at det skete efter ordination — aldrig bare “medicinen”.

Pt. er sur og vil ikke samarbejde om blodtrykket.

Pt. afviser BT-måling kl. 10 og angiver, at han “vil have ro”. BT ikke målt. Informeret om formålet, forsøges igen kl. 12.

#### Hvorfor

“Sur” og “vil ikke samarbejde” er en negativ vurdering. Beskriv i stedet handlingen (afviser), patientens egne ord i citat, og hvad du gør ved det.

Saturationen var fin.

SAT 97 % på atmosfærisk luft, upåvirket respiration, RF 16.

#### Hvorfor

“Fin” siger intet. Angiv den målte værdi, betingelsen (atm. luft/ilt) og gerne respirationsfrekvensen.

Benene er lidt hævede, tror det er væske.

Bilateralt ankelødem, gradtrykbart. Vægt +1,3 kg ift. i går. Lægen orienteret.

#### Hvorfor

Erstat “tror” og “lidt” med en objektiv beskrivelse (bilateralt, gradtrykbart), et måltal (vægtændring) og handlingen (lægen orienteret).

## 1.3 Patientnotat

### 1.3.1 Eksempel — indlæggelse, medicinsk afdeling

Pt. 74-årig mand indlagt kl. 21.40 med trykkende bryst smerter opstået i hvile, VAS 7/10, med udstråling til venstre skulder. Pt. bleg og klamtsvedende. BT 178/102 mmHg, puls 108 uregelmæssig, SAT 93 % på atmosfærisk luft, RF 22, temp. 37,1 °C. Perifert kølige ekstremiteter, kapillærrespons 3 sek. Nitroglycerin 0,5 mg gives sublingualt efter ordination kl. 21.55; smerte falder til VAS 3/10. Ilt 2 l/min ordineret og påbegyndt; SAT stiger til 96 %. Pt. monitoreres med EKG. Lægen tilser.

*74-year-old man admitted 21:40 with pressing chest pain arising at rest, VAS 7/10, radiating to the left shoulder. Pt. pale and clammy. BP 178/102 mmHg, pulse 108 irregular, SAT 93% on room air, RR 22, temp 37.1 °C. Peripherally cool extremities, capillary refill 3 sec. Nitroglycerin 0.5 mg given sublingually as prescribed at 21:55; pain drops to VAS 3/10. Oxygen 2 l/min prescribed and started; SAT rises to 96%. Pt. monitored with ECG. Doctor attends.*

### 1.3.2 Øvelser

1. **Omskriv til objektivt fagsprog:** “Den gamle mand så virkelig dårlig ud og havde det skidt med brystet.”
2. **Omskriv:** “Gav ham noget under tungen og det hjalp på smerten.”
3. **Udfyld verbet:** “SAT 93 % på atmosfærisk luft. Ilt 2 l/min \_\_\_\_\_ og påbegyndt; SAT stiger til 96 %.”
4. **Udfyld verbet:** “Metoprolol 50 mg \_\_\_\_\_ p.o. efter ordination kl. 08.00.”
5. **Find vurderingen,** der ikke hører hjemme: “Pt. angiver kvalme. BT 138/84. Pt. er en smule krævende. SAT 97 %.”

### 1.3.3 Facit

1. Pt. er bleg og forpint, angiver trykkende bryst smerter VAS 7/10 med udstråling til venstre skulder.
2. Nitroglycerin 0,5 mg administreret sublingualt efter ordination; smerte falder fra VAS 7/10 til 3/10.
3. **ordineret** (lægen ordinerer ilt).
4. **administreret** (sygeplejersken administrerer medicinen).
5. “Pt. er en smule krævende” — en personlig, negativ vurdering uden observation bag.



## 2 Respiration & saturation

Denne dag handler om vejrtrækningen: respirationsfrekvens, iltmætning, iltbehandling og de lyde og symptomer, du observerer — dyspnø, hoste, ekspektorat, rallen og hvæsen. Kernen er altid at angive **iltbetingelsen** sammen med saturationen.

### 2.1 Ordforråd

#### 2.1.1 Substantiver

| Dansk                            | Ordklasse | English                            | Eksempel                                           |
|----------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| respiration /<br>vejrtrækning    | subst.    | <i>respiration /<br/>breathing</i> | Vejrtrækningen er overfladisk og anstrengt.        |
| respirationsfrekvens<br>(RF)     | subst.    | <i>respiratory rate</i>            | RF 24 i hvile — let forhøjet.                      |
| åndenød / dyspnø                 | subst.    | <i>dyspnoea</i>                    | Pt. angiver tiltagende åndenød ved gang.           |
| iltmætning /<br>saturation (SAT) | subst.    | <i>oxygen saturation</i>           | SAT 91 % på atm. luft, stiger til 96 % på 2 l ilt. |
| luftvej                          | subst.    | <i>airway</i>                      | Pt. har fri luftvej og taler i hele sætninger.     |
| ekspektorat /<br>opspyt          | subst.    | <i>sputum</i>                      | Gulligt, purulent ekspektorat.                     |
| hoste                            | subst.    | <i>cough</i>                       | Produktiv hoste med sejt slim.                     |
| ilt / oxygen (O <sub>2</sub> )   | subst.    | <i>oxygen</i>                      | Ilt 2 l/min gives på næsekateter efter ordination. |
| næsekateter                      | subst.    | <i>nasal cannula</i>               | Ilten leveres via næsekateter.                     |
| iltmaske                         | subst.    | <i>oxygen mask</i>                 | Skiftet til iltmaske med reservoir, 10 l/min.      |
| lungeødem                        | subst.    | <i>pulmonary oedema</i>            | Rallen ved basis giver mistanke om lungeødem.      |
| lungebetændelse<br>(pneumoni)    | subst.    | <i>pneumonia</i>                   | Pt. behandles for pneumoni med i.v. antibiotika.   |
| KOL                              | subst.    | <i>COPD</i>                        | Pt. er kendt med svær KOL.                         |
| cyanose                          | subst.    | <i>cyanosis</i>                    | Let central cyanose omkring læberne.               |

#### 2.1.2 Verber

| Dansk                    | Ordklasse | English           | Eksempel                                                |
|--------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| at trække vejret         | verbum    | <i>to breathe</i> | Pt. trækker vejret anstrengt med brug af hjælpemuskler. |
| at indånde /<br>inhalere | verbum    | <i>to inhale</i>  | Medicinen inhaleres via forstøverapparat.               |

| Dansk                    | Ordklasse | English                       | Eksempel                                         |
|--------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| at udånde /<br>ekspirere | verbum    | <i>to exhale</i>              | Der ses forlænget ekspiration, typisk for KOL.   |
| at hoste                 | verbum    | <i>to cough</i>               | Pt. hoster produktivt gennem natten.             |
| at ekspektorere          | verbum    | <i>to expectorate</i>         | Pt. ekspektorerer sejt, gulligt slim.            |
| at auskultere            | verbum    | <i>to auscultate</i>          | Lungerne auskulteres med rallen ved begge baser. |
| at desaturere            | verbum    | <i>to desaturate</i>          | Pt. desaturerer til 87 % ved gang til toilettet. |
| at iltbehandle           | verbum    | <i>to give oxygen therapy</i> | Pt. iltbehandles med 2 l/min efter ordination.   |
| at hyperventilere        | verbum    | <i>to hyperventilate</i>      | Pt. hyperventilerer i forbindelse med angst.     |

### 2.1.3 Adjektiver

| Dansk                   | Ordklasse | English                     | Eksempel                                        |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| overfladisk             | adjektiv  | <i>shallow</i>              | Vejrtrækningen er overfladisk og hurtig.        |
| anstrengt /<br>besværet | adjektiv  | <i>laboured</i>             | Anstrengt respiration med indtrækninger.        |
| rallende                | adjektiv  | <i>crackling / rattling</i> | Rallende vejtrækning, hørbar uden stetoskop.    |
| pibende /<br>hvæsende   | adjektiv  | <i>wheezing</i>             | Pibende, hvæsende ekspiration ved auskultation. |
| produktiv / tør         | adjektiv  | <i>productive / dry</i>     | Hosten er nu produktiv, tidligere tør.          |
| purulent / klar         | adjektiv  | <i>purulent / clear</i>     | Ekspektoratet er purulent og gulligt.           |
| takypnø                 | adjektiv  | <i>tachypnoeic</i>          | Pt. er takypnø med RF 28 i hvile.               |
| cyanotisk               | adjektiv  | <i>cyanotic</i>             | Læber og negle er let cyanotiske.               |

## 2.2 Dokumentationssprog

### 2.2.1 Grundregler

1. **Angiv ALTID iltbetingelsen** ved en saturation: “SAT 92 % på atmosfærisk luft” vs. “på 2 l ilt”.
2. **Beskriv respirationen** med RF + karakter (overfladisk/anstrengt/upåvirket), ikke “trækker vejret fint”.
3. **Karakterisér hoste** (produktiv/tør) og ekspektorat (mængde, farve, konsistens).
4. **Skriv objektive lyde**: “rallen ved basis”, “pibende ekspiration” — ikke “lyder ikke godt”.
5. **Dokumentér effekten** af iltbehandling: “SAT stiger fra 89 % til 95 % på 2 l ilt”.
6. **Ved KOL**: følg det ordinerede SAT-mål (ofte 88–92 %); for høj ilt kan skade.

## 2.2.2 Dårlig vs. god formulering

Han trækker ikke rigtig vejret ordentligt og ser blå ud.

RF 28, anstrengt respiration med brug af hjælpemuskler. Central cyanose omkring læberne. SAT 88 % på atmosfærisk luft.

### Hvorfor

Beskriv RF, respirationens karakter, den objektive cyanose og den målte SAT med betingelse i stedet for “ikke ordentligt” og “ser blå ud”.

Gav ilt og det blev bedre.

Ilt 2 l/min påbegyndt på næsekateter efter ordination; SAT stiger fra 89 % til 95 %, RF falder fra 26 til 20.

### Hvorfor

Angiv mængde, leveringsmåde, “efter ordination” og den målte effekt (SAT og RF før/efter).

Lungerne lyder ikke så gode.

Ved auskultation: rallen ved begge baser og pibende expiration bilateralt.

### Hvorfor

Angiv de objektive lyde og hvor de høres — “lyder ikke gode” er ikke klinisk information.

## 2.3 Patientnotat

### 2.3.1 Eksempel — forværring, medicinsk afdeling (KOL)

Pt. 68-årig kvinde, kendt svær KOL, tiltagende åndenød gennem 2 døgn. Ved tilsyn kl. 14.10: RF 28, anstrengt respiration med brug af hjælpemuskler, taler i korte sætninger. SAT 86 % på atmosfærisk luft. Ved auskultation rallen ved begge baser og pibende expiration. Produktiv hoste med purulent, gulligt ekspektorat. Let central cyanose. Ilt 1 l/min ordineret på næsekateter (mål 88–92 %); SAT stiger til 90 %, RF falder til 22. Salbutamol inhalation administreret efter ordination. Pt. lejret i hjertesengeleje. Lægen tilser, ordinerer i.v. antibiotika.

### 2.3.2 Øvelser

1. **Omskriv objektivt:** “Hun trak vejret helt forfærdeligt og så virkelig dårlig ud.”
2. **Omskriv:** “Gav hende noget ilt og det hjalp lidt på iltningen.”
3. **Udfyld:** “SAT 86 % \_\_\_\_\_ atmosfærisk luft; stiger til 90 % \_\_\_\_\_ 1 l ilt.”
4. **Udfyld verbet:** “Salbutamol inhalation \_\_\_\_\_ efter ordination.”
5. **Find vurderingen:** “RF 28. Pt. er lidt en pivot type. SAT 86 % på atm. luft. Pibende expiration.”

### 2.3.3 Facit

1. RF 28, anstrengt respiration med brug af hjælpemuskler, taler i korte sætninger, let central cyanose.
2. Ilt 1 l/min ordineret på næsekateter; SAT stiger fra 86 % til 90 %.
3. **på ... på** (“på atmosfærisk luft” / “på 1 l ilt”).
4. **administreret** (sygeplejersken giver inhalationen).
5. “Pt. er lidt en pivot type” — en nedladende, personlig vurdering.

## 3 Smerte & neuro

Denne dag handler om smerte og neurologiske observationer: at beskrive smertens kvalitet, placering og intensitet (VAS), og at vurdere bevidsthed, pupiller og orientering objektivt. Kernen er at skelne **patientens udsagn** fra **dine observationer**.

### 3.1 Ordforråd

#### 3.1.1 Substantiver

| Dansk                           | Ordklasse | English                           | Eksempel                                                     |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| smerte                          | subst.    | <i>pain</i>                       | Pt. angiver en jagende smerte i højre side.                  |
| VAS-skala                       | subst.    | <i>VAS (pain) scale</i>           | Smerten angives til VAS 6 ud af 10.                          |
| udstråling                      | subst.    | <i>radiation of pain</i>          | Smerten har udstråling til venstre arm.                      |
| smertestillende /<br>analgetika | subst.    | <i>analgesic</i>                  | Pt. får fast smertestillende og p.n. ved gennembrudssmerter. |
| bevidsthedsniveau               | subst.    | <i>level of<br/>consciousness</i> | Faldende bevidsthedsniveau siden morgen.                     |
| GCS                             | subst.    | <i>Glasgow Coma Scale</i>         | GCS 14 (E4 V4 M6).                                           |
| pupil                           | subst.    | <i>pupil</i>                      | Pupiller sidelige og reagerer prompt på lys.                 |
| orientering                     | subst.    | <i>orientation</i>                | Pt. er orienteret i tid, sted og person.                     |
| hovedpine                       | subst.    | <i>headache</i>                   | Pulserende hovedpine i venstre tinding.                      |
| svimmelhed                      | subst.    | <i>dizziness</i>                  | Svimmelhed ved rejsning (ortostatisk).                       |
| kvalme                          | subst.    | <i>nausea</i>                     | Kvalme ledsaget af en enkelt opkastning.                     |
| lammelse / parese               | subst.    | <i>paralysis / paresis</i>        | Begyndende højresidig parese i ansigt og arm.                |
| kramper                         | subst.    | <i>seizures</i>                   | Observeret et generaliseret krampeanfald på ca. 40 sek.      |
| apopleksi                       | subst.    | <i>stroke</i>                     | Pludselig lammelse rejser mistanke om apopleksi.             |

#### 3.1.2 Verber

| Dansk                      | Ordklasse | English                  | Eksempel                                   |
|----------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------|
| at angive (smerte)         | verbum    | <i>to report / state</i> | Pt. angiver smerte svarende til VAS 6/10.  |
| at lindre                  | verbum    | <i>to relieve</i>        | Smerten lindres til VAS 2/10 efter morfin. |
| at vurdere<br>(bevidsthed) | verbum    | <i>to assess</i>         | Bevidsthedsniveauet vurderes med GCS.      |

| Dansk                      | Ordklasse | English               | Eksempel                                         |
|----------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| at reagere                 | verbum    | <i>to respond</i>     | Pt. reagerer på tiltale, men er sløv.            |
| at orientere sig           | verbum    | <i>to be oriented</i> | Pt. kan ikke orientere sig i tid og sted.        |
| at udstråle                | verbum    | <i>to radiate</i>     | Smerten udstråler til kæben.                     |
| at observere<br>(pupiller) | verbum    | <i>to observe</i>     | Pupilresponsen observeres hver 15. minut.        |
| at administrere            | verbum    | <i>to administer</i>  | Morfin 5 mg administreret s.c. efter ordination. |

### 3.1.3 Adjektiver

| Dansk                         | Ordklasse | English                            | Eksempel                                      |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| skarp / jagende               | adjektiv  | <i>sharp / stabbing</i>            | En skarp, jagende smerte ved bevægelse.       |
| dump                          | adjektiv  | <i>dull</i>                        | En dump smerte i lænden.                      |
| murrende                      | adjektiv  | <i>aching / nagging</i>            | Et murrende ubehag hele dagen.                |
| brændende                     | adjektiv  | <i>burning</i>                     | En brændende smerte langs nerven.             |
| pulserende                    | adjektiv  | <i>throbbing</i>                   | Pulserende hovedpine, forværret af lys.       |
| konstant /<br>intermitterende | adjektiv  | <i>constant /<br/>intermittent</i> | Smerten er intermitterende, i anfald.         |
| vågen / klar                  | adjektiv  | <i>awake / alert</i>               | Pt. er vågen og klar ved kontakt.             |
| sløv / somnolent              | adjektiv  | <i>drowsy / somnolent</i>          | Pt. er sløv, men vækkelig ved tiltale.        |
| desorienteret                 | adjektiv  | <i>disoriented</i>                 | Pt. er desorienteret i tid og sted.           |
| bevidstløs                    | adjektiv  | <i>unconscious</i>                 | Pt. er bevidstløs og reagerer ikke på smerte. |

## 3.2 Dokumentationssprog

### 3.2.1 Grundregler

1. **Beskriv smerten systematisk:** placering, kvalitet (skarp/dump/brændende), intensitet (VAS), udstråling, forværrende/lindrende faktorer.
2. **Smerte er subjektiv** — skriv “pt. angiver ...”. Gengiv den, vurder ikke om den er “rigtig”.
3. **Bevidsthed** vurderes objektivt: GCS eller AVPU + orientering. Undgå “virker lidt væk”.
4. **Pupiller** dokumenteres objektivt: størrelse, sidelighed, lysreaktion.
5. **Effekt af smertestillende** med før/efter-VAS: “VAS 7/10 → 2/10 efter morfin 5 mg s.c.”.
6. **Ved neurologisk ændring** (parese, konfusion, kramper): beskriv objektivt, notér tidspunkt, orientér lægen.

### 3.2.2 Dårlig vs. god formulering

Pt. har vildt ondt, klager konstant.

Pt. angiver skarp, jagende smerte i højre flanke VAS 8/10 med udstråling mod lysken; forværres ved bevægelse.

#### Hvorfor

Beskriv placering, kvalitet, intensitet (VAS), udstråling og hvad der forværrer i stedet for “vildt ondt”.

Han virker lidt fjern og forvirret i dag.

Pt. er sløv men vækkelig ved tiltale, desorienteret i tid og sted, orienteret i person. GCS 13.

#### Hvorfor

Brug objektive begreber: bevidsthedsniveau, orientering og GCS.

Gav ham smertestillende, hjælp vist.

Morfin 5 mg administreret s.c. kl. 11.20 efter ordination; VAS falder fra 7/10 til 2/10 efter 30 min.

#### Hvorfor

Angiv præparat, dosis, vej, tid, “efter ordination” og den målte effekt (VAS før/efter).

## 3.3 Patientnotat

### 3.3.1 Eksempel — akut modtagelse (hovedpine + neuro)

Pt. 57-årig mand, pludselig kraftig hovedpine debuteret kl. 19.40 (“den værste nogensinde”). Ved tilsyn kl. 19.55: angiver pulserende hovedpine VAS 9/10 i nakke og baghoved, ledsaget af kvalme og en enkelt opkastning. Lyssky. Pt. vågen, orienteret i tid, sted og person, GCS 15. Pupiller sidelige, reagerer prompt på lys. Ingen parese, griber lige kraftigt med begge hænder. BT 168/96, puls 92. Paracetamol 1 g administreret p.o. efter ordination; VAS uændret 9/10 efter 30 min. Lægen tilser akut, ordinerer CT-skanning.

### 3.3.2 Øvelser

1. **Omskriv objektivt:** “Han havde helt vildt ondt i hovedet og var helt fjern.”
2. **Omskriv:** “Gav ham en hovedpinepille men den gjorde ikke noget.”
3. **Udfyld verbet:** “Bevidsthedsniveauet \_\_\_\_\_ med GCS til 15.”
4. **Udfyld:** “Pupiller sidelige og \_\_\_\_\_ prompt på lys.”
5. **Find vurderingen:** “VAS 9/10. Pt. overdriver nok lidt. Pupiller sidelige. GCS 15.”

### 3.3.3 Facit

1. Pt. angiver pulserende hovedpine VAS 9/10 i nakke/baghoved. Pt. vågen, orienteret i tid, sted og person, GCS 15.
2. Paracetamol 1 g administreret p.o. efter ordination; VAS uændret 9/10 efter 30 min.
3. **vurderes.**
4. **reagerer.**
5. “Pt. overdriver nok lidt” — en personlig vurdering af patientens smerte.



## 4 Medicin & ordination

Denne dag samler medicin-sproget: forskellen på at **ordinere** (lægen) og at **administrere** (sygeplejersken), administrationsveje, dosis, fast vs. p.n., bivirkninger og korrekt dokumentation af given medicin.

### 4.1 Ordforråd

#### 4.1.1 Substantiver

| Dansk                 | Ordklasse | English                        | Eksempel                                                  |
|-----------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ordination            | subst.    | <i>order / prescription</i>    | Medicinen gives efter lægens ordination.                  |
| præparat / lægemiddel | subst.    | <i>preparation / drug</i>      | Kontrollér, at det er det rigtige præparat.               |
| dosis                 | subst.    | <i>dose</i>                    | Dosis er 500 mg × 3 dagligt.                              |
| administrationsvej    | subst.    | <i>route of administration</i> | Administrationsvejen er peroral (p.o.).                   |
| tablet / kapsel       | subst.    | <i>tablet / capsule</i>        | Pt. indtager to tabletter med et glas vand.               |
| injektion             | subst.    | <i>injection</i>               | Insulin gives som subkutan injektion.                     |
| infusion              | subst.    | <i>infusion / drip</i>         | Antibiotika gives som i.v. infusion over 30 min.          |
| bivirkning            | subst.    | <i>side effect</i>             | Pt. observeres for bivirkninger som kvalme og svimmelhed. |
| kontraindikation      | subst.    | <i>contraindication</i>        | Kontraindikation pga. kendt penicillinallergi.            |
| p.n.-medicin          | subst.    | <i>PRN / as-needed</i>         | Paracetamol ordineret p.n. ved smerter, maks. × 4.        |
| fast medicin          | subst.    | <i>regular medication</i>      | Den faste medicin gives til morgen kl. 08.                |
| medicinliste (FMK)    | subst.    | <i>medication list</i>         | Ordinationen fremgår af medicinlisten.                    |
| allergi               | subst.    | <i>allergy</i>                 | Kendt allergi over for penicillin.                        |
| gennembrudssmerte     | subst.    | <i>breakthrough pain</i>       | P.n.-morfin gives ved gennembrudssmerte.                  |

#### 4.1.2 Verber

| Dansk           | Ordklasse | English                     | Eksempel                                                 |
|-----------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| at ordinere     | verbum    | <i>to prescribe / order</i> | Lægen ordinerer furosemid 40 mg i.v.                     |
| at administrere | verbum    | <i>to administer</i>        | Sygeplejersken administrerer medicinen efter ordination. |

| Dansk                   | Ordklasse | English                     | Eksempel                                                |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| at dispensere           | verbum    | <i>to dispense</i>          | Medicinen dispenseres til doseringsæske dagen før.      |
| at seponere             | verbum    | <i>to discontinue</i>       | Præparatet seponeres pga. bivirkninger.                 |
| at pausere              | verbum    | <i>to withhold / pause</i>  | Blodtryksmedicinen pauseres ved lavt BT.                |
| at optrappe / nedtrappe | verbum    | <i>to titrate up / down</i> | Dosis nedtrappes gradvist over en uge.                  |
| at indtage              | verbum    | <i>to take (orally)</i>     | Pt. indtager tabletten selv.                            |
| at injicere             | verbum    | <i>to inject</i>            | Insulinen injiceres subkutant i maveskindet.            |
| at dobbeltkontrollere   | verbum    | <i>to double-check</i>      | Risikomedicin dobbeltkontrolleres af to sygeplejersker. |
| at observere            | verbum    | <i>to monitor</i>           | Pt. observeres for bivirkninger efter første dosis.     |

### 4.1.3 Adjektiver / administrationsveje

| Dansk                | Ordklasse | English                    | Eksempel                                        |
|----------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| peroral (p.o.)       | adjektiv  | <i>oral</i>                | Tabletten gives peroralt.                       |
| intravenøs (i.v.)    | adjektiv  | <i>intravenous</i>         | Antibiotika gives intravenøst.                  |
| intramuskulær (i.m.) | adjektiv  | <i>intramuscular</i>       | Vaccinen gives intramuskulært i overarmen.      |
| subkutan (s.c.)      | adjektiv  | <i>subcutaneous</i>        | Morfin 5 mg gives subkutant.                    |
| sublingual           | adjektiv  | <i>sublingual</i>          | Nitroglycerin gives sublingualt.                |
| transdermal          | adjektiv  | <i>transdermal</i>         | Smertestillende gives som transdermalt plaster. |
| fast / p.n.          | adjektiv  | <i>regular / as-needed</i> | Skeln mellem fast medicin og p.n.-medicin.      |
| receptpligtig        | adjektiv  | <i>prescription-only</i>   | Præparatet er receptpligtigt.                   |

## 4.2 Dokumentationssprog

### 4.2.1 Grundregler

1. **Skeln skarpt:** LÆGEN ordinerer, SYGEPLEJERSKEN administrerer. Aldrig “gav bare medicinen”.
2. **Dokumentér altid:** præparat, dosis, administrationsvej, tidspunkt og “efter ordination”.
3. **Følg “de rigtige”:** rigtige patient, præparat, dosis, tid, vej — + dokumentation og virkning.
4. **Dokumentér virkning OG bivirkning:** “VAS 7→2 efter 30 min; ingen kvalme observeret”.
5. **Ved p.n.:** notér indikationen (“p.n. ved smerte VAS  $\geq$  4”) og at maksimum ikke overskrides.
6. **Hvis medicin IKKE gives:** dokumentér hvorfor (pauseret/afvist/faste) — et tomt felt er ikke dokumentation.

### 4.2.2 Dårlig vs. god formulering

Gav ham hans piller som altid.

Fast morgenmedicin administreret p.o. kl. 08.00 efter ordination: metoprolol 50 mg, atorvastatin 40 mg.

#### Hvorfor

Angiv præparat(er), dosis, vej, tid og “efter ordination” — “pillerne som altid” er ikke dokumentation.

Smertestillende p.n. — gav noget morfin.

Morfin 5 mg administreret s.c. p.n. ved gennembrudssmerte (VAS 8/10) kl. 13.40 efter ordination; VAS 3/10 efter 30 min., inden for maks.

#### Hvorfor

Ved p.n. skal indikation, dosis, vej, tid, effekt og overholdt maksimum fremgå.

Han ville ikke tage sin medicin.

Pt. afviser aftenmedicin kl. 20; angiver kvalme. Informeret om formålet. Medicin ikke givet, lægen orienteret.

#### Hvorfor

Ved afvisning: dokumentér handlingen, patientens begrundelse i egne ord, din information og at lægen er orienteret.

## 4.3 Patientnotat

### 4.3.1 Eksempel — medicinadministration, medicinsk afdeling

Medicingivning morgen kl. 08.00: Fast medicin administreret p.o. efter ordination — metoprolol 50 mg, atorvastatin 40 mg, pantoprazol 40 mg. Identitet kontrolleret mod medicinlisten. BT før metoprolol 138/84, puls 76, derfor givet. Insulin (Novorapid 8 IE) administreret subkutan efter ordination, dobbeltkontrolleret af kollega. Kl. 13.40: Pt. angiver gennembrudssmerte VAS 8/10; morfin 5 mg administreret s.c. p.n. efter ordination; VAS 3/10 efter

30 min., ingen respirationspåvirkning. Amlodipin pauseret til aften pga. BT 96/58 efter aftale med lægen; genoptages ved systolisk BT > 110. Pt. observeret for bivirkninger, ingen bemærket.

### 4.3.2 Øvelser

1. **Omskriv fagligt:** “Gav ham hans sædvanlige morgenpiller.”
2. **Omskriv:** “Han havde ondt, så jeg gav lidt morfin, det hjalp.”
3. **Udfyld verberne:** “Lægen \_\_\_\_\_ furosemid 40 mg i.v.; sygeplejersken \_\_\_\_\_ det efter ordination.”
4. **Udfyld:** “Amlodipin \_\_\_\_\_ til aften pga. BT 96/58 efter aftale med lægen.”
5. **Find fejlen:** “Gav noget vanddrivende. Virkede vist. Pt. lidt besværlig.”

### 4.3.3 Facit

1. Fast morgenmedicin administreret p.o. efter ordination kl. 08.00: metoprolol 50 mg, atorvastatin 40 mg, pantoprazol 40 mg.
2. Pt. angiver gennembrudssmerte VAS 8/10; morfin 5 mg administreret s.c. p.n. efter ordination; VAS 3/10 efter 30 min.
3. **ordinerer ... administrerer.**
4. **pauseret.**
5. Mangler præparat/dosis/vej/tid/“efter ordination” og målt effekt; desuden er “lidt besværlig” en personlig vurdering.

---

Sådan tilføjes en ny dag: kopiér et kapitel, ret systemet, og genbrug de fire sektioner (ordforråd, dokumentation, patientnotat, øvelser). Web-appens datafil `assets/data/dagN_...js` og kapitlet holdes med samme indhold.