



Información del Paciente

| | | | |
|-------------|--|-----------------|--|
| Paciente | | Sexo | |
| Paciente ID | | Fecha de Examen | |
| Nacido el | | | |

MAPA



Sim-K

| K1 | K2 | CYL |
|-----------|------------|-------------|
| 7.70 @ 0° | 7.58 @ 90° | -0.68D ax0° |

| K1 | K2 | CYL |
|------------|-------------|--------------|
| 7.60 @ 12° | 7.49 @ 102° | -0.64D ax12° |

Datos Córnea

| | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------|
| Descentrado Córnea | X= -0.38 mm | Y= -0.37 mm |
| Diámetro | 11.65 mm | |
| Decentramiento Pupilar | H= -0.11 mm | V= -0.10 mm |
| Diam. Pup. Med. | 3.56 mm | |
| Potencia Pupila | 4.5mm: 44.22 D / 3mm: 44.27 D | |

| | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------|
| Descentrado Córnea | X= 0.38 mm | Y= -0.39 mm |
| Diámetro | 11.72 mm | |
| Decentramiento Pupilar | H= 0.07 mm | V= -0.01 mm |
| Diam. Pup. Med. | 3.29 mm | |
| Potencia Pupila | 4.5mm: 44.63 D / 3mm: 44.62 D | |

Exploración del Queratocono

| AK | AGC | SI | Kpi |
|--|-----------|-----------|-----|
| 46.32 D | 1.22 D/mm | 0.11 D | 0% |
| Topografía no compatible con queratocono | | | |
| A | D | Ro - Teta | Rnd |
| | | | |

| AK | AGC | SI | Kpi |
|--|-----------|-----------|-----|
| 45.73 D | 0.79 D/mm | -0.15 D | 0% |
| Topografía no compatible con queratocono | | | |
| A | D | Ro - Teta | Rnd |
| | | | |

Indices Queratorrefractivos

| SD | SAI | Asph. | Kc |
|-------------|--------------|----------|---------|
| SD = 0.57 D | SAI = 0.34 D | e = 0.20 | 44.50 D |

| SD | SAI | Asph. | Kc |
|-------------|--------------|----------|---------|
| SD = 0.55 D | SAI = 0.22 D | e = 0.46 | 44.49 D |

Apuntes