

ANEXO V

PARTE ANESTÉSICO

Htal. Z. Gral. Dr. Posadas — Saladillo

Servicio de Anestesia

Parte de Anestesia

Fecha: 27/08/26

Historia Clínica o DNI: 12.345.678

Apellido y Nombre: PACIENTE DE DEMOSTRACIÓN

Sexo: (M) - F Edad: 34 Peso: 78 kg

Diagnóstico: Apendicitis aguda

Operación Propuesta: Apendicectomía laparoscópica

Cód.: 07.06.02

ASA: 1-2-(3)-4-5-(E)

Anestesiólogo(s): Dr. Demo

Hora de ingreso: 08:00

Hora de finalización: 09:45

Quirófano: 1

Condición al Ingreso:

Lúcido, hemodinámicamente estable, afebril.

Vías de Ingreso

☒ VP ☐ VC ☐ VCP ☐ V. Arterial ☐ SNG ☐ S. Vesical

Antecedentes Patológicos Condicionantes:

Sin antecedentes patológicos de relevancia. Niega alergias.

Monitoreo según Normas FAAAAR ☒ Protección Ocular ☒ Protección Decúbitos ☒ Refiere ayuno de (hs): 8 hs

Premedicación: Midazolam 2 mg IV.

Decúbito dorsal

Inducción: Propofol 150 mg + Fentanilo 150 µg + Rocuronio 50 mg IV. Laringoscopia directa Cormack I, intubación orotraqueal sin dificultad.

Hora		08:00			08:15			08:30			08:45			09:00			09:15			09:30			Total
Sol. Fisiológica								500											500			1.000	
Total ingresos																						1.000	
Diuresis																						200	
Balance																						+800	
Sev %			2/2,3	2/2,3	2,1/2,4	2,1/2,4	2,1/2,4	2,1/2,4	2,1/2,4	2/2,3	2/2,3	1,9/2,2	1,9/2,2	1,8/2,1	1,8/2,1	1,7/2	1,7/2	1,7/2	1,7/2	1,8/2,1	1,9/2,2		
Sat %		97	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98		
pCO2			35	35		36	36	36	36	35	35	34	34	33	33	32	32	32	32	32	33	34	
Claves: X Anestesia O Operación TA (TAS-TAD) (N° = PAM) FC SpO2 etCO2 Sev% Et/Fi al pie																							
PROCESOS	Fentanilo	150													50							200	
	Propofol	150																				150	
	Rocuronio	50																				50	
	Remifentanilo	0,25													0,15					0,1		1,66 mg	
	Dexmedetomidina	0,5																				0,07 mg	
	Cefazolina			2																			2
	Dipirona																2						2
Ondansetrón																		4				4	

Eventos: 08:04 Intubación orotraqueal 09:43 Extubación

Bloqueos: ☐ Peridural ☐ Raquídeo ☐ Plexual ☐ PeriféricoAntiséptico con: ☐ Povidona ☐ Alcohol yodado

Zona de punción: Calibre aguja:

Mat. utilizado: ☐ Caja Hospital ☐ Set Descartable ☐ Látex Lote:

Agente anestésico: Dosis:

Cantidad inyectada (cc): Dosis total:

Reinyecciones:

Catéter SÍ/NO Dosis prueba SÍ/NO

Vía aérea — Tubo: ☒ Oral ☐ Nasal ☐ Máscara Laríngea N°: 7.5

Dificultad SÍ/(NO) Otros tubos:

Respiración: Suplemento de O2: ☐ Máscara ☐ BigoteraRespiración: ☐ Espontánea ☐ Asistida ☒ ControladaComandada: ☐ Manual ☒ Mecánica Sistema: ☐ Lineal ☒ Circular

FGF: 2 L/min PEEP: 5 FiO2: 50 %

Vol. Corriente: 499 ml Frec. Resp.: 12 /min PIP:

17

Estado del paciente al finalizar la anestesia: Actividad: 2 Respiración: 2 Circulación: 2 Conciencia: 2 Saturación:

2 Aldrete: 10

Destino: Pasa a: ☐ Sala General ☒ Recuperación ☐ UCI Requiere O2 con máscara SÍ/(NO)

(Marcar lo que corresponda) Firma Dr. Demo

MP/MN: MP 12345

Conste que una copia fiel de este parte se halla archivada en el Servicio.