

A.a. 2014-2015

Simulazione di uno spettrometro per il decadimento $K_S^0 \rightarrow \pi^+ \pi^-$

Studente:

Federico MASSA

Docente:

Sergio GIUDICI

1. Introduzione

Il presente progetto consiste nella simulazione di uno spettrometro per la ricostruzione dell'impulso di un fascio puro di K^0 di impulso $100 \pm 5 \text{ GeV}$, distribuito gaussianamente.

!!!!!!!!!!!!NOTA: NON CONSIDERIAMO L'IMPURITÀ DI KL, MA QUANTO AVREBBE INFLUITO ALLA DISTANZA Z1 SCELTA?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MAGARI SCRIVERE NELLE CONCLUSIONI, COME LIMITI DELLA SIMULAZIONE

Scopo del progetto è quello di misurare la risoluzione del suddetto spettrometro al variare della tecnica di ricostruzione utilizzata e del numero di rivelatori utilizzati nell'apparato sperimentale (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E DEL RAGGIO INTERNO?!!!!!!!!!!!!!!). Ai fini della simulazione è stato considerato solamente il decadimento del $K_S^0 \rightarrow \pi^+\pi^-$.

Il codice utilizzato è stato scritto interamente in C++, con l'ausilio delle librerie ROOT del CERN per la visualizzazione e il salvataggio in memoria dei dati.

2. Apparato sperimentale simulato

L'apparato simulato, nella sua versione normale, appare come in Fig. 1, 2.

Ogni piano di rivelatore è modellizzato da una corona circolare di raggio interno R_{int} e raggio esterno R_{ext} , con risoluzione fissa sugli assi x e y di 1 mm^1 . Sebbene quest'ultimo sia importante a livello pratico nel disegno del rivelatore, ai fini di questa simulazione questo sarà sempre considerabile infinito, poiché scelto in modo tale da contenere l'interesse dei decadimenti. La scelta del raggio interno è invece soggetta a differenti necessità, che saranno discusse più avanti (Sez. ??!!!!!!!!!!!!!!). Il campo magnetico è situato in una zona di 0.35 m al centro tra i piani 2 e 3, che distano tra loro 3 m e vale $B = 1 \text{ T}$. Il p_{kick} corrispondente vale quindi circa $p_k = qB\Delta L = 105 \text{ MeV}/c$. La modellizzazione dell'effetto di un magnete come un kick effettuato nel punto medio tra i rivelatori sarà giustificata in sez.?? !!!!!!!!!!! In Tab.1 sono riassunte le caratteristiche scelte per l'apparato e la lunghezza media di decadimento, con $\langle \lambda \rangle = \frac{\langle p \rangle}{M_K} c\tau$, $\tau = 8.954 \cdot 10^{-11} \text{ s}$.

¹Come si vedrà in Sez.??, la risposta del rivelatore è assunta gaussiana e la risoluzione indicata è dunque uguale alla deviazione standard di questa distribuzione.




Figure 1: Riproduzione 3D dell'apparato sperimentale: con \vec{B} è indicato il vettore del campo magnetico, nella direzione positiva delle x .




Figure 2: Sezione dell'apparato sperimentale: in viola lungo l'asse z , la traccia del K^0 genitore, in blu e rosso rispettivamente le tracce delle particelle decadute π^+ e π^- . Il campo magnetico, nella direzione positiva delle x , è uscente perpendicolarmente dal piano della figura. Con z_i sono indicate le coordinate z dei quattro piani di rivelatore. Con R_{int} , invece, il raggio interno del rivelatore più vicino.

$\langle \lambda \rangle (\mathbf{m})$	5.4
$\mathbf{z}_1 (\mathbf{m})$	50
$\mathbf{z}_2 (\mathbf{m})$	60
$\mathbf{z}_3 (\mathbf{m})$	63
$\mathbf{z}_4 (\mathbf{m})$	73
$\mathbf{R}_{\text{int}} (\mathbf{m})$	0.1
$\mathbf{p}_k (MeV/c)$	105
$\mathbf{B} (T)$	1
$\Delta \mathbf{L} (m)$	0.35
$\sigma_{\mathbf{x}} (m)$	0.001

Table 1: Tabella riassuntiva delle caratteristiche dell'apparato sperimentale.