

09. INFLUENCE DE LA PLICATURE DE L'EMBRYON SUR LE TUBE DIGESTIF SUP

DURÉE : 05:28

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo plonge dans l'impact crucial de la plicature de l'embryon sur le développement du tube digestif supérieur. Elle illustre comment la flexion de l'embryon influence le mésenchyme et crée la base du crâne, tout en mettant en lumière l'organisation des structures comme le tube neural, le cœur et le système vasculaire. Les termes clés tels que la cavité amniotique, la notochorde et le foregut sont abordés pour démontrer leur rôle dans la formation du tube digestif, reliant ainsi le développement des organes à la dynamique vitale du liquide amniotique. Une approche à la fois théorique et pratique, essentielle pour tout thérapeute désireux de comprendre les subtilités du développement embryonnaire.


INFLUENCE DE LA PLICATURE DE L'EMBRYON SUR LE TUBE DIGESTIF SUPÉRIEUR

L'**importance de la plicature** de l'embryon se manifeste au niveau de la partie supérieure de l'intestin. Ce mouvement de **flexion** de l'embryon entraîne des modifications significatives dans son développement.

Lors de la plicature, le **mésenchyme**, qui est le tissu mésenchymal sous les encéphales, devient perpendiculaire à l'axe longitudinal de l'embryon. Ce mouvement crée une belle courbure, entraînant une **compression** entre l'avant et l'arrière, ce qui contribue à la formation de la base du crâne. Ce processus dynamique génère un **champ cartilagineux** qui, au départ lâche, se densifie progressivement pour former des **cartilages primitifs** comprimés, libérant ainsi une forte énergie.

La **cavité amniotique** et la **cavité viteline** jouent un rôle crucial dans ce développement. Au fur et à mesure que l'embryon se plie, la cavité viteline se déplace et le tube neural commence à s'enrouler. La zone cardiaque, initialement en avant, est également influencée par ce mouvement de flexion.

L'étude de ce mouvement se fait de la périphérie vers l'intérieur, de la face visible, comme la bouche, jusqu'à l'intestin pharyngien.



Bourgeon du goût

Ce mouvement de flexion organise la **particularité de la face**. La **notochorde** induit le tube neural et les artères, tandis que l'enroulement autour du système artériel s'organise.

La partie supérieure de l'intestin se forme comme une **articulation** entre le cœur et le cerveau. Le **foregut** apparaît, représentant l'intestin supérieur en développement. Cette articulation est orientée et organisée dans l'espace-temps par le **liquide amniotique**, avec le système vasculaire comme point d'appui.

Le cœur, visible en position élevée, et l'enroulement des structures embryonnaires illustrent cette articulation.




Schéma explicatif

Schéma explicatif

Plus le développement progresse, plus l'organisation se renforce. Le grand sac vitellin et son vestige se forment, tandis que la partie supérieure s'organise à travers des mouvements de flexion.

La **cavité amniotique** et le cœur créent un espace qui devient une articulation entre le cœur et le cerveau, propulsée par la croissance amniotique. Ce processus marque le début de la formation du tube digestif, qui s'organise sur un plan longitudinal. La délimitation de la partie supérieure de l'intestin commence, intégrant l'**allontoïde** et la **membrane cloacale**.

Entre cette membrane et la membrane pharyngienne, les bouches au niveau buccal se développent.




Tube digestif embryonnaire


Cette articulation entre le cerveau, le sac amniotique et le cœur est organisée par la vitesse de croissance différentielle du système vasculaire, établissant un équilibre entre le cerveau et le cœur, orienté par le **mésoderme**.

L'apparition d'un vaisseau dépend de divers composants : un champ, une concentration métabolique, une trajectoire, des **vacuolations** et la présence de particules interstitielles. Ces éléments sont dynamiques, ce qui explique pourquoi certains vaisseaux peuvent apparaître et disparaître au cours du développement embryonnaire. Au départ, deux grandes aortes se centrent en une seule aorte.

L'influence de cette plicature est donc essentielle pour organiser la **délimitation interne** du tube digestif. Nous allons maintenant entrer dans les détails de ce processus.




Cerveau embryonnaire humain




Embryon humain sagittal



Formation de la notochorde



Embryon humain sagital



Embryon vascularisé



Schéma explicatif

Schéma explicatif