

07. CHRONOLOGIE, CROISSANCE, SYNCHRONICITÉS

DURÉE : 03:59

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo, nous explorons les concepts essentiels de l'Embryologie Biodynamique, en insistant sur la chronologie du développement embryonnaire, allant des premières étapes de la conception aux transformations majeures du deuxième mois. Nous faisons la distinction entre motilité, intrinsèque au tissu, et mobilité, liée à la respiration, soulignant l'importance de traiter l'environnement plutôt que les seuls organes. Des notions de puissance dans le tissu et l'importance du diaphragme sont également abordées, offrant aux thérapeutes des outils pour travailler efficacement avec le mouvement et la croissance embryonnaires.

L'EMBRYOLOGIE BIODYNAMIQUE : CHRONOLOGIE, CROISSANCE, SYNCHRONICITÉS

DÉFINIR L'EMBRYON : JOURS, CARNEGIE ET CROISSANCE

Pour comprendre l'**embryon**, nous pouvons le définir en termes de **jours** ou selon les **stades de Carnegie**. Dans ce cours, nous nous concentrerons sur les jours.

Lorsque des phénomènes **synchronisés** se produisent, comme la fermeture des **neuroports** ou l'intégration des **cœlomes**, nous vous donnerons des points précis dans le temps, par exemple au moment de la prise de conscience du **cœur**. Sinon, nous parlerons en jours ou en semaines, et nous aborderons également des notions de **taille**.

Ce qui est vraiment important pour vous, c'est la notion de **croissance**. Il faut comprendre que l'embryon est un **mouvement développemental**. C'est un mouvement qui se développe de l'intérieur vers l'extérieur, et non l'inverse.

MOTILITÉ ET MOBILITÉ : DEUX MOUVEMENTS DISTINCTS

C'est là la différence fondamentale entre ce que nous appelons la **motilité** et la **mobilité** :

- **La motilité** est une réponse embryonnaire. Elle suit le mouvement du développement intrinsèque du tissu.

- **La mobilité** est un mouvement purement lié à la respiration et à la motricité.

Il est crucial de bien faire cette distinction. Lorsque je bouge mon bras, c'est très différent du mouvement intrinsèque au niveau de mon **foie**.

Si je veux retravailler un tissu, je le ramène dans sa motilité. C'est là que réside sa **force fonctionnelle**, là où il va se réorganiser. C'est le travail que nous faisons : revenir dans ce tissu pour qu'il puisse se réorganiser et retrouver sa mobilité.

Il s'agit toujours de suivre le mouvement, mais pour cela, il faut des **points d'appui** et avoir le mouvement dans la main.

TRAITER L'ENVIRONNEMENT, PAS SEULEMENT L'ORGANE

Je ne traite pas un **organe**, je traite un **environnement**. Cependant, mon action peut parfois influencer la mobilité et la motricité.

Dans le cadre de la mobilité, le maître est le **diaphragme**. C'est pourquoi nous allons apprendre comment ce diaphragme se construit.

LA PUISSANCE DU TISSU : UNE RÉVÉLATION

Un jour, mon enseignant m'a dit : "Marc, un jour tu vas sentir la **puissance** dans le tissu." Pour moi, cette puissance était très intellectuelle. Je pouvais comprendre qu'un embryon qui se développe représente une puissance incroyable, un mouvement qui ne s'arrête jamais.

Il m'a aussi dit que parfois, dans les **"stillness"** (les moments d'immobilité), dans certains points d'appui, cette puissance est également présente. Elle est incroyable, et à ce moment-là, quelque chose se passe. Cependant, on ne peut pas créer cela tout le temps. Il faut essayer de se mettre en présence, d'avoir une bonne connexion, et à un moment donné, le système s'ajuste.

Il m'a donné une image : "C'est comme si tu étais sur une petite barque dans la mer. Tu es juste dans l'eau, et tu ne la vois pas, mais en dessous de toi, une **baleine** arrive. Et tu sens, tu sens tout d'un coup, c'est un peu cette sensation-là."


DE L'OVULE AU DEUXIÈME MOIS : UNE TRANSFORMATION INCROYABLE

Regardez ce que nous sommes au premier jour : un petit **bazar**. Et regardez ce qui va se passer à la fin du **deuxième mois**. En seulement deux mois, une transformation incroyable a lieu.

Dès le début du **vingtième jour**, une forme commence déjà à se dessiner. Le potentiel de vie est là.

Au départ, c'est simplement un **ovule** qui a reçu le patrimoine génétique du père, le **spermatozoïde**. Les deux patrimoines sont en train de se rencontrer. C'est à peu près la première image de votre vie.


Nous observons alors ce qu'on appelle la **zone pellucida** et des **cellules nourricières**. Il y a plusieurs couches de cellules importantes qui se mettent en place.



Développement utérin fœtal

Carnegie Stages of Human Development

Dr Mark Hill, Cell Biology Lab, School of Medical Sciences (Anatomy), UNSW




Acknowledgements


Special thanks to Dr S. J. DiMarzo and Prof. Kohei Shiota for allowing reproduction of their research images and material from the Kyoto Collection and Ms B. Hill for image preparation.

© M.A. Hill, 2004

Développement embryonnaire humain



Embryon neurulation sagittale



Embryon, 6-7 semaines