

Le volume de la cellule est très important pour un ovocyte et très petit pour un spermatozoïde. On peut dire que l'ovule, il est en dilatation, il est complètement en ouverture, il est complètement, ce qu'on appelle en extension, il est ouvert. Tandis que le spermatozoïde, lui, il est en rotation interne, il est desséché, il est momifié. Par contre, la concentration en DNA est très importante pour les spermatozoïdes, en ADN. La mobilité, par contre, de l'ovocyte, l'espermatozoïde, qui est complètement arrêté, le nombre de cellules produites est d'environ 400. C'est que les ovocytes primaires, qui sont construits pendant la période fœtale, quand vous étiez dans le ventre de votre maman, vous étiez déjà occupé à fabriquer vos propres ovocytes. Les cellules nourricières et les cellules folliculaires. Je vous ai dit, une est de la lignée germinale, l'autre est de la lignée somatique. Donc l'une est transmise par le développement et l'autre est donnée par la mère. Ils vont donner des axes. Ça veut dire que c'est un chemin, déjà, pour faire passer des informations sur le plan génétique, de type épigénétique, de formation transgénérationnelle. Les ovaires ont besoin d'être à l'intérieur parce qu'il faut qu'ils soient chauffés. Tandis que les testicules, elles sont descendues en bas parce qu'il faut qu'ils passent un peu plus frais. C'est important quand on a des femmes qui viennent et qui ont des problèmes de fertilité, parfois quand vous travaillez au niveau du sacrum, vous pouvez sentir un froid. Ça peut être un problème, là on en parlera, vis-à-vis du diodénome, vis-à-vis des artères et des, ce qu'on appelle des plicas, des fossettes de repli au niveau du diodénome qui font passer l'information trophique via le système artériel, entre autres via les systèmes des artères ovariennes ou testiculaires, tout dépendra, où la fertilité doit se traiter beaucoup plus haut sur le cadre du pentagone facial du pancréas.