

Entre la cavité amniotique et la cavité vitéline, ce mouvement de vague, tu avais précisé, tu avais dit Oui, d'accord, d'accord. mouvement de la cavité amniotique vers l'avant, mouvement de la cavité vitéline vers l'arrière, mais par rapport à quoi ? Par rapport au pédicule ? Par rapport au pédicule. Et est-ce que ce mouvement, il est dans l'orientation du pays ? C'est à un moment donné l'impulse, le mouvement de ma cavité amniotique qui part vers l'avant, le visicilité ligne qui pousse à ce moment-là en fait moins vite, donne l'impression de partir en arrière. Et ce mouvement crée une vague ici, un début de S. Ça c'est ma phase 1. C'est lié au mouvement de perméation, parméation, infusion, qui sont des façons de diffuser l'information. C'est un apport trophique, qui est un substrat métabolique qui arrive. Ici, je reste le long de la membrane, je suis en parméation. J'envoie entre les cellules, perméation. De temps en temps, je viens nourrir un peu mon appareil. Et cette nourriture, ça veut dire que c'est un mouvement. Mais la force, au départ, sera beaucoup plus vers l'appareil. C'est une partie supérieure, de par déjà sa position d'origine antérieure. C'est-à-dire, au moment de la nidation, c'est là où on peut dire que, au moment où je rentre dans la muqueuse, les cellules qui font partie du bouton embryonnaire, vont être les premières à recevoir l'information trophique ici. Elles sont déjà prédisposées à se développer plus vite. Elles sont beaucoup plus centrées, beaucoup plus petites déjà, tu vois. Et donc, elles attirent plus d'informations. C'est de nouveau une polarité.