

L'origine de cette asymétrie se fait quand tu as le mouvement du processus notocordal. Ce qui va faire qu'il va y avoir ici un nœud qu'on appelle le nœud d'Ensens. On le retrouve une autre image de ce nœud, c'est ici. Maintenant, qui est ici en bas, on va retrouver une autre image. Il est ici maintenant, tu vois, là. C'est ce mouvement, ce qu'on appelle la ola de la formation de cet axe notocordal. Vous vous souvenez ? Si je rentre maintenant à l'intérieur, qu'est-ce que je vois ? Je vois que sur cette structure, il y a à l'intérieur, il y a des microcynes. C'est grâce au syndrome de cathargénaire que des Japonais ont découvert le système. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un trouble chaque fois de latéralité. Des gens qui développaient le cœur à droite au lieu d'à gauche. Ils ont commencé à rechercher où est-ce qu'ils ont trouvé pour la première fois ces petits cils. Dans la vie, dans le corps, il y a beaucoup ces petits cils. Les spermatozoïdes ont ces petits cils. Dans l'utérus et dans les trompes, il y a ces petits cils. Dans les bronches, il y a ces petits cils, etc. Pour la première fois, ils ont découvert dans la partie du nœud d'Ensens. À l'intérieur, ils ont observé qu'il y avait des petits cils aussi. Mais qu'ils ne faisaient pas un mouvement de va-et-vient, mais un mouvement rotatoire. Tu vois, il y a des petits cils ici. Vous imaginez ici que ça, c'est le nœud d'Ensens qui se déplace, qui est ici. Et juste à côté, il y a ces petits cils. Et chaque fois, c'est des cellules. Et puis, il y a comme une petite neige de tissu qu'on appelle. Des petites vésicules, tu vois, qu'on appelle des vésicules ici, qui se concentrent ici. Et puis, il y a ces petits cils qui tournent. Et en fait, ils sont inclinés à 60 degrés. Et au moment où ils tournent, ils ont une accélération quand ils sont loin de la lumière de la partie inférieure. Ça fait un mouvement comme ceci. Donc, ça concentre ces petites molécules d'un côté, qui sont poussées sur le côté gauche de l'embryon. Ces petites vésicules éclatent et libèrent une nouvelle petite neige subtile de molécules pré-morphogénétiques, qui fait que tu as une asymétrie intérieure qui se développera. Le

cœur va se développer plus sur la gauche, le foie, etc. Et ça va développer toute cette asymétrie. Dans ton corps, à l'extérieur, tu parais plutôt symétrique, mais à l'intérieur, tu as une grande asymétrie. Que ce soit sur le plan cérébral, oculaire, etc., jusque dans tout ton corps. C'est un axe qui se prend entre ton sacrum et ta base du crâne. C'est la coulée de l'asymétrie de ton embryon. Donc, son organisation de latéralité. Tu as une cascade de ces petites molécules qui vont libérer des protéines spécifiques qu'on appelle la sonotique HETCH, des gènes spécifiques avec du zinc, etc., qui vont activer d'un côté ce qu'on appelle le système de la corrompté et de l'hypercalcium. Et cette activité calcique, c'est elle qui intervient dans le développement des cellules pour le développement plus rapide d'un côté que de l'autre.