

41. PRATIQUE 2 LE CADRE COLIQUE

DURÉE : 03:23

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Présentation des techniques de redynamisation corporelle post-césarienne, centrées sur le cadre colique et le péritoine. Examen palpatoire de l'abdomen incluant la réponse tissulaire et thermique pour restaurer l'homogénéité fasciale. Analyse du fulcrum terminal, des libérations tissulaires et de l'ajustement dynamique requis après des interventions pelviennes (ex. hystérectomie). Méthodologie clinique pour favoriser une réintégration tissulaire harmonieuse.

PRATIQUE 2 : LE CADRE COLIQUE


Une **césarienne** sectionne le corps entre le haut et le bas, nécessitant une **redynamisation**. L'utérus représente une concentration de **péritoine pariétal postérieur**. Au cours du développement dans le péritoine, il existe une concentration et une puissance qui se recentrent, formant un **fulcrum terminal**. Ce fulcrum est à la fois embryonnaire et final, et il est crucial de les ramener en conscience.

Lors de la palpation, il est essentiel de prendre tout le ventre dans les mains, en gardant les mains bien détendues. Une respiration trop haute peut indiquer une demande de **discrétion**. La **chaleur** ressentie est un échange entre le praticien et le patient, où le tissu commence à donner des informations. Si le tissu se met en défense, la zone inférieure commence à se détendre, tandis que la partie supérieure manque encore d'homogénéité. L'objectif est de retrouver un état homogène.

Lorsque la chaleur augmente, toutes les lignes de force semblent s'orienter vers la zone utérine, comme si le tissu réintégrait son **nid**. Cela aide le patient à revenir dans sa **maison intérieure**, semblable à quelqu'un attaché à sa terre. À ce stade, le praticien peut élargir son contact à l'ensemble du corps, initiant un **processus thérapeutique**. L'intégration vers la zone utérine se renforce, et une plus grande homogénéité se crée entre les mains.

Dans le cas d'une **hystérectomie**, la dynamique corporelle change, et le patient peut développer une **bosse de bison**. Cela nécessite un rééquilibrage dans plusieurs zones. Le travail se concentre sur des points tissulaires, permettant une libération des tissus et un développement synchronisé. Des points d'appui sont essentiels, notamment pour obliger le **diaphragme** à travailler différemment, en cherchant d'autres espaces et ouvertures.

Le praticien peut alors aborder des zones spécifiques comme l'hépatique et le sigmoïdien, permettant une détente complète.



Anatomie du côlon