

31-L'Appareil Génital_ Mise en Place

Le champ de polarité amène le processus notocordal. Ce processus notocordal influence le système neuronal. Ce système neuronal va influencer le système cardiaque, qui lui-même amène, d'une certaine façon, la mise en place sur le niveau diaphragmatique, sur le plan du septum transversal, donc la diaphragmatisation, qui entraîne le développement de mes surrénales. Ça, c'est un mouvement qui se fait ici. Et puis là, ici, il y a le futur développement pour mes surrénales. Par la croissance du foie ici, ça va faire un champ d'aspiration ici. Et ça va créer un espace postérieur ici, dans le péritone parietal postérieur. Et c'est par cette croissance que tu vas voir, au niveau partie postérieure ici, comme un champ d'aspiration qui va donner ces surrénales, qui deviennent très très grandes. Elles sont là parce qu'elles ont cette information génétique aussi. Dans un premier temps, le système urogénital fait qu'il y a des cellules qui sont autour ici de ma vésicule viteline. C'est-à-dire qu'il y a une migration de gonocytes qui viennent de la vésicule viteline et qui viennent, sur cette partie-ci, coloniser ce qu'on appelle la crête génitale, qui est au niveau paroi postérieure. Et ces petits gonocytes viennent faire gonfler cet épithélium, viennent informer cet épithélium par un champ d'aspiration, et cet épithélium qui était là, tout d'un coup, commence à s'épaissir et faire une crête gonadique. Mais au-dessus, sur le côté, j'ai, par le foie et par ce développement, j'ai mes surrénales qui poussent et qui viennent pousser mes gonades sur le côté. Ça, c'est les gonades. Ça, c'est mes surrénales. De part et d'autre, à gauche et à droite. Par ce mouvement développemental, ça vient pousser ici et ça va créer un pli latéral par le mouvement de mes surrénales. Les surrénales qui poussent les gonades, tu vois, ça va créer un pli dans le tissu parce que ça fait comme ceci. Surrénales, les reins, ceux-là, ça, c'est la zone ovarienne, c'est la crête génitale, tu vois, ici. Au départ, cette ligne ici représente ce qu'on appelle le ductus de Muller, une espèce de pli comme ça, dans le péritone

pariétal postérieur. Un pli à gauche et à droite. À ce stade-ci, il n'y a pas de différence encore entre l'homme. Chez la femme, sur un plan structurel, c'est déjà fait au niveau génétique, les surrénales sont plus importantes, plus développées et poussent donc plus fort le mouvement latéral. On voit ici apparaître un pli dans le tissu par ce mouvement. Et cette espèce de pli ici, latéralement, ça va donner les trompes à gauche et à droite. Mais au milieu ici, j'ai la réunion par mon foie qui tire, maintenant dans cette bascule-là, et qui ramène tout comme ça. Et en même temps, je vais avoir mes membres inférieurs qui commencent à sortir ici. Et ça crée donc une ligne ici et un mouvement sur la ligne médiane. Tu vois, ces deux tubes ici viennent se rejoindre comme ça, tu vois. Et la réunion des deux, tirée par le foie, organisée par le foie au-dessus, qui dynamise les surrénales, qui pousse plus fort mes gonates latéraux, et par ce mouvement, crée cette ligne ici. Mais en haut, le foie revient à tirer avec l'ouverture de mes mains en haut ici, vient tirer et la réunion des deux, des deux tubes ici, va former l'utérus. Chez l'homme, la différence, c'est que ce canal, il régresse. Mais en fait, il ne va pas si loin, il ne se fait pas. Tu vois, chez la femme, ça se ferme. Et ça, ça donne quoi ? Ça donne la trompe. Et ici, tu vas voir la gonade qui se développe, qui après, se deviendra l'ovaire et va faire son espace par ici, tu vois, et par ici. L'utérus, c'est du péritoine pariétal postérieur. Tout ça, c'est quoi ? C'est mon grand ligament large, avec des lignes à l'intérieur ici qui seront le ligament ovarien. ou le ligament utérosacré, ou le grand ligament lâche, mais en fait, c'est tout du péritoine pariétal postérieur. Donc premièrement, il y a cette migration. J'ai la crête génitale qui est informée, qui se développe. Cette crête génitale, avec ici les surrénales qui sont là juste avant, elle est reliée au développement du foie. Le développement du foie crée un nouvel espace rétro-péritoneal. Ce champ d'aspiration, parce que c'est une glande, donc c'est un tissu qui est aspiré, comme on avait vu pour

toutes les glandes. Ça vient pousser mes gonades, les reins, ça va faire disparaître le mesonephron. Par contre, ma crête gonadique pousse de plus en plus latéralement, et le système fait ceci, et crée un pli dans le péritone parétal postérieur. Et ce tube, ça va s'appeler le tubercule de Muller. Tandis que le premier niveau qui venait de ce tube collecteur, qu'on appelle le ductus mesonephrotique, ça s'appelle le canal de Wolff. Celui-là, il est déjà là. Il servira de conduit plus tard pour ma crête gonadique, donc futur testicule ou futur ovaire. Avec le ligament suspenseur diaphragmatique, et en bas, le gubernaculum, qui va diriger pour ramener les ovaires dans leur place en fonction de ceci, ou chez l'homme, la ramener jusqu'au niveau du canal inguinal et les passer dans le pantalon.