29. DER GENITALAPPARAT : EINRICHTUNG

DAUER : 05:37 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video befasst sich eingehend mit der Entwicklung des Genitalapparats, wobei der Schwerpunkt auf dem Einfluss der Chorda dorsalis und des Nervensystems auf die Entwicklung der Genitalstrukturen liegt. Zu den Schlüsselkonzepten gehören die Diaphragmatisierung, die Entwicklung der Nebennieren und der Gonaden sowie die dynamische Interaktion zwischen diesen Organen, die die Bildung der Eileiter, der Gebärmutter und der Wolffschen Gänge steuert. Durch einen biodynamischen Ansatz erfahren Praktiker, wie diese embryonalen Prozesse die Morphologie und die ligamentäre Struktur beeinflussen, und erhalten so wesentliche Schlüssel für ein integratives Verständnis der Entwicklung der Urogenitalsysteme bei Männern und Frauen.

DER GENITALAPPARAT: ANLAGE

EINFLUSS DER CHORDA DORSALIS UND DES NERVENSYSTEMS

Der **Notochordalprozess** beeinflusst das **neuronale System**, welches wiederum das **Herz-Kreislauf-System** beeinflusst.

Das Herz-Kreislauf-System spielt eine entscheidende Rolle bei der Anlage auf Zwerchfellebene, genauer gesagt auf der Ebene des **Septum transversum**, ein Phänomen, das als **Diaphragmatisierung** bekannt ist.

Dieser Diaphragmatisierungsprozess ist auch für die Entwicklung der **Nebennieren** verantwortlich.

ENTWICKLUNG DER NEBENNIEREN UND GONADEN

Das Wachstum der **Leber** erzeugt ein Saugfeld, das einen hinteren Raum im **hinteren parietalen Peritoneum** schafft. Dieses Saugfeld trägt zur Bildung der Nebennieren bei, die sehr voluminös werden.

Gleichzeitig ist das **Urogenitalsystem** durch die Migration der **Gonocyten** aus dem **Dottersack** gekennzeichnet. Diese Gonocyten besiedeln die **Genitalleiste**, die sich an der hinteren Wand befindet, stimulieren so die Verdickung des Epithels und bilden die **Gonadenleiste**.

INTERAKTION ZWISCHEN NEBENNIEREN UND GONADEN

Die Nebennieren, angetrieben durch die Entwicklung der Leber, drängen die Gonaden seitlich weg.

Diese entwicklungsbedingte Bewegung erzeugt eine **seitliche Falte** im Gewebe, verursacht durch den Druck der Nebennieren auf die Gonaden. Diese Falte, sichtbar im hinteren parietalen Peritoneum, wird als **Müller-Gang** bezeichnet.




ABB. — Dieses Bild scheint den Effekt der Nebennieren darzustellen, die die Gonaden seitlich verschieben und den Müllerschen Gang bilden, wie beschrieben.

GESCHLECHTSUNTERSCHIEDE UND BILDUNG DER GENITALORGANE

Anfänglich gibt es keine sichtbaren strukturellen Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Genetisch gesehen weist die Frau jedoch stärker entwickelte Nebennieren auf, was die seitliche Bewegung akzentuiert.

Diese Bewegung erzeugt eine Falte im Gewebe, aus der die **Eileiter** (links und rechts) entstehen.

In der Mitte bringt die sich bewegende Leber die Elemente näher zusammen, während sich die unteren Extremitäten zu bilden beginnen und eine Mittellinie entsteht.

Die beiden Röhren des Müller-Ganges vereinigen sich, und unter dem Einfluss der Leber und der Nebennieren, die die Gonaden seitlich drücken, strukturiert sich diese Mittellinie.

Oben übt die Leber weiterhin Zug aus, und die Vereinigung der beiden Röhren führt zur Bildung der **Gebärmutter** bei der Frau.

Beim Mann bildet sich dieser Kanal zurück und entwickelt sich nicht auf die gleiche Weise. Die sich entwickelnde Gonade wird sich bei der Frau in einen **Eierstock** verwandeln, wobei die Gebärmutter aus dem hinteren parietalen Peritoneum entsteht.

BANDSTRUKTUREN UND KANÄLE

Das **breite Mutterband**, mit seinen inneren Linien, wird das **Ovarialband**, das **Ligamentum uterosacrale** und das **Ligamentum latum uteri** bilden, die alle aus dem hinteren parietalen Peritoneum stammen.

Die informierte und entwickelte Genitalleiste ist mit der Entwicklung der Leber verbunden, die einen neuen **retroperitonealen** Raum schafft.

Dieses Saugfeld, typisch für Drüsen, drückt die Gonaden und Nieren, was zum Verschwinden des **Mesonephros** führt.

Die Gonadenleiste selbst bewegt sich seitlich und bildet eine Falte im hinteren parietalen Peritoneum, die zum **Müller-Hügel** wird.

Die erste Ebene, die aus dem Sammelrohr stammt, ist der **Mesonephrosgang**, auch bekannt als **Wolff-Gang**. Dieser Kanal dient später als Leitungsbahn für die Gonadenleiste (zukünftiger Hoden oder Eierstock).

Schließlich führen das **Ligamentum suspensorium ovarii** oben und das **Gubernaculum** unten die Eierstöcke bei der Frau an ihren Platz oder ermöglichen den Abstieg der Hoden durch den **Leistenkanal** beim Mann.