29. EL APARATO GENITAL : IMPLANTACIÓN

DURACIÓN : 05:37 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora en profundidad la implementación del aparato genital, haciendo hincapié en la influencia de la notocorda y del sistema nervioso en el desarrollo de las estructuras genitales. Los conceptos clave incluyen la diafragmatización, el desarrollo de las glándulas suprarrenales y las gónadas, así como la interacción dinámica entre estos órganos, que guía la formación de las trompas de Falopio, el útero y los conductos de Wolff. A través de un enfoque biodinámico, los profesionales descubrirán cómo estos procesos embrionarios influyen en la morfología y la estructura ligamentaria, ofreciendo así claves esenciales para una comprensión integradora de la evolución de los sistemas urogenitales en el hombre y la mujer.

EL APARATO GENITAL: ESTABLECIMIENTO

INFLUENCIA DE LA NOTOCORDA Y EL SISTEMA NERVIOSO

El **proceso notocordal** influye en el **sistema neuronal**, que a su vez impacta el **sistema cardíaco**.

El sistema cardíaco juega un papel crucial en el establecimiento a nivel diafragmático, más precisamente en el plano del **septum transverso**, un fenómeno conocido como **diafragmatización**.

Este proceso de diafragmatización también es responsable del desarrollo de las **glándulas suprarrenales**.

DESARROLLO DE LAS SUPRARRENALES Y LAS GÓNADAS

El crecimiento del **hígado** genera un campo de aspiración, creando un espacio posterior en el **peritoneo parietal posterior**. Este campo de aspiración contribuye a la formación de las suprarrenales, que se vuelven muy voluminosas.

Paralelamente, el **sistema urogenital** se caracteriza por la migración de los **gonocitos** desde la **vesícula vitelina**. Estos gonocitos colonizan la **cresta genital**, situada a nivel de la pared posterior, estimulando así el engrosamiento del epitelio y formando la **cresta gonadal**.

INTERACCIÓN ENTRE SUPRARRENALES Y GÓNADAS

Las suprarrenales, impulsadas por el desarrollo del hígado, empujan las gónadas lateralmente.

Este movimiento de desarrollo engendra un **pliegue lateral** en el tejido, causado por la presión de las suprarrenales sobre las gónadas. Este pliegue, visible en el peritoneo parietal posterior, se denomina **conducto de Müller**.




FIG. — Esta imagen parece representar el efecto de las suprarrenales empujando las gónadas lateralmente, formando el conducto de Müller, como se describe

DIFERENCIAS SEXUALES Y FORMACIÓN DE LOS ÓRGANOS GENITALES

Inicialmente, no existe una diferencia estructural visible entre los sexos. Sin embargo, a nivel genético, la mujer presenta suprarrenales más desarrolladas, acentuando el movimiento lateral.

Este movimiento crea un pliegue en el tejido, que dará origen a las **trompas de Falopio** (a izquierda y derecha).

En el centro, el hígado en movimiento acerca los elementos, mientras que los miembros inferiores comienzan a formarse, creando una línea media.

Los dos tubos del conducto de Müller se unen, y bajo la influencia del hígado y las suprarrenales que empujan las gónadas lateralmente, esta línea media se estructura.

Arriba, el hígado continúa ejerciendo una tracción, y la unión de los dos tubos resultará en la formación del **útero** en la mujer.

En el hombre, este canal retrocede y no se desarrolla de la misma manera. La gónada en desarrollo se transformará en **ovario** en la mujer, siendo el útero originado del peritoneo parietal posterior.

ESTRUCTURAS LIGAMENTOSAS Y CONDUCTOS

El **gran ligamento ancho**, con sus líneas internas, dará origen al **ligamento ovárico**, al **ligamento útero-sacro**, y al **gran ligamento laxo**, todos derivados del peritoneo parietal posterior.

La cresta genital, informada y desarrollada, está ligada al desarrollo del hígado, que crea un nuevo espacio **retroperitoneal**.

Este campo de aspiración, típico de las glándulas, empuja las gónadas y los riñones, provocando la desaparición del **mesonefros**.

La propia cresta gonadal se desplaza lateralmente, formando un pliegue en el peritoneo parietal posterior, que se convertirá en el **tubérculo de Müller**.

El primer nivel, originado del tubo colector, es el **conducto mesonéfrico**, también conocido como **conducto de Wolff**. Este conducto servirá más tarde como conducto para la cresta gonadal (futuro testículo u ovario).

Finalmente, el **ligamento suspensorio diafragmático** arriba y el **gubernáculo** abajo guiarán los ovarios a su lugar en la mujer o permitirán el descenso de los testículos a través del **canal inguinal** en el hombre.