03. 中胚葉と脊索の形成

所要時間：03:43　学習シート

コース概要

このビデオでは、中胚葉の形成過程と、胚発生における脊索の重要な役割について詳しく解説します。原線条やボトル細胞を介して、これらの構造が細胞レベルでどのように相互作用し、原始間葉組織の形成につながるかを学びます。さらに、尾骨に関連する実践的な側面を探求し、インパルスと電磁場が組織の健康にどのように影響するかを発見します。セッションには、脊索の動きへの実践的なアプローチが含まれており、仙骨、尾骨、さらには心臓の相互接続に焦点を当て、生体力学的胚学とオステオパシーの理解を深めます。

中胚葉と脊索の形成

中胚葉の形成

最初の重要なステップは**中胚葉の形成**です。**原始線条**と**脊索軸**の出現が観察されます。

外胚葉組織と**内胚葉**組織の間に吸引場が存在し、空間が満たされる動きが生じます。

中胚葉組織の起源は**上胚葉**組織であり、外胚葉組織ではありません。**ボトル細胞**は中心に引き寄せられます。

このようにして、上胚葉組織と下胚葉組織の間の空間が**原始間葉組織**、将来の中胚葉となります。

脊索の役割

脊索はこのプロセスに影響を与えます。それは作用する電場です。

前回の講義では、**仙骨**のレベルで、脊索軸に焦点を当てて作業しました。

このプロセスをさらに深く探求します。ここに位置する脊索は**ヘンゼン結節**と関連しています。

これにより、波のような動き、**頭尾方向**の動きが生じ、原始線条は徐々に後方へ退行します。

この原始線条は**仙尾骨**の基部に位置し、エネルギーの痕跡を構成します。

このようにして中胚葉の形成が観察されます。

実践：尾骨と衝動

尾骨に焦点を当てて実践します。この領域はエネルギーを集中させるからです。

最初の衝動は**下胚葉**組織に生じます。このとき、上胚葉は**外胚葉**になり、下胚葉は**内胚葉**になります。

これは、上胚葉が私のすべての組織に情報を与え、私自身の脊索によって完全に統合されていることを意味します。それは身体に情報を与える**電磁場**です。

このレベルに意識的に触れるとき、私たちは身体が確立したこの力とつながっています。

中胚葉組織の発達

2番目の衝動、2番目の波に到達し、**中胚葉組織**を形成します。

このようにして、私の原始線条とともにこの吸引場を生成する初期の脊索情報を得ます。

後者は、私の**胚柄**の形成と、組織化される私の**浸透**および**注入**の場と接触して、私の原始線条の空間を作り出します。

この動きの中で、私の中胚葉の統合が行われます。これは**14日目**から**16日目**の間に起こります。

実践するとき、まずこの種の**「太極拳」**、この脊索の波を知覚します。

そして、その下で、この動きと同時に、下への侵入があります。それは**二重の動き**です。

仙骨または尾骨に位置することができます。その後、**心臓**のレベルで非常に特定の他の平衡点について説明します。

心臓の推定的な側面は、この作用場によって決定されます。




図 — 神経管形成の開始




図 — 初期胚発生





図 — ヒトの原腸形成3週目



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

図 — ヒトの原腸形成




図 — ヒト胚の原腸形成




図 — 間葉系細胞の移動



Epiblast
Mesoderm
Endoderm
Epiblast
Endoderm
16 days
mcg
Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

図 — 原腸形成 16日目