31. 女性生殖器

所要時間：06:15　学習シート

コース概要

このビデオでは、女性生殖器系の発達を深く掘り下げ、ウォルフ管とミュラー管の形成、およびそれらが生殖構造に与える影響から始めます。男性と女性で異なる尿生殖器の関係に焦点を当て、子宮と卵管の形成を明らかにします。また、広靭帯と卵巣靭帯の役割、およびホルモン調節と生殖能力における腎臓の健康の重要性についても詳しく説明します。ビデオでは、骨盤内の筋膜の連続性、および子宮筋腫などの異常が身体全体のダイナミクスにどのように影響するかについても触れており、オステオパシーおよび胚発生の施術者にとって重要な情報を提供します。

女性生殖器

1. 中腎管（ウォルフ管）と副腎管（ミュラー管）

ウォルフ管は、別名**中腎管**とも呼ばれ、胚に最初に現れる管です。

男性では、この管は下降し、精巣の間に組み込まれて**射精管**を形成します。一方、ミュラー管は痕跡として残り、前立腺の中心部の形成に寄与します。

女性では状況が逆になります。

- ウォルフ管は**ガードナー管**に分化し、これは痕跡器官です。
- ミュラー管は融合して**子宮**と**卵管**になります。

泌尿生殖器の発達

泌尿生殖器の関係は非常に重要です。男性では、精巣上体管、精管、射精管がこの関係から形成されます。

女性では、この発達は同じようには起こりません。ミュラー管は正中線に向かって合流し、子宮を形成します。

ガードナー管は、女性におけるウォルフ管の痕跡を表します。射精管は基部に向かっており、離れるほど子宮を形成します。離れないほど、痕跡は**前立腺小室**になります。

2. 広靭帯と卵巣靭帯

男性と女性の両方で、**後壁腹膜**が集中して**広靭帯**、および小さな卵巣靭帯と円靭帯を形成します。

これは同じ組織ですが、集中度が異なります。この後壁腹膜は女性の子宮を形成します。

男性では、この動きは存在せず、腹膜の集中が残るだけです。

3. 腎臓と副腎

腎臓は**副腎**の下に位置し、カプセルによって分離されています。これは、**腎下垂**が副腎下垂を引き起こさないことを意味します。

これらは**グリソン鞘**と呼ばれる筋膜によって分離されています。腎臓には脂肪組織が必要です。

非常に痩せた女性では、腎臓の下垂が月経不順や生殖能力の低下を引き起こす可能性があります。**腎臓を再活性化する**ことは、その生殖能力を再活性化することでもあります。

腎臓の胚発生

初期の小さな胚では、腎臓は肝臓と同様に非常に巨大です。これは、初期には脳が幹に比べて非常に発達している脳の発達を思い出させます。

これらの比率は発達の過程で変化します。肝臓は副腎の発達において重要な役割を果たします。

これは、男性と女性の間で**構造的な分化**が初めて観察されるものであり、**ミュラー結節**を形成する腺のより大きな発達に関連しています。




Fig. 1. — *Vue schématique de la différenciation ovarienne au moment de la régression du corps de Wolff.*

図 — 卵巣の分化

4. ミュラー系（第5週）の発達

第5週には、側面の下の系が発達し始め、腎臓にすべての力を与え直します。

脳は心臓の形成に影響を与え、心臓は**横隔膜形成**、肝臓、副腎、生殖腺、および隆起を形成します。

ミュラー管は女性でより強く発達し、純粋な管を形成し、それが合流して子宮を形成します。




図 — 胚の子宮形成

男性では、発達はそれほど顕著ではなく、ミュラー管の下部に残るものが前立腺の中心部を構成します。

精巣下降

精巣下降は、**精巣導帯**レベルでの分化成長速度によるもので、これが減速してシステム全体を引き下げます。

子宮と筋膜、皮膚、小骨盤のすべての部分との間のこの筋膜の連続性は不可欠です。

5. 筋膜の連続性と構造の影響

子宮、靭帯、卵巣、および**腹腔**がよく観察されます。




図 — 女性の生殖器系

鉗子で子宮を持ち上げると、すべてが動くことがわかります。




図 — 女性の生殖器系

子宮筋腫や**嚢胞**の影響は重大です。靭帯との連続性は最も重要です。




図 — 子宮と筋肉組織

より強く引っ張ると、円靭帯を含むシステム全体がどのように反応するかがわかります。

腹膜は非常に賢い組織です。例えば、子宮筋腫の影響は、単純な牽引によって下流のシステム全体を変化させる可能性があります。

大きな子宮筋腫は、システム全体に一連の結果を引き起こす可能性があります。

ial de Müller ouvert dans la cavité péritonéale devient le pavillon de la trompe (fig. 1 et 2).




Fig. 1. — *Formation de la trompe et résidus wolffiens.*

図 — 女性の生殖器



11
6
12
7
13
8
9
14
10
15
16
6. Glandula suprarenalis
7. Müllerian duct
8. Lig.teres uteri
9. Uterus
10. For.sacralia ant.
11. Ramus communicans
12. Ren. Pelvis renalis
13. Ovarium
14. Urether
15. Anus
16. Anlage Os coccygis

図 — 胎児の生殖器系



Cordons corticaux
Cordons médullaires
Rete ovarii
Tubes mésonéphrotiques
Corps de Wolff
Canal de Wolff
Canal de Müller
Ligament inguinal
Tubercule müllérien
Sinus uro-génital
Fi

図 — 未分化な生殖器系