45. BONUS - LE MOUVEMENT RÉGÉNÉRATEUR

DURÉE : 10:31 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Le Mouvement Régénérateur (créé par Marc Damoiseaux) est une puissante pratique somatique où le corps retrace physiquement sa propre genèse. En conscience, le praticien revit la polarisation originelle de l'ovule, le clivage des premiers blastomères, puis traverse la gigantesque plicature de l'embryon (vague notochordale, looping du cœur, bascule pulmonaire et rotation des fascias digestifs). Cette architecture en mouvement ramène ultimement la perception de l'Axe Central (Vertex - SSB - Cœur - Sacrum), réinitialisant l'équilibre tissulaire profond de la chaîne médiane.

LE MOUVEMENT RÉGÉNÉRATEUR

Créé par Marc Damoiseaux, le Mouvement Régénérateur est inspiré du mouvement développemental de l'embryon.

Position initiale.

Pousse de la main droite dans la main gauche, pied parallèle. Largeur des épaules.

Le dos est droit et détendu. Légère flexion des genoux.

Observation des différentes lignes médianes : la ligne médiane notochordale, postérieure et antérieure. On observe bien la sphère neuro-sensorielle, rythmique, métabolique, urogénitale. Essayez de les ressentir, de vous équilibrer.

Dans un premier temps, le mouvement, l'ovule est sphérique. Vous dessinez dans l'espace une sphère devant vous qui représente l'ovule.

La première fonction de l'ovule en création est la polarisation primitive. Un axe est-ouest, et un axe nord-sud. Et avant et arrière.

Arrivée du spermatozoïde. Pénétration du spermatozoïde dans l'ovule. Et le premier clivage apparaît. Vous dessinez devant vous dans l'espace les deux premiers blastomères. Vous pouvez prendre l'ensemble, la division cellulaire. Et vous déposez cette sphère vers le bas, au niveau du ventre.

Dans un premier temps, pas de croissance, mais multiplication cellulaire.

Ensuite la 4ème phase, c'est l'éclosion. Suivi de la nidation, apparition de la cavité amniotique et du cœlome extra-embryonnaire. Croissance.

Formation du pédicule embryonnaire. Mise en place de la ligne primitive (fermez la tirette). Ensuite, grande vague notochordale.

Ensuite, vous imaginez un embryon couché devant vous, tête vers les mains. Formation de la gouttière neurale. Le tube neural se ferme.

Mise en place, petit à petit, de la motilité du cerveau en croissance. Expansion du cerveau. Flexion mésencéphalique. Suivie de la flexion cervicale et de la mise en place du pont.

Phase de télencéphalisation. Occiput et temporaux dans les mains.

Mouvement de développement du cœur. Depuis la ligne primitive, vous descendez les mains vers le coccyx. Vous joignez les mains vers l'avant au-dessus de la tête. Fusion des deux tubes. Et looping du cœur : descente de la main droite en rotation vers la gauche.

Mouvement de développement du diaphragme. Les pouces vont former les piliers diaphragmatiques.

Formation de la délimitation embryonnaire (Zone B). Toute la cavité amniotique. On part derrière le dos, c'est comme si on tendait un grand ballon de baudruche vers l'avant. La réunion de la vésicule vitelline et de la cavité amniotique avec le pédicule embryonnaire va former le cordon ombilical.

Ensuite on monte les mains au niveau de l'angle de Louis. On va faire un petit tour de main. Formation des poumons. Ouverture, inspiration.

On remonte les mains vers le haut. Formation du mouvement des reins. On descend : pronéphros, mésonéphros, métanéphros. Rapport entre les reins et la descente du sacrum.

Mouvement de développement de l'espace sous-diaphragmatique. Vous tenez un ballon du côté gauche et vous le roulez pour former l'espace hépato-gastro-pancréatico-liénal.

Ensuite, rotation de l'intestin. La main droite passe au-dessus de la main gauche, comme si on tournait dans le sens anti-horaire. L'intestin se forme avec la main droite qui forme le côlon ascendant.

Ensuite, on rapproche les mains au niveau du péritoine pariétal postérieur. On concentre, on se rapproche vers la ligne médiane. On descend vers le pubis. On remonte pour former l'utérus ou la prostate.

On remonte les mains au niveau des épaules. Mouvement développemental des membres supérieurs et inférieurs. On fait les membres supérieurs : rotation externe. Les pouces et les mains se tournent pour tenir un petit embryon. Les mains représentent ce petit embryon en formation.

On ramène les mains dans la position initiale. On prend le pouce droit avec la main gauche et on redescend au niveau de l'ombilic pour retrouver la posture initiale. On prend conscience de cette posture.

On prend conscience de retrouver son axe, la chaîne centrale. Vertex, Tente du Cervelet, Symphyse Sphéno-Basilaire, œsophage, trachée, péricarde, centre phrénique avec la faux du cerveau, la racine du mésentère, jusqu'en bas.

On est bien centré et on retrouve son équilibre, sa balance.