03. 中胚层和脊索的形成

时长：03:43 教学单

课程总结

本视频将引导您了解中胚层形成的迷人过程以及脊索在胚胎发育中的关键作用。您将学习这些结构如何在细胞水平上相互作用，特别是通过原条和瓶状细胞，从而形成原始间充质组织。此外，您还将探索与尾骨相关的实践方面，了解脉冲和电磁场如何影响组织健康。本次课程包括脊索运动的实践方法，同时强调骶骨、尾骨乃至心脏之间的相互联系，从而加深您对生物动力学胚胎学和整骨疗法的理解。

中胚层和脊索的形成

中胚层的形成

第一个关键步骤是**中胚层的形成**。我们观察到**原条**和**脊索轴**的出现。

外胚层组织和**内胚层**组织之间存在一个吸引场，产生一个空间将被填充的运动。

中胚层组织起源于**上胚层**组织，而不是外胚层组织。**瓶状细胞**被吸引到中心。

因此，上胚层和下胚层之间的空间变成了**原始间充质组织**，即未来的中胚层。

脊索的作用

脊索影响着这个过程。这是一个起作用的电场。

在上一堂课中，我们研究了**骶骨**，重点关注脊索轴。

我们将更深入地探讨这个过程。脊索位于此处，与**Hensen结**相连。

这会产生一个波浪运动，一个**头尾向**的运动，原条逐渐向后退化。

这条原条位于**骶尾**基部，构成了一个能量遗迹。

因此，我们观察到中胚层的形成。

实践：尾骨和冲动

我们将通过专注于**尾骨**进行练习，因为这个区域集中了能量。

第一次冲动发生在**下胚层**组织上。正是在此时，上胚层变为**外胚层**，下胚层变为**内胚层**。

这意味着上胚层通知了我所有的组织，它本身完全被我的脊索整合。这是一个**电磁场**，它通知着身体。

当我们有意识地触及这个层面时，我们便与身体所建立的这种力量连接起来。

中胚层组织的发育

我们来到第二次冲动，即第二波，它将形成**中胚层组织**。

因此，我获得了最初的脊索信息，它与我的原条一起，产生了这种吸引场。

后者创造了我的原条空间，与我的**胚柄**的形成以及我的**渗透**和**灌注**场（它们正在组织起来）相接触。

正是在这个运动中，我的中胚层得以整合。这发生在**第十四天**到**第十六天**之间。

当你练习时，你首先会感觉到这种**“太极”**，这种脊索波。

然后，在下面，与这个运动同时，下面有一个入侵。这是一个**双重运动**。

我们可以将自己定位在骶骨或尾骨上。随后，我们将探讨**心脏**部位其他非常具体的平衡点。

心脏的推定方面是由这个作用场决定的。




图 — 神经管形成早期




图 — 早期胚胎发育




A
2bis
3
Ectoblaste
Mésoblaste
Entoblaste
2
1
Amnios
Somatopleure
Splanchno-
pleure
Entoblaste
du lécithocèle
B

图 — 人类原肠胚形成3周



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

图 — 人类原肠形成




图 — 人类胚胎原肠胚形成




图 — 间充质迁移



Epiblast
Mesoderm
Endoderm
Epiblast
Endoderm
16 days
mcg
Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

图 — 原肠胚形成16天