32. 下生殖器

时长：08:54　教学单

课程总结

在这段关于下生殖器的沉浸式视频中，我们探索了阴道和子宫的胚胎学，重点介绍了形成这些基本结构的后部生长动力学。通过分析骶骨和腹膜之间的运动以及这些相互作用如何影响生殖器官的健康来探讨妇科平衡。该视频着重于流产或子宫内膜异位症等失衡，提出了基于能量清理、筋膜平衡和跨代联系概念的引人入胜的治疗技术。这种方法使从业者能够学习如何

下生殖器：生物动力学方法

阴道和子宫的胚胎学

膀胱在位于泌尿生殖窦的**苗勒结节**处的插入至关重要。该区域包括膀胱、尿道以及与阴道的连接。




Fig. 2. — *Ouverture de la membrane uro-génitale.*





Fig. 3. — *Le vestibule définitif.*

图 — 女性泌尿生殖道发育

阴道源自**中胚层**，特别是苗勒管。**阴道板**的形成是骶骨和神经管向后生长的结果。

这部分后部差异性生长速度创造了阴道的开放空间。正是**后前**运动，在肾脏和骶骨之间，实现了这种延伸。

苗勒结节增厚，然后被拉伸，这不是通过表面牵引，而是通过后部更快的推力。这种现象导致阴道和子宫颈的延长和形成。



APPAREIL GÉNITAL FEMELLE. 91

VOIES GÉNITALES FEMELLES

a b c d e

Fig. 4. — *Formation du vagin.*

a. L'extrémité borgne du canal utéro-vaginal primitif bute à la face postérieure du sinus uro-génital et forme à ce niveau le **tubercule de Müller.**

b. Le tubercule de Müller s'épaissit et éloigne temporairement la cavité utérine du sinus uro-génital.

c. La paroi postérieure du sinus uro-génital s'épaissit en regard du tubercule et forme, avec lui, **la lame épithéliale vaginale.** Celle-ci émet à sa partie supérieure une évagination circulaire, entourant le pôle inférieur du canal utérin.

d. La perméabilisation de la lame vaginale prolonge vers le bas le canal utérin et forme le *vagin*.

e. Cet évidement dessine, autour du col utérin, les *culs-de-sac vaginaux*.

图 — 阴道发生

泌尿生殖窦的后壁增厚，形成阴道板，阴道板张开并拉伸。这种动力学是相似的，后部生长更快。




图 — 子宫阴道管

妇科平衡与生物动力学运动

检查子宫时，会感觉到**骶骨**和**腹膜**之间的运动。正是这两个极点的相互作用，构成了阴道和子宫的平衡。




图 — 女性子宫解剖

在性腺水平，腹部会感觉到相反的运动，沿着韧带向耻骨方向，就像一道下降的波浪。

骶骨的下降受神经管的影响。另一个关键的支撑点是耻骨和骶骨的组合，形成了女性小骨盆重要的筋膜平衡。

这种平衡涉及一条相对于骶骨的下降力线，影响女性身体的各种功能。

子宫失衡的治疗方法

流产等情况会在子宫中留下能量印记。因此，需要对子宫进行能量清理。

我们可以用**磁力**来接近子宫，学习感受远处的能量场。治疗师感知到一种频率，一个热量密集的区域，这是能量存在的标志。

我的方法是“扫描”并识别需要清理的区域。这是为了让组织和能量恢复自由。

例如，**子宫后倾**可能导致充血期。远程治疗旨在重新平衡妇科系统，这与**胃泌素**密切相关。

子宫内膜异位症的特点是组织增生并向上进入腹膜，通常与腰痛和骶髂关节疼痛相关。

腹膜内腔和跨代维度

在女性中，子宫颈、输卵管和**腹膜内腔**之间存在直接联系。这个腔非常重要，被视为“天空”或原始空间。

身体的每一种状态都代表了在特定时刻可能出现的最佳功能反应。这种反应受我们生活的影响，也受我们祖先生活的影响。

例如，子宫后倾可能是身体为解决**跨代**或深层个人问题而找到的最佳解决方案。

了解为什么跨代模式会以这种方式表现出来至关重要。治疗旨在解读这种“最佳解决方案”，并在需要时提供必要的释放。

胚胎完美地说明了这一概念：在发展的每个阶段，它都呈现出最佳的生理反应。

次级神经管形成和终丝的形成

神经管与尾部后方隆起相关联，创造了一个光线和连接的空间。我们观察到尾芽和**脊索**的末端部分。




图 — 胚胎泄殖腔发育

直肠空间和带有后神经孔的神经管密切相关。通过后部更显著的发育运动形成连接。

这涉及先闭合再重新打开以建立这种连接。这个过程导致后神经孔的出现和延长以形成**终丝**。

这就是所谓的**次级神经管形成**。骶骨的触诊揭示了这些差异性生长速度，其中初始连接向后延长。

尾部隆起的整合确保了与神经管的连续性，形成了这种上升的次级神经管形成。




图 — 泄殖腔分隔

会阴发育和肝脏影响

在**会阴**处，我们观察到下肢的出现和牵引力的作用。这种运动与子宫系统密切相关。

肝脏的倾斜，与神经管和骶骨的下降协同作用，通过镰状韧带影响向白线牵引的发育运动。

这种肝脏发育导致倾斜，影响整个发育中的子宫区域。它可能解释与子宫位置相关的迁移现象或差异性牵引。

耻骨和肚脐之间发育出一条韧带，其中包含了下降和子宫形成的历史。

正如胸骨包含了我们屈曲的历史一样，这条腹中线韧带（在白线上）集中了所有后部形成、骨盆**性腺化**和**子宫化**的历史。

白线是所有**泌尿生殖**历史的交汇点。