

23. ANATOMIE DE

DURÉE : 21:58

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS


Cette vidéo offre une exploration approfondie de l'anatomie de l'œil et du neurocrâne, en expliquant les relations entre les différentes structures comme le neurocrâne, le viscérocrâne, et leurs fonctions intégrées. Vous apprendrez les caractéristiques clés des tuniques de l'œil, notamment la sclérotique, l'uvée et la rétine, ainsi que l'importance des muscles oculomoteurs et de leur innervation. La discussion intègre également la vascularisation complexe de l'œil, essentielle pour le maintien de sa santé. Cette connaissance est vitale pour les professionnels de la santé, en particulier les ostéopathes, qui cherchent à mieux comprendre les fondements anatomiques de la vision et leur impact sur la santé globale.

ANATOMIE DE L'ŒIL ET DU NEUROCRÂNE

L'anatomie de l'œil et du neurocrâne est un sujet fascinant qui implique une compréhension approfondie des structures et de leur fonction.

NEUROCRÂNE ET VISCÉROCRÂNE


Le **neurocrâne** est un champ métabolique de détraction, tandis que le **viscérocrâne** est constitué de dérivés embryologiques. La forme tridimensionnelle du **zygoma** est particulièrement intéressante, avec ses petites facettes et sillons, notamment le **grand sillon** au-dessus, appelé **fente sphénoïdale**, où passent le nerf **oculomoteur** (nerf III) et les branches trigéminales.



Fente sphénoïdale

Le **canal optique** est crucial, car il abrite le nerf optique et l'artère ophtalmique.

Le **palatin**, bien qu'il soit un petit processus, joue un rôle important dans l'équilibre du mouvement de flexion de l'embryon lors de la formation du palais.




Neurocrâne et viscérocrâne, notamment l'importance du palatin et du zygoma mentionnés

Il est associé au **zygomatique** et au **maxillaire**, qui sont également des os tridimensionnels. La fosse lacrymale, l'os lacrymal, l'**ethmoïde**, l'**os nasal**, le **frontal** et le **sphénoïde** forment une concentration d'informations osseuses.

TUNIKES DE L'ŒIL

L'œil est constitué de trois grandes tuniques :



Vue d'ensemble des tuniques de l'œil

1. **Sclérotique** : La sclérotique est la couche externe, qui se prolonge à l'avant par la **cornée**, une sclérotique transparente. Le blanc de l'œil est une sclérotique non transparente.

La cornée

TRANSPARENTE ET ANTERIEURE

1) Epithélium de revêtement pluristratifié pavimenteux épidermoïde :

Nombre variable de couches, nombreuses terminaisons sensibles, forte capacité de régénération

2) Membrane de BOWMAN (=membrane basale)

Epaisseur : 10-12 μm


Fibrilles de collagène IV

3) Stroma cornéen : Tissu conjonctif dense régulier LAMELLAIRE, NON vascularisé

- Faisceaux de fibres collagène I disposés perpendiculairement l'un à l'autre d'orientation régulière
- Fibroblastes
- Substance fondamentale riche en chondroïtine- et keratan-sulfate (hydrophilie)

4) Membrane de DESCOMET (=membrane basale)


5) Endothélium (=ERU pavimenteux)



La structure de la cornée et de ses fréquences

Cornée

- Membrane transparente, en dôme, qui couvre le devant de l'œil.
- Elle est avasculaire, et richement innervée.



Coupe de l'œil

2. **UV (Uvéa)** : Composée de plusieurs parties, dont la **choroïde**, richement vascularisée, l'**iris** à l'avant, et le **corps ciliaire** entre les deux. Le corps ciliaire contient des ligaments et des muscles, appelés **ligaments suspenseurs**, qui maintiennent le cristallin.



La vascularisation liée à la choroïde et l'intégration des informations dans l'œil

3. **Rétine** : La rétine contient le **canal de Cloquet** ou le **canal hyaloïdien**, ainsi que l'**ora serrata**. Elle est riche en photorécepteurs, notamment les **cônes** (vision diurne) et les **bâtonnets** (vision nocturne).

ANATOMIE DE LA CORNÉE ET DE LA SCLÉROTIQUE


Le **limbe** est la jonction entre la cornée et la sclérotique, également appelée **imbus corneoscléral**. Le **canal de Schlemm** est essentiel pour la résorption du liquide de la chambre antérieure. La **chambre antérieure** et la **chambre postérieure** de l'œil sont séparées par la pupille.

Iris

- Zone colorée de l'œil.
- C'est un diaphragme circulaire, percé en son centre d'un orifice: **la pupille**.
- Constitué de 2 types de fibres musculaires lisses:
 - Fibres circulaires: **muscle sphincter de la pupille**.
 - Fibres étalées: **muscle dilatateur de la pupille**.

Pupille et sa fonction de régulation de la lumière


L'**humeur aqueuse**, un liquide nutritif, est sécrétée par les processus ciliaires, filtrée par le trabéculum, et résorbée par le sinus veineux de la sclère et le canal de Schlemm. Elle maintient l'équilibre et nourrit la cornée et l'iris.




Vue détaillée du canal de Schlemm et de la régulation de l'humeur aqueuse

MUSCULATURE OCULAIRE


Les muscles oculomoteurs, tels que le **droit supérieur**, le **droit inférieur**, et les muscles obliques, sont essentiels pour le mouvement des yeux. Le **muscle releveur de la paupière** est également important, et des ptoses de la paupière peuvent indiquer des problèmes de santé.




Jonction de la conjonctive




Glande lacrymale et son système de drainage



Glandes de sécrétions et la continuité du tarsus avec le muscle de Muller




Face muqueuse de la paupière (conjonctive)




Anatomie de la paupière


Le **tendon de Zinn** est le point d'attache des muscles oculomoteurs, qui sont en relation avec les muscles de la nuque.




Relation de la capsule de Tenon avec les fascias du corps




Muscles oculomoteurs




Muscles oculomoteurs




Muscles oculomoteurs



Muscles oculomoteurs




Muscles oculomoteurs




Musculature oculaire et le point d'attache du tendon de Zinn

Les nerfs optiques et les artères ophtalmiques jouent un rôle crucial dans la vascularisation et l'innervation de l'œil.




Relation entre carotide et nerf optique



Un sinus veineux ou un aspect de la vascularisation


VASCULARISATION ET INNERVATION

La vascularisation de l'œil provient de la carotide, avec des artères ophtalmiques et des branches pour la vascularisation de la rétine.




Vascularisation de l'œil, commençant par la carotide

Les **péricytes** ou cellules de Rouget modulent l'information au niveau des capillaires, en particulier dans la rétine.



Péricytes et leur rôle dans la modulation de l'information

L'innervation de l'œil comprend des voies sensibles, motrices et végétatives, avec le nerf optique captant l'information visuelle.



L'innervation et la réunion des informations dans le canal optique

La rencontre de ces systèmes au niveau de la rétine forme le nerf optique, qui transmet l'information sensorielle.

Nerfs

- **Nerf sensoriel:** nerf optique (II).
- **Nerfs moteurs:** III, IV et VI.
- **Nerf sensitif :** nerf ophtalmique.
- **Un centre végétatif :** ganglion ophtalmique.

Innervation et de la transmission de l'information via le nerf optique

CONCLUSION

L'anatomie de l'œil et du neurocrâne est complexe et interconnectée, impliquant des structures variées qui jouent des rôles essentiels dans la vision et la fonction neurologique. La compréhension de ces éléments est fondamentale pour les professionnels de la santé, notamment en médecine et en ostéopathie.