

05. DIE ZELLE: METABOLISCHE FELDER UND DIFFERENZIERUNG

DAUER : 11:37

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Diese Sitzung zur biodynamischen Embryologie lehrt die Grundlagen der Zellentwicklung, indem sie den Weg der Stammzelle bis zu ihrer Differenzierung erklärt. Mit wesentlichen Konzepten wie der Zellteilung, polarisierenden Substanzen und metabolischen Feldern werden die Studierenden verstehen, wie Zellen kommunizieren und interagieren. Der Schwerpunkt liegt auf der Bedeutung der Polarisation bei der Bildung von Eizellen sowie auf den Arten der Zellkommunikation, wobei konkrete Beispiele zur Vertiefung des Verständnisses der Embryogenese herangezogen werden.

BIODYNAMISCHE EMBRYOLOGIE: ZELLULÄRE ENTWICKLUNG VERSTEHEN

Dieser Kurs über biodynamische Osteopathie erforscht die faszinierenden Mechanismen der Embryologie, basierend auf den Konzepten von **Marc Damoiseaux**. Wir werden in das Herz der Zelle eintauchen, von ihrer Geburt bis zu ihrer Differenzierung, und die Kräfte untersuchen, die sie formen.

I. VON DER STAMMZELLE ZUR POLARISATION: DIE ERSTEN SCHRITTE DES LEBENS

Alles beginnt mit einer **Stammzelle**, dem **Germarium**, bei der Frau. Diese Zelle ist der Ausgangspunkt für die Bildung der **Oozyten**.

A. DIE FURCHUNG UND DIE BILDUNG SPEZIALISierter ZELLEN

Der anfängliche Prozess ist die **Furchung**, eine besondere Zellteilung, bei der sich die Zelle faltet.

Stellen Sie sich eine Zelle vor, die sich teilt, um zwei zu bilden, aber ungleichmäßig. Eine von ihnen, die stärkere, wird geschont.

Aus dieser kleinen Zelle entsteht eine Gruppe von Zellen. Wenn man dieses Ensemble nach der Furchung betrachtet, unterscheidet man:

- Eine große Zelle, die **Oozyte**.

- Kleinere Zellen darum herum, die **Follikelzellen** genannt werden.
- Größere Zellen, die **Nährzellen**.

So bringt das Germarium, die Stammzelle, eine Vielzahl von Zellen hervor: die **Follikelzellen** (klein, umgebend) und die **Nährzellen** (groß, begleitend).

B. DER URSPRUNG DER ZELLINIEN

Es ist entscheidend, den Ursprung dieser Zellen zu verstehen:

- Einige stammen aus der **Keimbahn** (von der Mutter).
- Andere, wie die **Nährzellen**, stammen aus der Entwicklungskraft.

C. DIE ROLLE VON MOLEKÜLEN UND DIE POLARISATION

Die **Nährzellen** und **Follikelzellen** setzen kleine Moleküle frei.

Diese Moleküle lagern sich im **Zytoskelett** der Oozyte an und erzeugen spezifische Konzentrationsachsen.

Mit anderen Worten, wenn man Elemente auf einer Seite konzentriert, ist die metabolische Konzentration an dieser Stelle höher. Dies wird als "**Volper-Fahne**" bezeichnet.

Diese Konzentration impliziert einen "Plus"-Pol und einen "Minus"-Pol.

Ein ähnliches Phänomen tritt entlang einer anderen Achse auf, der **apiko-basalen Achse**. Die Oozyte polarisiert sich und erzeugt Konzentrationsachsen der Kraft, um elektromagnetische Energie aufzunehmen. Sie ist also von innen heraus orientiert.

II. DIE ZELLZENTREN UND DIE TEILUNG

Wenn man eine Zelle betrachtet, identifiziert man zwei große Zentren:

- Ein **reines Zellzentrum** mit dem Kern.
- Ein **strukturelles Zentrum**, bestehend aus Zentriolen und Mikrotubuli.

A. DIE ZELLVERMEHRUNG

Die Zelle wird sich teilen und vermehren. Dieser Prozess beinhaltet die Beteiligung des strukturellen Zentrums und des Zellzentrums.

Das Zellzentrum ist für die Freisetzung der **DNA** in Form von Fotokopien verantwortlich. Man nimmt niemals die "Bücher aus der Bibliothek" (die ursprüngliche DNA), man macht Kopien davon.

Erinnern Sie sich an die **Äquatorialplatte** während der Zellteilung? Dort beginnt alles. In unserer Arbeit werden wir versuchen, diese Polarität in jedem Schritt zu verfolgen, auch wenn sie unterschiedliche Formen annimmt.

III. DAS METABOLISCHE FELD: EIN SCHLÜSSELKONZEPT

Um die Entwicklung des Embryos zu verstehen, ist es wesentlich, den Begriff des **metabolischen Feldes** zu erfassen.

A. DEFINITION DES METABOLISCHEN FELDES

Ein metabolisches Feld ist ein **Raum**, in dem sich die Zelle entwickelt. Es ist ein aktueller, dynamischer Raum.

B. DIE VERSCHIEDENEN ARTEN DER ZELLULÄREN KOMMUNIKATION

Um die Interaktionen innerhalb dieses Feldes zu veranschaulichen, verwendet Marc Damoiseaux anschauliche Analogien:

- **Autokrine Kommunikation:** Stellen Sie sich vor, Sie haben ein dringendes Bedürfnis und der Wind bringt alles auf Sie zurück. Das ist eine Kommunikation der Zelle mit sich selbst.
- **Parakrine Kommunikation:** Wenn mehrere von Ihnen zusammen "pinkeln" und der Wind die Ausdünstungen auf Ihre Nachbarn verteilt. Das ist eine Kommunikation zwischen nahegelegenen Zellen.
- **Endokrine Kommunikation:** Wenn Sie "in die Rinne pinkeln" (das Kreislaufsystem), wird die Botschaft über eine Distanz transportiert.
- **Neurokrine Kommunikation:** Ähnlich der parakrinen, aber über eine Distanz. Neuronale Zellen bilden große Axone, um weit zu kommunizieren.
- **Telokrine Kommunikation:** Bedeutet "über eine Distanz".

C. DAS METABOLISCHE FELD ALS STRUKTURIERTE UMGEBUNG

Das metabolische Feld ist eine Umgebung um die Zelle, die sich strukturieren wird.

Nehmen wir das Beispiel des **Sauerkrauts**: Wenn jemand einen Raum betritt, in dem Sie gerade "entgast" haben, sieht er nichts, aber er nimmt sofort Ihr metabolisches Feld wahr. Es gibt einen Raum um Sie herum, der kleine Substanzen enthält.

Dieses Feld wird sich strukturieren, organisieren und komplexer werden.

IV. DIFFERENZIERUNG, VERMEHRUNG UND GRENZEN

Die **Differenzierung** ist ein grundlegender Entwicklungsprozess.

A. DIE ZELLDIFFERENZIERUNG

Differenzierung beinhaltet:

- Eine **Positionsänderung**.
- Eine **Formänderung**.

- Eine **Struktur- und Funktionsänderung**.

Zwei verschiedene Funktionen implizieren zwei verschiedene Formen. Das Wort "**biodynamisch**" bedeutet die Dynamik des Lebens in seiner Entwicklung.

B. DIE GRENZEN UND DIE ZELLULÄRE REAKTION

Blechmit, ein Theoretiker, spricht von verschiedenen metabolischen Feldern. Das metabolische Feld ist nicht nur eine einfache Umgebung, es ist strukturiert.

Stellen Sie sich eine Zelle in ihrem Raum vor. Solange sie in diesem Raum bleibt, ist alles in Ordnung. Aber wenn sie eine Grenze berührt, kann dies Folgendes verursachen:

- Eine **Vermehrung**.
- Dann eine Vermehrung mit **Differenzierung**.

Dies hängt vom Einfluss im Raum-Zeit-Kontinuum und der genetischen Reaktion auf die Umgebung ab.

C. TRAUMATA UND APOPTOSE

Es gibt Grenzen, jenseits derer sich das System vermehren oder differenzieren kann.

Traumata oder Schocks können tiefe Differenzierungen im System hervorrufen. Es ist entscheidend, diese "Zahlen" (diese Signale) zu erkennen, um dem Körper bei der Restrukturierung zu helfen.

Der Körper besitzt eine Kraft der **Selbstregulation**. Die Umgebung und die auf die Zellen wirkenden Kräfte können eine Teilung und Vermehrung hervorrufen.

Damit es zu einer Differenzierung kommt, muss der Druck in einer bestimmten Umgebung größer sein. Es gibt einen klaren Unterschied zwischen einer einfachen Vermehrung und einer Vermehrung mit Differenzierung.

Wenn eine Zelle einer zu starken Belastung ausgesetzt ist, stirbt sie. Dieser Prozess wird als **Zellapoptose** bezeichnet.

Der Körper nutzt Vermehrung, Differenzierung und Apoptose, um sich zu entwickeln und zu wachsen. Wenn eine Gruppe von Zellen einer zu starken mechanischen Kompressionsbelastung ausgesetzt ist, bleibt nur ein **zelluläres Exsudat** übrig.

Dieser Kurs hat uns die Grundlagen zum Verständnis der biodynamischen Embryologie vermittelt und die Bedeutung der **metabolischen Felder**, der **zellulären Kommunikation** und der Kräfte, die die Entwicklung des Lebens steuern, hervorgehoben.




ABB. — Eukaryotische Zelle




ABB. — Granuläre histologische Struktur