

19. FRAGE J1: AUSRICHTUNG DER WELLE IM AXIALEN PROZESS

DAUER : 02:00

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In diesem Video untersuchen wir die Wellenbewegung zwischen der Amnionhöhle und der Dottersackhöhle während Phase 1 der Embryonalentwicklung. Diese Bewegung, bei der die Amnionhöhle nach vorne und die Dottersackhöhle nach hinten geht, erzeugt eine S-förmige Dynamik und markiert den Beginn eines Prozesses der Infusion und Permeation essentieller Informationen für die embryonalen Zellen. Die Implikationen dieser Bewegung sind entscheidend, insbesondere während der Nidation, wo die Zellen des Embryonalknochens Nährstoffe und trophische Informationen erhalten, die es ihnen ermöglichen, schnell zu wachsen und eine neue Polarität zu entwickeln. Diese Sitzung beleuchtet die komplexe Interaktion zwischen Bewegung, Ernährung und Embryonalentwicklung und bietet Schlüssel für ein besseres Verständnis der ontologischen Prozesse.

AUSRICHTUNG DER WELLE IM AXIALEN PROZESS

Zwischen der **Amnionhöhle** und der **Dottersackhöhle** findet eine **Wellenbewegung** statt. Die Bewegung der Amnionhöhle ist nach vorne gerichtet, während die der Dottersackhöhle nach hinten gerichtet ist. Diese Bewegung ist im Verhältnis zum **Stiel** zu betrachten.

Es stellt sich die Frage: Passt diese Bewegung in die Ausrichtung des Landes? Irgendwann handelt es sich um einen **Impuls**.

Die Bewegung der Amnionhöhle, die sich nach vorne bewegt, verbunden mit dem Dottersack, der sich zu diesem Zeitpunkt weniger schnell vorwärts bewegt, erweckt den Eindruck einer Rückwärtsbewegung. Dieses Phänomen erzeugt eine Welle, die den Beginn einer **S-Form** markiert. Dies stellt die **Phase 1** dar.

Diese Bewegung hängt mit der **Permeation**, der **Infusion** zusammen, die Methoden der Informationsverbreitung sind. Es handelt sich um eine **trophische** Zufuhr, ein **metabolisches** Substrat, das ankommt.

In dieser Phase bleibe ich entlang der Membran und bin in Permeation. Ich sende Nährstoffe zwischen die Zellen. Von Zeit zu Zeit versorge ich mein Gerät.

Diese **Nahrung** beinhaltet eine Bewegung. Anfangs wird die Kraft jedoch hauptsächlich auf das Gerät gerichtet sein. Dies liegt an seiner ursprünglichen, anterioren Position.

Zum Zeitpunkt der **Nidation** kann man sagen, dass, wenn ich in die Schleimhaut eindringe, die Zellen des **Embryonalknotens** die ersten sind, die die trophische Information erhalten. Sie sind bereits prädisponiert, sich schneller zu entwickeln. Diese Zellen sind stärker zentriert und kleiner, was es ihnen ermöglicht, mehr Informationen anzuziehen. Dies stellt eine neue **Polarität** dar.