

39. ZUSAMMENFASSUNG DER BEWEGUNG

DAUER : 05:02

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video taucht tief in die embryonale Bewegung ein und beschreibt die entscheidende Rolle der elektrischen und elektromagnetischen Achse bei der Etablierung einer differentiellen Wachstumsgeschwindigkeit. Sie erfahren, wie der noto-chordale Prozess die Zerebralisation initiiert und die Entwicklung wesentlicher Strukturen wie des Verdauungstrakts und des Herz-Kreislauf-Systems beeinflusst. Die Konzepte der Palpation und der Interkonnektion zwischen den verschiedenen embryonalen Schichten werden untersucht, um die Dynamik zwischen Herz, Gehirn und anderen Organen besser zu verstehen. Profitieren Sie von dieser bereichernden Synthese, die die komplexen Wechselwirkungen beleuchtet, die den Embryo formen.

ZUSAMMENFASSUNG DER BEWEGUNG

ACHSENBUILDUNG UND DIFFERENTIELLES WACHSTUM

Der anfängliche Prozess beinhaltet die Etablierung einer **elektrischen** und **elektromagnetischen Achse**. Diese Achse organisiert schrittweise eine **differentielle Wachstumsgeschwindigkeit**.

Diese Wachstumsgeschwindigkeit fungiert als ein in das System integrierter **Algorithmus**, der zu einem bestimmten Zeitpunkt die präzise **"Holo"** (Welle) der **Notochord** auslöst.

NOTOCHORDALER UND MESODERMALER PROZESS

Der **Notochordalprozess** bildet sich und ermöglicht gleichzeitig die Etablierung des **lateralen mesodermalen Prozesses**. Im selben Moment beginnt sich die **Symmetrie** zu etablieren.

Ein **Stützpunkt** entsteht an der Schädelbasis, genau an der zukünftigen **Sphenobasilar-Synchondrose**. Dieser Stützpunkt wird durch das Entwicklungspotenzial des **Kreuzbeins** gestützt.

ZEREBRALISIERUNG UND BEGLEITENDE ENTWICKLUNGEN

Diese Entwicklung markiert den Beginn der **Zerebralisierung**. Die Zerebralisierung induziert die **Kardialisierung**, die wiederum die **Diaphragmatisierung** und dann die **Hepatisation** nach sich zieht.

Das posteriore Wachstum verursacht die **Pneumatisierung**, dann die posteriore **Adrenalisierung** und so weiter.

ZEREBRALE EVOLUTION UND SCHLÜSSELPUNKTE

Während der Phase des **cephalen Wachstums** öffnet sich das **Foramen Monroi** lateral und gibt das **ventrikuläre System** frei. Dieser Prozess begleitet die Zerebralisierung und die **Kortikalisierung**.

Eine **posteriore Neurulation** tritt wieder auf, gestützt auf einen Schlüsselpunkt, der als **Insula** bezeichnet wird.

Der fundamentale Ruhepunkt bleibt die Spitze der Notochord. Im Gehirn bildet jedoch die **Insula** den entscheidenden Stützpunkt und Kipppunkt für die Entwicklung.

AUF- UND ABWÄRTSBEWEGUNGEN

Ein **Aufstiegsprozess** und ein **Abstiegsprozess** organisieren die gesamte Entwicklung. Diese beiden Bewegungen sind voneinander abhängig.

Wenn die Zerebralisierung stattfindet, treten synchrone Ereignisse auf:

- Die Entwicklung des **Verdauungstrakts**
- Die Entwicklung des **Herztrakts**
- Die Entwicklung des **Lungentrakts**

Dieser Aufstieg des Trakts und dieser Abstieg sind entscheidend. Der wichtigste Bereich, der diese Phänomene ermöglicht, ist der des **Herzens** und seiner Beziehung zur Mutter.

NOTOCHORD, NEURALPLATTE UND PRÄKARDIALER BEREICH

Die Notochord induziert die Bildung der **Neuralplatte** an der Vorderseite des Embryos. Es entstehen zwei **fluidische Trajektorien**.

Diese Trajektorien rollen sich nach oben, um den **präkardialen Bereich** zu bilden.

PALPATIONSTIEFEN UND HITCH POINTS

Es gibt verschiedene zu berücksichtigende **Palpationstiefen**:

1. **Palpation des Hitchpoint (Stützpunkt):** Verbunden mit der Entwicklung des Gehirns.
2. **Palpation des Gehirns:** In Bezug auf seine Position und seine Entwicklungsdynamik.
3. **Reine Entwicklung:** Bezüglich der Beziehungen zum Herzen, zur Leber und zum Verdauungssystem.

In Bezug auf die Tiefe können mehrere Schichten identifiziert werden:

- **Oberflächliche Zone:** Kontakt mit den Haaren, dann der Haut und dem Knochen.
- **Erste Schicht:** Die **viszerale Duralschicht**, direkt hinter dem Knochen.
- **Flüssigkeitsschicht** zum Schutz des Gehirns.
- **Kortikale Schicht:** Um ihre Bewegung zu spüren.
- **Die Kerne:** Wenn man tiefer geht.
- **Die ventrikuläre Ebene:** Hauptsächlich lateral.