

38. ENTWICKLUNG DER BAUCHSPEICHELDRÜSE

DAUER : 02:56

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In diesem Video über die Entwicklung der Bauchspeicheldrüse erfahren Sie, wie sich dieses entscheidende Organ aus der Phase der Leberentwicklung und den Magenbewegungen bildet. Durch einen detaillierten Ansatz behandelt der Inhalt die Übergänge zwischen dem vorderen und dorsalen Pankreas sowie die Typen des exokrinen und endokrinen Pankreas. Die Wechselwirkungen zwischen Pankreas, Leber und anderen embryologischen Strukturen wie Magen und Herz werden untersucht, was die Komplexität dieser Beziehungen und ihren Einfluss auf die Stoffwechselgesundheit über Insulin verdeutlicht. Diese Lektion enthält theoretische und praktische Elemente, ideal zur Verbesserung Ihres Verständnisses in Osteopathie und Embryologie.

ENTWICKLUNG DER BAUCHSPEICHELDRÜSE

In dieser Phase der **Leberentwicklung** und der Etablierung der **Magenbewegung** sowie der **Bursa omentalis** beobachtet man zunächst eine **vordere Bauchspeicheldrüse** und eine **dorsale Bauchspeicheldrüse**.

Während der **Rotationsphase** vollzieht die vordere Bauchspeicheldrüse eine große Dreiviertelbewegung und schließt sich dem hinteren Teil an, um die beiden Arten von Bauchspeicheldrüsen zu bilden: eine **exokrine Bauchspeicheldrüse** und eine **endokrine Bauchspeicheldrüse**. Die exokrine Bauchspeicheldrüse sezerniert Substanzen, die mit dem System der **Magensäfte** und **Pankreassäfte** in Verbindung stehen, wie **Amylase**, **Lipase** und **Protease**.

Die Bauchspeicheldrüse steht in Beziehung zur Leber, während die dorsale Bauchspeicheldrüse eine Bewegung ausführt, die die Leberrotation veranschaulicht. Diese Rotation erfolgt gleichzeitig mit einer Achse, die sich sehr weit hinten in einem Mesenterium positioniert, das als **hinteres Mesenterium** bezeichnet wird.

Wenn Sie die Entwicklungsbewegung der Bursa omentalis verstanden haben, beginnen Sie zu begreifen, dass alles andere nur eine Dynamik dieser Entwicklung auf einer transversalen Ebene ist. Die Bauchspeicheldrüse spielt eine entscheidende Rolle, indem sie **Insulin** freisetzt, das die

Zellpforten öffnet und somit die **Mitochondrienaktivität** und den Zuckerstoffwechsel beeinflusst.

Bei der Dissektion ist es wichtig zu beachten, dass es sehr schwierig ist, das **Duodenum** von der Bauchspeicheldrüse zu trennen, da sie tief miteinander verwachsen sind. Betrachtet man die Struktur von oben, so kann man eine Leberbewegung sehen, die den Magen dreht und die Bursa omentalis bildet, die sich spezifisch ausrichtet.

Dieser Prozess ist vergleichbar mit einer **Tai-Chi-Bewegung**, die gleichzeitig im Gehirn und in den Händen stattfindet. Man beobachtet die Öffnung der **Lungen**, das **Loopen des Herzens**, die Entwicklung des **Gehirns** sowie die Spirale des **Zwerchfell-Systems**.

Die gegen den Uhrzeigersinn verlaufende Entwicklung des **Dickdarms** und die Expression der **oberen Extremitäten** erfolgen ebenfalls synchron. Bei der Flexion des Gehirns ist es interessant, die Wechselwirkungen auf Herzebene, die Anlage der Augen, die Konfiguration des Gesichts, des Gaumens und der Lungen zu beobachten und zu beurteilen, wo man sich in diesem Prozess befindet.




ABB. — Magen-/Pankreas-/Milzversorgung




FIG. 77 b. — Vaisseaux duodéno-pancréatiques. Vue antérieure.




FIG. 77 c. — Vaisseaux duodéno-pancréatiques. Vue postérieure.

ABB. — Duodenopankreatische Gefäße