

04. ANLAGE DES MESODERMS UND DIE CHORDA DORSALIS

DAUER : 03:43

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video führt Sie durch den faszinierenden Prozess der Mesodermbildung und die entscheidende Rolle der Chorda dorsalis in der Embryonalentwicklung. Sie erfahren, wie diese Strukturen auf zellulärer Ebene interagieren, insbesondere durch den Primitivstreifen und die Flaschenzellen, was zur Bildung des primitiven Mesenchymgewebes führt. Darüber hinaus werden Sie praktische Aspekte im Zusammenhang mit dem Steißbein erkunden und entdecken, wie Impulse und elektromagnetische Felder die Gesundheit des Gewebes beeinflussen. Die Sitzung beinhaltet einen praktischen Ansatz zu den Bewegungen der Chorda dorsalis, während die Verbindung zwischen Kreuzbein, Steißbein und sogar dem Herzen beleuchtet wird, wodurch Ihr Verständnis der biodynamischen Embryologie und der Osteopathie vertieft wird.

ANLAGE DES MESODERMS UND DER CHORDA DORSALIS

DIE ANLAGE DES MESODERMS

Der erste entscheidende Schritt ist die **Anlage des Mesoderms**. Man beobachtet das Auftreten der **Primitivrinne** und der **Chorda dorsalis**.

Es gibt ein Aspirationsfeld zwischen dem **ektodermalen** und dem **endodermalen** Gewebe, das eine Bewegung erzeugt, bei der ein Raum gefüllt wird.

Das mesodermale Gewebe stammt vom **Epiblasten** und nicht vom Ektoderm. Die **Flaschenzellen** werden zur Mitte hingezogen.

So wird der Raum zwischen dem epiblastischen und hypoblastischen Gewebe zum **primitiven Mesenchymgewebe**, dem zukünftigen Mesoderm.

ROLLE DER CHORDA DORSALIS

Die **Chorda dorsalis** beeinflusst diesen Prozess. Es ist ein elektrisches Feld, das wirkt.

Im vorherigen Kurs haben wir auf der Ebene des **Kreuzbeins** gearbeitet und uns auf die Chorda dorsalis konzentriert.

Wir werden den Prozess genauer untersuchen. Die hier positionierte Chorda dorsalis ist mit dem **Hensen-Knoten** verbunden.

Dies erzeugt eine Wellenbewegung, eine **kranio-kaudale** Bewegung, bei der sich die Primitivrinne allmählich nach hinten zurückbildet.

Diese Primitivrinne befindet sich auf der Höhe der **sakro-kokzygealen** Basis und stellt ein energetisches Überbleibsel dar.

So wird das Mesoderm angelegt.

DIE PRAXIS: DAS STEIßBEIN UND DIE IMPULSE

Wir werden uns auf das **Steißbein** konzentrieren, da dieser Bereich die Energie bündelt.

Der erste Impuls erfolgt auf dem **hypoblastischen** Gewebe. In diesem Moment wird der Epiblast zum **Ektoderm** und der Hypoblast zum **Endoderm**.

Das bedeutet, dass der Epiblast all meine Gewebe informiert, und er selbst ist vollständig von meiner Chorda dorsalis integriert. Es ist ein **elektromagnetisches** Feld, das den Körper informiert.

Wenn wir dieses Niveau bewusst berühren, sind wir mit dieser Kraft verbunden, die der Körper angelegt hat.

ENTWICKLUNG DES MESODERMALEN GEWEBES

Wir kommen zum zweiten Impuls, der zweiten Welle, die das **mesodermale Gewebe** bilden wird.

Ich erhalte so eine anfängliche Chordainformation, die zusammen mit meiner Primitivrinne dieses Aspirationsfeld erzeugt.

Letzteres schafft den Raum meiner Primitivrinne, in Kontakt mit der Anlage meines **Embryonalstiels** und meinen sich organisierenden **Permeations-** und **Infusionsfeldern**.

In dieser Bewegung erfolgt die Integration meines Mesoderms. Dies geschieht zwischen dem **vierzehnten** und dem **sechzehnten Tag**.

Wenn Sie praktizieren, nehmen Sie zuerst diese Art von **"Tai Chi"** wahr, diese Chordawelle.

Dann, darunter, gleichzeitig mit dieser Bewegung, gibt es eine Invasion darunter. Es ist eine **Doppelbewegung**.

Man kann sich auf das Kreuzbein oder auf das Steißbein positionieren. Später werden wir andere sehr spezifische Gleichgewichtspunkte auf der Ebene des **Herzens** ansprechen.

Der präsumptive Aspekt des Herzens wird durch dieses Aktionsfeld bestimmt.




ABB. — Beginn der Neurulation




ABB. — Frühe Embryonalentwicklung





ABB. — Menschliche Gastrulation 3 Wochen



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
 Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

ABB. — *Menschliche Gastrulation*




ABB. — Menschliche embryonale Gastrulation




ABB. — Mesenchymale Migration




ABB. — Gastrulation 16 Tage