

09. INFLUENCIA DEL PLEGAMIENTO DEL EMBRIÓN EN EL TUBO DIGESTIVO SUPERIOR

DURACIÓN : 05:28

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video profundiza en el impacto crucial del plegamiento del embrión en el desarrollo del tracto digestivo superior. Ilustra cómo la flexión del embrión influye en el mesénquima y crea la base del cráneo, al tiempo que destaca la organización de estructuras como el tubo neural, el corazón y el sistema vascular. Se abordan términos clave como la cavidad amniótica, la notocorda y el intestino anterior para demostrar su papel en la formación del tubo digestivo, conectando así el desarrollo de los órganos con la dinámica vital del líquido amniótico. Un enfoque tanto teórico como práctico, esencial para cualquier terapeuta que desee comprender las sutilezas del desarrollo embrionario.

INFLUENCIA DE LA PLICATURA DEL EMBRIÓN EN EL TUBO DIGESTIVO SUPERIOR

La **importancia de la plicatura** del embrión se manifiesta en la parte superior del intestino. Este movimiento de **flexión** del embrión provoca cambios significativos en su desarrollo.

Durante la plicatura, el **mesénquima**, que es el tejido mesenquimal debajo de los encéfalos, se vuelve perpendicular al eje longitudinal del embrión. Este movimiento crea una hermosa curvatura, lo que resulta en una **compresión** entre la parte anterior y posterior, contribuyendo a la formación de la base del cráneo. Este proceso dinámico genera un **campo cartilaginoso** que, inicialmente laxo, se densifica progresivamente para formar **cartílagos primitivos** comprimidos, liberando así una gran energía.

La **cavidad amniótica** y la **cavidad vitelina** desempeñan un papel crucial en este desarrollo. A medida que el embrión se pliega, la cavidad vitelina se desplaza y el tubo neural comienza a enrollarse. La zona cardíaca, inicialmente en la parte anterior, también se ve influenciada por este movimiento de flexión.

El estudio de este movimiento se realiza de la periferia hacia el interior, desde la cara visible, como la boca, hasta el intestino faríngeo. Este movimiento de flexión organiza la **particularidad de la cara**. La **notocorda** induce el tubo neural y las arterias, mientras que el enrollamiento

alrededor del sistema arterial se organiza.




FIG. — Yema del gusto

La parte superior del intestino se forma como una **articulación** entre el corazón y el cerebro. El **intestino anterior** aparece, representando el intestino superior en desarrollo. Esta articulación está orientada y organizada en el espacio-tiempo por el **líquido amniótico**, con el sistema vascular como punto de apoyo.

El corazón, visible en una posición elevada, y el enrollamiento de las estructuras embrionarias ilustran esta articulación. Cuanto más avanza el desarrollo, más se fortalece la organización. El gran saco vitelino y su vestigio se forman, mientras que la parte superior se organiza a través de movimientos de flexión.

La **cavidad amniótica** y el corazón crean un espacio que se convierte en una articulación entre el corazón y el cerebro, impulsada por el crecimiento amniótico. Este proceso marca el comienzo de la formación del tubo digestivo, que se organiza en un plano longitudinal. Comienza la delimitación de la parte superior del intestino, integrando el **alantoides** y la **membrana cloacal**.

FIG. — Esquema explicativo

Entre esta membrana y la membrana faríngea, se desarrollan las bocas a nivel bucal. Esta articulación entre el cerebro, el saco amniótico y el corazón está organizada por la velocidad de crecimiento diferencial del sistema vascular, estableciendo un equilibrio entre el cerebro y el corazón, orientado por el **mesodermo**.

La aparición de un vaso depende de diversos componentes: un campo, una concentración metabólica, una trayectoria, **vacuolizaciones** y la presencia de partículas intersticiales. Estos elementos son dinámicos, lo que explica por qué algunos vasos pueden aparecer y desaparecer durante el desarrollo embrionario. Inicialmente, dos grandes aortas se centran en una sola aorta.

La influencia de esta plicatura es, por lo tanto, esencial para organizar la **delimitación interna** del tubo digestivo. Ahora entraremos en los detalles de este proceso.




FIG. — Tubo digestivo embrionario




FIG. — *Cerebro embrionario humano*




FIG. — Embrión humano sagital




FIG. — Formación de la notocorda




FIG. — Embrión humano sagital




FIG. — *Embrión vascularizado*

 Esquema explicativo

FIG. — *Esquema explicativo*