

13. PREGUNTAS DÍA 1

DURACIÓN : 08:33

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En este video, nos sumergimos en el desarrollo embrionario, centrándonos en la vesícula vitelina y su papel indispensable en la nutrición y la formación del cordón umbilical. La ampliación a la dinámica del sistema digestivo y glandular ofrece una comprensión más amplia de las primeras etapas de la vida, y se revela la importancia de los ejes hormonales como el eje hipotálamo-hipofisario. Se presentan métodos prácticos para liberar las congestiones en diversos sistemas corporales, al tiempo que se subraya la importancia del movimiento y la flexión en el crecimiento embrionario. Explore los vínculos entre las estructuras anatómicas y el desarrollo armonioso para optimizar su práctica de osteopatía y acompañamiento.

DESARROLLO EMBRIONARIO Y SISTEMAS INTEGRADOS

La **vesícula vitelina** desempeña un papel crucial como **reserva de información nutritiva** al inicio del desarrollo embrionario. A medida que el embrión crece, esta vesícula involuciona y se integra con el **pedículo embrionario** para formar el **cordón umbilical**. Aunque este proceso pueda parecer complejo, es esencial comprender que la vesícula vitelina también contribuye al desarrollo del **sistema intestinal**.

El crecimiento embrionario se caracteriza por un **crecimiento significativo** a nivel cerebral, mientras que el **sistema digestivo** se desarrolla más tarde. Sin embargo, es fundamental señalar que el sistema digestivo es precoz en su función, ya que depende primero del **sistema digestivo materno**. Además, la aparición del **sistema glandular** precede a la del **sistema nervioso**, lo que subraya la importancia vital de los sistemas glandulares y digestivos.

El **eje hipotálamo-hipófisis-tiroides-suprarrenales** es un elemento central en la regulación hormonal, particularmente en las mujeres, que están influenciadas por los **ciclos lunares** de aproximadamente 28 días. Tratar los desequilibrios hormonales a menudo implica liberar las **fases de congestión** en diversos sistemas, como el sistema cervical, tímico o hepático. Comprender el **biofeedback** de los sistemas es esencial para entender estas interacciones.

El desarrollo embrionario también se manifiesta a través de **estructuras anatómicas** específicas. Por ejemplo, el **ángulo de la audición**, formado por el encuentro del **manubrio del esternón** y las barras esternales, representa una memoria de la **flexión** embrionaria. Esta flexión es crucial

para el equilibrio dinámico del **mediastino**, el espacio entre los pulmones.


El **apéndice xifoides**, que se desarrolla más tarde, está relacionado con la integración del **ciego** en la fosa ilíaca derecha, marcando la fase terminal de la formación del marco cólico. El desarrollo intestinal implica un **movimiento de rotación antihorario** de 270 grados, integrando el ciego en la fosa ilíaca derecha.

Las **deformidades externas** pueden indicar desequilibrios o influencias genéticas, mientras que el desarrollo intestinal está orquestado por un **eje vascular mesentérico**. Este proceso también está relacionado con la dinámica cerebral y el desarrollo de los **miembros superiores**.

El movimiento de flexión y elongación es esencial para el crecimiento embrionario. La **notocorda** genera una **onda** que crea el **tubo neural**, esencial para el desarrollo. Este tubo neural, a su vez, favorece el enrollamiento y la elongación del embrión.

Los **glóbulos rojos** y las **gónadas** son elementos clave que emergen de esta dinámica de crecimiento. A veces, los individuos pueden encontrar **bloqueos** en su desarrollo, lo que requiere un enfoque para liberar estos nudos y restaurar la **probabilidad** de su evolución.

Esta dinámica de desarrollo es una **biodinámica cinética**, que conecta el cerebro y las líneas de fuerza con los ejes duramaterianos y los arcos branquiales. Todo esto repercute en la **sínfisis esfenobasilar**, un punto crucial en el desarrollo embrionario. La comprensión de estos procesos es esencial para entender la complejidad del desarrollo humano.



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

FIG. — Desarrollo embrionario temprano





FIG. — Embrión de 14-15 días



An1: Animal 1; An2: Animal 2; Vg1: Végétatif 1; Vg2: Végétatif 2; PA: Pôle Animal; PV: Pôle Végétatif.

FIG. — Blástula de erizo de mar





FIG. — Blastocoele y células



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

FIG. — Implantación humana 9 días




FIG. — Corte transversal riñón




FIG. — Circulación embrionaria 4 semanas