

30. PROPIEDADES DEL PERITONEO

DURACIÓN : 04:49

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En este video, explore el peritoneo, a menudo subestimado, como un órgano activo y dinámico. La enseñanza destaca su función esencial en la movilidad del líquido intraperitoneal, su papel en la integración embriológica y su implicación en los intercambios moleculares dentro del organismo. Se profundizan los conceptos de continuidad celular y homeostasis, ilustrando cómo las interacciones a nivel peritoneal pueden desencadenar respuestas inmunitarias a distancia, como reacciones alérgicas. Una valiosa perspectiva sobre los vínculos entre el peritoneo y síntomas aparentemente no relacionados, como el asma, hace que este video sea crucial para cualquier profesional de las terapias somáticas.

PROPIEDADES DEL PERITONEO

El peritoneo desempeña un papel esencial en la **movilidad pasiva** y constante del **líquido intraperitoneal**. También participa en la marcha, especialmente en caso de fijación peritoneal. Los miembros superiores e inferiores pueden considerarse una **expansión** de este saco peritoneal. Lo que ocurre en esta región puede reflejar un desarrollo en otras zonas, ilustrando una **continuidad celular**, tisular, molecular e incluso energética.

Es crucial considerar el peritoneo como un **órgano activo**. Posee capacidades de **protección inmunitaria** y libera **hormonas tisulares**, como las **prostaglandinas**, en función de la secreción y la absorción. Esto significa que intenta mantener un volumen líquido constante, cercano al del **líquido cefalorraquídeo**.

La integración del **celuloma externo** en un **celuloma interno** se desarrolla en una dinámica similar a la de la integración del **tubo neural**. Se puede comparar esto con la integración del **líquido amniótico** en el tubo neural y del **líquido extra-psolómico** en el sistema peritoneal. Este proceso finaliza alrededor del **día 28**, con un volumen peritoneal que busca mantener una **constancia** para asegurar un equilibrio hidrostático de tipo **homeostático**, tanto a nivel cerebral como peritoneal.

El peritoneo también está implicado en intercambios moleculares. Contiene **células mesenquimales** que, más allá de la placa precordial, se convierten en el **pericardio** y el **septum transversum**. Estas células se integran por el movimiento global del embrión, especialmente

durante el desarrollo del corazón, que interactúa con la **vesícula vitelina**. Este proceso de integración ocurre entre el **día 22** y el **día 28**.

El peritoneo es un órgano rico en **arteriolas** que intercambian de manera **osmótica** con el plasma sanguíneo, proporcionando exudados que informan sobre el estado **vegetal intracelular**. Está constantemente informado del estado digestivo y metabólico de los órganos circundantes gracias a su líquido intersticial.

Células de tipo **mesotelial**, como los **macrófagos**, los **polinucleares** y los **mastocitos**, desempeñan un papel crucial en las reacciones de defensa a nivel peritoneal. Los mastocitos, sensibles a las **inmunoglobulinas E (IgE)**, están implicados en reacciones alérgicas y asmáticas. Por ejemplo, una agresión infecciosa a nivel del peritoneo puede provocar una **degranulación mastocitaria** que se manifiesta a distancia, como una reacción asmática.

Una mala barrera inmunitaria a nivel de la membrana peritoneal puede permitir el paso de macromoléculas indeseables, lo que provoca reacciones alérgicas. Por ejemplo, una alergia a la leche puede causar una reacción asmática, incluso si el agente infeccioso es inicialmente peritoneal.

El tubo digestivo, considerado como un tejido externo, también puede expresar problemas a través de síntomas como el asma o la bronquitis, en respuesta a agentes alergénicos. Los tratamientos, como los **broncodilatadores** o los **antibióticos**, pueden aliviar los síntomas, pero no siempre resuelven la causa subyacente, que puede ser simplemente una alergia a un alimento, como una fresa.