

09. LAS DIFERENTES CAPAS DEL OJO 1

DURACIÓN : 05:01

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Análisis de la histología ocular (esclerótica, coroides, procesos ciliares, retina) y sus especificidades funcionales. Introducción a los principios de la iridología como enfoque diagnóstico tisular. Explicación detallada de la actividad de los fotorreceptores y de la capa pigmentaria, ilustrando los mecanismos bioquímicos de la transducción visual.

LAS DIFERENTES CAPAS DEL OJO

El **ojo** está constituido por varias capas, a menudo descritas como calcetines superpuestos.

1. LA ESCLERÓTICA

La primera capa, llamada **esclerótica**, está en continuidad con la **córnea** en la parte anterior. La córnea es una estructura **transparente** que permite que la luz penetre en el ojo. El **limbo** y la parte blanca del ojo, conocida como **esclerótica**, constituyen este primer calcetín.




Fig. 3.

FIG. — Esquema general del ojo

2. LA COROIDES

Al retirar la esclerótica, se descubre la **coroides**, una capa extremadamente **vascularizada**. La coroides se prolonga hacia adelante con el **iris**. La **iridología** es una práctica que consiste en leer información sobre la salud a través del iris, que puede almacenar diversos elementos, como el **azufre**.

3. LOS PROCESOS CILIARES

Los **procesos ciliares** y los **músculos suspensorios del iris** desempeñan un papel crucial en la **fisiología** del ojo. Estas estructuras son esenciales para el sistema de **acomodación**, permitiendo que el **cristalino** cambie de forma para que la imagen se proyecte correctamente sobre la **retina**.

4. LA RETINA

El tercer calcetín es la **retina**, que es el tejido nervioso más profundo y representa una extensión del **cerebro**. Está formada por dos capas: una capa interna y una capa externa. Un **desprendimiento de retina** ocurre cuando el espacio entre estas dos capas se desarrolla.




Fig. 3. — Ebauche oculaire humaine. Embryon d'environ 33 jours.

FIG. — Túnica del ojo, procesos ciliares y retina

5. LA CAPA PIGMENTARIA Y LOS FOTORRECEPTORES

La retina también contiene una **capa pigmentaria** y **fotorreceptores**, que se dividen en **conos** y **bastones**. Estas células son esenciales para la **transducción**, el proceso por el cual un fotón se convierte en energía eléctrica, permitiendo así la percepción visual.

CONCLUSIÓN

Estas diferentes capas del ojo trabajan juntas para permitir la visión, cada una con un papel específico y crucial en el funcionamiento de este complejo órgano.