

39. RIEPILOGO DEL MOVIMENTO

DURATA : 05:02

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video si immerge nel cuore del movimento embrionale, dettagliando il ruolo cruciale dell'asse elettrico ed elettromagnetico nello stabilire una velocità di crescita differenziale. Imparerete come il processo notocordale avvia la cerebralizzazione, influenzando lo sviluppo di strutture essenziali come il tubo digerente e il sistema cardiaco. Vengono esplorati i concetti di palpazione e di interconnessione tra i diversi strati embrionali al fine di comprendere meglio le dinamiche tra il cuore, il cervello e altri organi. Godetevi questa sintesi arricchente che mette in luce le complesse interazioni che modellano l'embrione.

RIEPILOGO DEL MOVIMENTO

STABILIZZAZIONE DELL'ASSE E CRESCITA DIFFERENZIALE

Il processo iniziale implica l'instaurazione di un **asse elettrico** ed **elettromagnetico**. Questo asse organizza progressivamente una **velocità di crescita differenziale**.

Questa velocità di crescita agisce come un **algoritmo** integrato nel sistema, provocando a un certo punto la precisa **"hola"** (onda) della **notocorda**.

PROCESSO NOTOCORDALE E MESODERMICO

Il processo **notocordale** si forma e permette simultaneamente l'instaurazione del processo **laterale mesodermico**. Nello stesso istante, la **simmetria** inizia a stabilirsi.

Un **punto di appoggio** emerge a livello della base del cranio, precisamente a livello della futura **sinfisi sfeno-basilare**. Questo punto di appoggio è sostenuto dal potenziale di sviluppo del **sacro**.

CEREBRALIZZAZIONE E SVILUPPI CONCOMITANTI

Questo sviluppo segna l'inizio della **cerebralizzazione**. La cerebralizzazione induce la **cardializzazione**, che a sua volta porta alla **diaframmatizzazione**, e poi all'**epatizzazione**.

La crescita posteriore provoca la **pneumatizzazione**, poi la **surrenalizzazione** posteriore, e così via.

EVOLUZIONE CEREBRALE E PUNTI CHIAVE

Durante la fase di **crescita cefalica**, il **foro di Monro** si apre lateralmente, liberando il sistema **ventricolare**. Questo processo accompagna la cerebralizzazione e la **corticalizzazione**.

Una **neurulazione posteriore** riappare, appoggiandosi su un punto chiave chiamato l'**Insula**.

Il punto di silenzio fondamentale rimane la punta della notocorda. Tuttavia, nel cervello, l'**Insula** costituisce il punto di appoggio e il punto di svolta cruciale per lo sviluppo.

MOVIMENTI DI ASCENSIONE E DISCESA

Un processo di **ascensione** e un processo di **discesa** organizzano l'intero sviluppo. Questi due movimenti sono interdipendenti.

Quando si verifica la cerebralizzazione, avvengono eventi sincroni:

- Lo sviluppo del **tubo digerente**
- Lo sviluppo del **tubo cardiaco**
- Lo sviluppo del **tubo polmonare**

Questa ascensione del tubo e questa discesa sono cruciali. La zona più importante che permette questi fenomeni è quella del **cuore** e della sua relazione con la madre.

NOTOCORDA, PLACCA NEURALE E ZONA PRECARDIACA

La notocorda induce la formazione della **placca neurale** nella parte anteriore dell'embrione. Si creano due **traiettorie fluidiche**.

Queste traiettorie si avvolgono sopra per formare la **zona precardiaca**.

PROFONDITÀ DI PALPAZIONE E HITCH POINTS

Esistono diverse **profondità di palpazione** da considerare:

1. **Palpazione dell'Hitchpoint (punto di appoggio):** Legata allo sviluppo del cervello.
2. **Palpazione del cervello:** In relazione alla sua posizione e alla sua dinamica di sviluppo.
3. **Sviluppo puro:** Riguardante le relazioni con il cuore, il fegato e il sistema digerente.

In termini di profondità, si possono identificare diversi strati:

- **Zona superficiale:** Contatto con i capelli, poi la pelle e l'osso.
- **Primo strato:** Lo strato **duramerico viscerale**, subito dietro l'osso.

- **Strato liquido** di protezione del cervello.
- **Strato corticale:** Per sentirne il movimento.
- **I nuclei:** Scendendo più in profondità.
- **Il piano ventricolare:** Principalmente laterale.