

14. STRUTTURAZIONE DEL SISTEMA VASCOLARE : NOTE

DURATA : 03:24

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questo video, esploriamo la strutturazione del sistema vascolare durante lo sviluppo embrionale, ponendo l'accento sull'interconnessione tra la vescicola vitellina e la cavità amniotica. I concetti di cefalizzazione, di cardializzazione e di diaframmatizzazione sono dettagliati, illustrando come il sistema vascolare si centralizzi man mano che si sviluppa. Analizzando i sistemi cardinali e la formazione dell'asse vascolare venoso, scopriremo come i movimenti fluidici e le germinazioni laterali contribuiscano alla formazione di un'"aura protettiva", essenziale per lo sviluppo del sistema cerebrale. Questo approccio sottolinea l'importanza di reintegrare la zona B durante il trattamento del sistema nervoso, stabilendo un legame cruciale tra l'ombelico e le strutture embrionali.

STRUTTURAZIONE DEL SISTEMA VASCOLARE

Il **sistema vascolare**, che si sviluppa alla periferia, è profondamente integrato nella **vescicola vitellina**. Gli **isolotti di Wolff-Pander**, per esempio, si formano nello sdoppiamento di questa vescicola.

Dietro la vescicola vitellina si trova la **cavità amniotica**. Immaginatela come un **palloncino** che contiene questo sistema circolatorio che si ritrova anche nell'asse.

Questo "palloncino" si sgonfierà, e l'intero sistema periferico si centralizzerà. Questa centralizzazione è orchestrata dalla cavità amniotica.

La sua velocità di crescita differenziale, rispetto al **campo vascolare primitivo** e allo sviluppo del **cervello**, genera un movimento di aspirazione. All'esterno, ciò è accompagnato da una **spinta trasversale**, sia toracica che addominale.

L'asse longitudinale è più complesso, integrando la **cefalizzazione**, la **cardializzazione**, la **diaframmatizzazione** e l'insieme del **peritoneo posteriore** fino al **perineo**.

Questo processo è paragonabile a questo palloncino che si integra. Simultaneamente, alla periferia, c'è un enorme movimento che converge verso il **cordone ombelicale**. Il cordone, ricordiamo, è il punto d'incontro tra il **peduncolo embrionale** e la vescicola vitellina, quest'ultima che si riassorbe progressivamente.

Il segreto, qui, è il **movimento embrionale** e la **motilità dello sviluppo**: portare sempre i fluidi verso il centro.

Studieremo in dettaglio i **sistemi cardinali** (subcardinale e supracardinale) per giungere infine a un **asse vascolare venoso**. Quest'ultimo presenta dei resti specifici.

Il sistema vascolare venoso si sviluppa in modo **trasversale**, e non longitudinale. È composto da parti provenienti da direzioni diverse, risultando da un'unione trasversale.

Questo contrasta con il sistema vascolare arterioso, che funziona in modo **longitudinale**, con due grandi condotti. Sul piano venoso, si tratta di **germinazioni laterali**, cioè di nuove traiettorie.

Quando i fluidi si integrano verso il centro, la **zona B** si apre e si delinea, formando una sorta di **aura protettiva**. Questa bolla contribuisce, tra l'altro, alla costruzione del **sistema cerebrale**.

La prima cavità che appare, o piuttosto la seconda, è la cavità amniotica. È in questo momento che il **bottone embrionale** diventa il futuro **epiblasto**, il futuro tessuto nervoso.

I due non devono essere separati. Se vogliamo trattare il sistema nervoso, dobbiamo sempre reintegrare la zona B. Questo converge su tutto l'**asse mediano** e infine a livello **ombelicale**.

L'**ombelico** è il punto d'incontro finale, la giunzione tra il peduncolo embrionale e la vescicola vitellina.